

**ԴԵՂԻ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ՀՐԱՀԱՆԳ
(ՆԵՐԴԻՐ-ԹԵՐԹԻԿ)
ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ՊԱՅԻՆՏԻ ՀԱՄԱՐ**

Վիբուրկոլ
ուղիղաղիքային մոմիկներ
Հոմեոպաթային դեղ

Նախքան դեղի կիրառումը ուշադիր կարդացեք ներդիր-թերթիկն ամբողջությամբ, քանի որ այն պարունակում է կարևոր տեղեկատվություն:

Միշտ անհրաժեշտ է դեղն օգտագործել այս հրահանգին և բժշկի կամ դեղագետի ցուցումներին խիստ համապատասխան:

- Պահեք այս ներդիր-թերթիկը: Հնարավոր է այն կրկին կարդալու կարիք լինի:
- Եթե ունեք լրացուցիչ հարցեր, դիմեք դեղագետին:
- Եթե ի հայտ է եկել որևէ կողմնակի ազդեցություն, այդ թվում՝ նաև այնպիսին, որը ներառված չէ այս ներդիր-թերթիկի 4-րդ բաժնում, խորհրդակցեք բուժող բժշկի կամ դեղագետի հետ:
- Եթե դեղը օգտագործելուց հետո հիվանդության ախտանիշները չեն բարելավվել կամ վատթարացել են, դիմեք բժշկի:

Ինչ բովանդակություն ունի այս ներդիր-թերթիկը

1. Ինչ է Վիբուրկոլ դեղը և ինչի համար է այն օգտագործվում:
2. Ինչ պետք է իմանալ Վիբուրկոլ դեղն օգտագործելուց առաջ:
3. Ինչպես օգտագործել Վիբուրկոլ դեղը:
4. Ինչպիսի կողմնակի ազդեցություններ կարող են առաջանալ:
5. Ինչպես պահել Վիբուրկոլ դեղը:
6. Ինչ է պարունակում փաթեթը և այլ տեղեկություններ:

1. ԻՆՉ Է ՎԻԲՈՒՐԿՈԼ ԴԵՂԸ Ե ԻՆՉԻ ՀԱՄԱՐ Է ԱՅՆ ՕԳՏԱԳՈՐԾՎՈՒՄ

Վիբուրկոլը հոմեոպաթային դեղ է: Այն ցուցված է ջերմությամբ կամ առանց ջերմության ուղեկցվող դժուրագրգիռ և անհանգիստ վիճակների դեպքում, հատկապես նորածինների և երեխաների շրջանում (օրինակ՝ ատամների ծկթման, անքնության, որովայնային թույլ ցավերի դեպքում): Վիբուրկոլ դեղը ցուցված է երեխաների շրջանում մրսածության ախտանիշային բուժման համար:

2. ԻՆՉ Է ՊԵՏՔ ԻՄԱՆԱԼ ՎԻԲՈՒՐԿՈԼ ԴԵՂՆ ՕԳՏԱԳՈՐԾԵԼՈՒՑ ԱՌԱՋ

Մի օգտագործեք Վիբուրկոլ դեղը.

- եթե ունեք հայտնի ալերգիա *Matricaria recutita* (երիցուկ դեղատու), *Asteraceae* ընտանիքի այլ բույսերի, դեղի ակտիվ կամ որևէ այլ բաղադրատարրի նկատմամբ:

Հատուկ հրահանգներ և նախազգուշացումներ

Շնչառության դժվարացման, բարձր ջերմության, թարախային կամ արյունոտ խորխի, ինչպես նաև կայուն, անհասկանալի կամ կրկնվող որովայնային ցավերի կամ անհայտ ծագման որովայնային ցավերի դեպքում պետք է դիմել բժշկի:

Նորածնի կյանքի առաջին տարում 38°C-ից բարձր պահպանվող ջերմության դեպքում պետք է դիմել բժշկի: Նման դեպքերում հիվանդության առնվազն երկրորդ օրը բժիշկը պետք է զննի երեխային:

Վիբուրկոլ դեղի և այլ դեղերի միաժամանակյա կիրառում

Ապրելակերպի ընդհանուր վնասակար գործոնները, ինչպես նաև խթանիչները կարող են բացասաբար ազդել հոմեոսթազիային դեղի արդյունավետության վրա:

Տեղեկացրեք բուժող բժշկին կամ դեղագետին, եթե ընդունում եք, վերջերս ընդունել եք կամ պատրաստվում եք ընդունել որևէ այլ դեղ:

Հղիություն և կրծքով կերակրման շրջան

Կիրառելի չէ, քանի որ այս դեղը նախատեսված է 12 տարեկանից ցածր երեխաների համար:

Ազդեցությունը փոխադրամիջոցներ վարելու և սարքավորումների հետ աշխատելու կարողության վրա

Փոխադրամիջոցներ վարելու և սարքավորումների հետ աշխատելու կարողությունների վրա Վիբուրկոլ դեղի որևէ ազդեցության վերաբերյալ չի հաղորդվել: Հոմեոսթազիային նոսրացումների շնորհիվ որևէ նման ազդեցություն չի ակնկալվում:

3. ԻՆՉՊԵՍ ՕԳՏԱԳՈՐԾԵԼ ՎԻԲՈՒՐԿՈԼ ԴԵՂԸ

Եթե դեղը նշանակված չէ այլ կերպ, ապա այն պետք է օգտագործել հետևյալ դեղաչափերով.

- Նորածնի կյանքի առաջին տարում դեղը պետք է կիրառել մանկաբույժի հետ խորհրդակցելուց հետո՝ օրական առավելագույնը 1 մոմիկ:
- 2-6 տարեկան երեխաների համար՝ կիրառել օրական 1-2 մոմիկ:
- 6-12 տարեկան երեխաների համար՝ կիրառել օրական 1-3 մոմիկ:

Ախտանիշների բարելավման դեպքում կիրառման հաճախականությունն անհրաժեշտ է նվազեցնել:

Կիրառման ձև

Նախատեսված է ուղիղաղիքային կիրառման համար:

Բուժման տևողություն

Ինչպես բոլոր դեղերը, հոմեոսթազիային դեղերը նույնպես չի կարելի երկարատև օգտագործել առանց բժշկի հետ խորհրդակցելու:

Եթե Վիբուրկոլ դեղն ավելի շատ եք օգտագործել, քան թույլատրելի է

Գերդեղաչափման դեպքեր չեն արձանագրվել: Հոմեոսթազիային նոսրացման շնորհիվ գերդեղաչափում չի ակնկալվում:

Եթե գերազանցել եք թույլատրելի դեղաչափը, խորհրդակցեք բուժող բժշկի կամ դեղագետի հետ:

Եթե մոռացել եք օգտագործել Վիբուրկոլ դեղը

Մի ընդունեք կրկնակի դեղաչափ բաց թողնվածը լրացնելու նպատակով:

Եթե դադարեցնում եք Վիբուրկոլի օգտագործումը

Եթե ունեք հարցեր կամ Ձեզ անհրաժեշտ է լրացուցիչ տեղեկատվություն այս դեղի օգտագործման վերաբերյալ, դիմեք բուժող բժշկին կամ դեղագետին:

4. ԻՆՉՊԵՍԻ ԿՈՂՄՆԱԿԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՐՈՂ ԵՆ ԱՌԱՋԱՆԱԼ

Ինչպես բոլոր դեղերը, հոմեոսթազիային դեղերը նույնպես կարող են առաջացնել կողմնակի ազդեցություններ, թեև ոչ բոլոր պացիենտների մոտ դրանք կարող են դրսևորվել:

Հազվադեպ կարող են ի հայտ գալ փորլուծություն կամ մաշկային ռեակցիաներ:
Ուշադրություն. Հոմեոպատային դեղերի կիրառման ընթացքում կարող է առաջանալ
ախտանիշների ժամանակավոր վատթարացում (նախնական սրացում): Նման դեպքերում
անհրաժեշտ է դադարեցնել դեղի կիրառումը և դիմել բուժող բժշկին:

Կողմնակի ազդեցությունների վերաբերյալ հաղորդում

Կողմնակի ազդեցության ի հայտ գալու դեպքում այդ մասին տեղեկացրեք բժշկին, կամ
դեղագետին: Սա վերաբերում է նաև այս ներդիր-թերթիկում չնշված որևէ այլ կողմնակի
ազդեցությանը: Դուք կարող եք կողմնակի ազդեցության մասին ուղղակիորեն առցանց
հաղորդել ՀՀ ԱՆ ակադեմիկոս Է. Գաբրիելյանի անվան դեղերի և բժշկական
տեխնոլոգիաների փորձագիտական կենտրոն՝ հետևյալ հղումով. www.pharm.am կամ
զանգահարել թեժ գիծ. հեռախոսահամարներ՝ (+374 10) 20 05 05 և (+374 96) 22 05 05:

Կողմնակի ազդեցությունների մասին հաղորդելով՝ Դուք նպաստում եք այս դեղի
անվտանգության վերաբերյալ լրացուցիչ տեղեկատվության ապահովմանը:

5. ԻՆՉՊԵՍ ՊԱՀԵԼ ՎԻՐՈՒԿՈՒԼ ԴԵՂԸ

Դեղը պահեք երեխաների համար անտեսանելի և անհասանելի տեղում:

Պահել 25°C ջերմաստիճանից ոչ բարձր պայմաններում:

Մի օգտագործեք այս դեղը տուփի և առաջնային փաթեթի վրա «Պիտանի է մինչև» բառերից
հետո նշված պիտանիության ժամկետի ավարտից հետո:

Դեղի պիտանիության ժամկետը լրանում է նշված ամսվա վերջին օրը:

6. ԻՆՉ Է ՊԱՐՈՒՆԱԿՈՒՄ ԴԵՂԻ ՓԱԹԵԹԸ Լ ԸՅԼ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆ

Ինչ է պարունակում Վիբուրկոլ դեղը

1,1 գ քաշով մեկ ուղիղաղիքային մոմիկը պարունակում է հետևյալ ակտիվ բաղադրատարրերը՝
Atropa bella-donna D2՝ 1,1 մգ, Calcium carbonicum Hahnemanni D8՝ 4,4 մգ, Matricaria recutita D1՝
1,1 մգ, Plantago major D3՝ 1,1 մգ, Pulsatilla pratensis D2՝ 2,2 մգ:

Օժանդակ նյութ՝ պինդ ճարպ:

Ինչ տեսք ունի Վիբուրկոլ դեղը և ինչ է պարունակում փաթեթը

Սպիտակ կամ դեղնասպիտակ մոմիկ: Պահման ընթացքում մոմիկի մակերեսին հնարավոր է
առաջանան բաց գույնի բծեր: Դա մոմիկի բաղադրության մեջ առկա ճարպի այսպես կոչված
«ծաղկումն» է, որն անվնաս է և չի ազդում դեղի արդյունավետության ու տանելիության վրա:

1 տուփում առկա է 1,1գ քաշով 12 մոմիկ:

Բաց թողնման կարգ

Բաց է թողնվում առանց դեղատոմսի:

Գրանցման հավաստագրի իրավատեր և արտադրող

Բիոլոգիչե Հայլմիթել Հիլլ ԳմբՀ,

Գերմանիա

76532, Բադեն-Բադեն

Դր.-Ռեկեվեգ-փ. 2-4

Հեռախոս՝ +49 7221 / 501-00

Ֆաքս՝ +49 7221 / 501 485

Էլ. հասցե՝ info@heel.com

Այս թերթիկը վերջին անգամ վերանայվել է 10/2023 թ.: