

**Листок-вкладыш**  
**(информация для потребителя)**  
**Инсти без сахара**

**Торговое название**

Инсти без сахара

**Лекарственная форма**

Гранулы

**Международное непатентованное название**

Нет

**Состав**

Каждый саше-пакет содержит экстракты из:

*активные вещества:*

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Ива белая               | 750 мг |
| Адхатода сосудистая     | 300 мг |
| Солодка голая           | 550 мг |
| Фиалка душистая         | 100 мг |
| Валериана лекарственная | 100 мг |
| Фенхель обыкновенный    | 75 мг  |
| Эвкалипт шаровидный     | 35 мг  |
| Чай китайский           | 125 мг |

*Вспомогательные вещества:* аспартам, ментол кристаллический, крахмал кукурузный, лактоза.

**Описание**

Гранулы коричневого цвета с запахом ментола при раздавливании.

**Показания к применению**

Симптоматическая терапия острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ) (повышение температуры тела (до 38°C), головная боль, заложенность носа, болезненность при глотании, кашель).

**Способы применения и дозы**

*Внутрь*

*Взрослым* по 1 саше-пакету 2-3 раза в день после еды.

Содержимое одного саше-пакета растворить в стакане горячей воды, полученный раствор медленно выпить.

Курс лечения 7-8 дней или по предписанию врача.

Приготовленный раствор хранению не подлежит.

**Специальные предупреждения**

Применять с осторожностью при заболеваниях сердечно-сосудистой системы, а также пациентам пожилого возраста.

С осторожностью применяют препарат при тяжелых нарушениях функции почек.

Препарат не содержит сахара, поэтому его можно применять больным сахарным диабетом и пациентам, которые находятся на гипокалорийной диете.

Если респираторное заболевание сопровождается затрудненным дыханием, лихорадкой, гнойной или кровавой мокротой, следует обратиться к врачу.

Препарат содержит аспартам, поэтому его применение не рекомендуется больным с фенилкетонурией.

Препарат содержит лактозу, если у Вас непереносимость некоторых сахаров, обратитесь к лечащему врачу перед приёмом данного препарата.

### **Применение в педиатрии**

Прием Инсти без сахара внутрь не рекомендован детям и подросткам младше 18 лет в связи с недостаточностью данных.

### **Беременность и период лактации**

Данные клинических исследований, подтверждающих эффективность и безопасность препарата у беременных и в период лактации, отсутствуют.

### **Побочные действия**

Определение частоты побочных явлений проводится в соответствии со следующими критериями: очень часто ( $\geq 1/10$ ), часто ( $\geq$  от  $1/100$  до  $< 1/10$ ), нечасто ( $\geq$  от  $1/1000$  до  $< 1/100$ ), редко ( $\geq 1/10000$  до  $< 1/1000$ ), очень редко ( $< 1/10000$ ), неизвестно (невозможно оценить на основании имеющихся данных).

*Очень редко*

- аллергические реакции на компоненты препарата, такие как тошнота, рвота, боль в животе, изжога, крапивница, бронхоспазм.

### **Противопоказания**

- повышенная индивидуальная чувствительность к компонентам препарата, а также салицилатам и другим нестероидным противовоспалительным препаратам нарушения свертываемости крови, гипокалиемия, бронхиальная астма, язвенная болезнь желудка и 12-перстной кишки, тяжелые нарушения функции печени и/или почек.
- врожденная непереносимость лактозы
- дефицит глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы
- детский возраст до 18 лет
- беременность и период лактации

### **Взаимодействия с другими препаратами**

Не рекомендуется одновременный прием с противокашлевыми препаратами, а также с лекарственными средствами, уменьшающими образование мокроты.

При одновременном приеме усиливает действие противосвертывающих средств и ацетилсалициловой кислоты.

*Особенности влияния лекарственных средств на способность управления транспортными средствами и потенциально опасными механизмами, и машинами.*

Не влияет

### **Передозировка**

О случаях передозировки препарата Инсти без сахара не сообщалось.

### **Форма выпуска и упаковка**

По 5.6 г гранул в саше-пакетах.

По 5/10 саше-пакетов вместе с инструкцией по медицинскому применению помещают в картонную пачку.

### **Условия хранения**

Хранить при температуре не выше 25°C.

Хранить в недоступном для детей месте!

**Срок хранения**

3 года

Не применять по истечении срока годности.

**Условия отпуска из аптек**

Без рецепта

**Держатель регистрационного удостоверения и производитель**



Хербион Пакистан Пвт Лтд

Промышленная зона Коранги, 30/28

г. Карачи, Пакистан

**За любой информацией о препарате следует обращаться к локальному представителю держателя регистрационного удостоверения.**

Herbion international Inc Armenia Representation, Eraz Bussiness Center, Azatutyanyan street 27, office 606, Republic of Armenia, Yerevan.