

ЛИСТОК - ВКЛАДЫШ

(Информация для потребителей)

БЕТАЦИД®

Мазь

Бетаметазон / Салициловая кислота

Следует прочитать внимательно этот листок-вкладыш, прежде чем начать принимать данный лекарственный препарат, так как он содержит важную информацию для Вас.

- Следует сохранить этот листок-вкладыш. Возможно его придется прочитать еще раз.
- Если у Вас возникнут какие-либо дополнительные вопросы, следует обратиться к лечащему врачу или фармацевту.
- Данный лекарственный препарат выписан для Вас. Не следует давать его другим лицам. Он может навредить им, даже если у них схожие симптомы.
- Если у Вас появились какие-либо побочные эффекты, обратитесь к вашему врачу или фармацевту. Возможны побочные эффекты, не перечисленные в этом листке-вкладыше (см.раздел 4).

Содержание листка-вкладыша:

1. Что такое Бетацид и для чего он применяется.
2. Что необходимо знать перед применением Бетацида.
3. Как принимать Бетацид.
4. Возможные побочные эффекты.
5. Как хранить Бетацид.
6. Содержимое упаковки и дополнительная информация.

1. Что такое Бетацид и для чего он применяется

Бетаметазон дипропионат и салициловая кислота являются активными веществами препарата Бетацид. Бетаметазон дипропионат относится к группе глюкокортикоидов для местного применения. Бетаметазон дипропионат относится к группе сильных глюкокортикоидов, которые применяются для уменьшения покраснения и зуда кожных покровов, вызванные определенными кожными заболеваниями. Салициловая кислота смягчает поверхностный слой роговых наслоений, вызванных кожными заболеваниями, что способствует проникновению бетаметазона дипропионата в более глубокие слои пораженной кожи и развитию лечебного эффекта.

Бетацид мазь применяется для лечения кожных заболеваний у детей и взрослых, при которых поверхность кожи покрыта роговым слоем. Бетацид мазь удаляет весь поверхностный роговой слой, уменьшает покраснение и зуд, вызванные определенными кожными заболеваниями.

2. Что необходимо знать перед применением Бетацида

Не применять Бетацид,

- если у Вас аллергия (гиперчувствительность) к бетаметазону дипропионату, салициловой кислоте или любому другому компоненту препарата (см. раздел 6).
- для лечения любых других кожных заболеваний, так как препарат может ухудшить их течение, особенно при лечении розацеи (дерматологическое заболевание, поражающее кожу лица), угрей, околоротового дерматита (воспаление кожи), генитального зуда, сыпи от подгузников, герпетической сыпи, ветряной оспы или других кожных заболеваний.

Особые указания и меры предосторожности

Если у вас псориаз, ваш врач должен регулярно пересматривать ваше лечение.

Обратитесь к врачу, если псориаз обостряется или под кожей появляются приподнятые бугорки, наполненные гноем.

Немедленно свяжитесь с врачом, если у вас или вашего ребенка возникло помутнение зрения или другие нарушения зрения.

Этот препарат не следует использовать под повязки или пластыри. Побочные эффекты, которые могут возникнуть при использовании ингаляционных или пероральных кортикостероидов, могут возникнуть и при использовании кортикостероидов на коже, особенно у младенцев и детей.

Если использовать большее количество мази и/или применять ее дольше, чем рекомендуется, это может повлиять на уровень некоторых гормонов в организме, особенно у младенцев и детей. У взрослых изменение уровня гормонов может редко приводить к одутловатости или округлости лица, слабости, усталости, головокружению при вставании или сидении.

Не курите и не приближайтесь к открытому огню - опасность сильных ожогов. Ткани (одежда, постельное белье, перевязочные материалы и т.д.), которые были в контакте с препаратом, легче воспламеняются и представляют серьезную опасность. Стирка одежды и постельных принадлежностей может уменьшить накопление продукта, но не удалить его полностью.

Если во время применения препарата состояние ухудшилось, проконсультируйтесь с врачом, назначившим препарат, возможно, у вас аллергическая реакция, инфекция или требуется другое лечение. Если вскоре после прекращения лечения, в течение 2 недель, у вас возникнет рецидив заболевания, не возобновляйте использование мази без консультации с врачом, если только он не посоветовал вам это сделать ранее. Если заболевание прошло, а при повторном применении покраснение выходит за пределы первоначально обработанного участка и возникает чувство жжения, обратитесь к врачу, прежде чем возобновлять лечение.

Дети

Если вы используете большее количество мази или применяете ее дольше, чем рекомендуется, это может повлиять на гормоны вашего ребенка.

В редких случаях это может привести к:

- Задержке роста и развития
- Одутловатости или округлости лица
- Повышению давления на мозг, которое может привести к:
 - выпячиванию родничка (мягкого участка в верхней части черепа) у младенцев
 - постоянной пульсирующей головной боли
 - нечеткости зрения или других нарушений зрения.

Беременность и кормление грудью

Если Вы беременны или кормите грудью, думаете, что можете быть беременны или при планировании беременности, проконсультируйтесь со своим лечащим врачом или фармацевтом перед тем, как принимать этот препарат.

Важная информация об ингредиентах, входящих в состав Бетацида

Препарат содержит:

- пропилпарабен, который может вызвать аллергические реакции отсроченного характера.

3. Как применять Бетацид мазь

Бетацид следует применять в точности так, как прописано врачом. Если у Вас есть какие-то сомнения, то вам следует проконсультироваться с лечащим врачом или фармацевтом.

Рекомендуемая доза

Обычно взрослым и детям Бетацид мазь нежно и полностью втирают тонким слоем на пораженные участки кожи два раза в день.

Вы должны придерживаться следующих рекомендаций при использовании Бетацида.

- Не следует наносить Бетацид на кожу лица более 5 дней.
- Не используйте большое количество препарата на большой участок кожи длительное время (например, каждый день в течении недель или месяцев)
- Следует избегать попадания Бетацида в глаза.

Применение у детей

Следует придерживаться рекомендаций, указанных выше. Не рекомендуется применять Бетацид на любой участок кожи ребенка более 5 дней. Не следует наносить препарат на подгузник ребенка, так как под ним усиливается всасывание активного вещества через кожу. Это может привести к риску избыточного всасывания препарата.

Если Вы применили больше Бетацида, чем Вам было рекомендовано

Если Вы (или кто-то другой) случайно проглотили препарат, это не должно привести к каким-либо проблемам, однако если у Вас есть какие-то сомнения, то вам следует проконсультироваться с врачом. Если Бетацид применять чаще, чем рекомендовано или дольше, чем предписано врачом, то он может негативно воздействовать на гормональную систему организма. У детей он может нарушить рост и развитие. Может также развиваться тошнота и/или рвота и шум в ушах.

Сообщите обязательно врачу или фармацевту, если Вы применяли Бетацид намного чаще, чем было рекомендовано или дольше, чем было предписано врачом или не применяли его так, как было предписано.

Если Вы забыли применить Бетацид

Если Вы забыли применить очередную дозу препарата, применяйте ее как только вспомните, затем продолжайте применение в прежнем режиме.

Если Вы прекращаете применение Бетацида

Если при длительном применении Бетацида наблюдается улучшение состояния кожи, не следует внезапно отменять применение препарата. Это может привести к покраснению кожи, чувству жжения и раздражения. Для избежания развития этих побочных эффектов, Вы должны обратиться к своему лечащему врачу, он пропишет Вам режим постепенного снижения частоты применения препарата до полного его прекращения.

Если у Вас есть дополнительные вопросы по применению препарата, обратитесь к лечащему врачу или фармацевту.

4. Возможные побочные эффекты

Как и другие лекарственные средства, Бетацид может вызвать побочные эффекты, хотя они и не появляются у каждого.

Большинство людей считают, что если придерживаться правильного режима применения препарата, это не приведет к каким-либо проблемам. Тем не менее, если препарат используется чаще прописанного, то могут развиваться следующие реакции:

- Истончение кожи, чувство жжения, образование волдырей, шелушение, отек, зуд, раздражение, кожная сыпь, сухость кожи и красные пятна. Эти симптомы чаще наблюдаются у младенцев и детей.
- Фолликулит, избыточный рост волос, снижение пигментации кожи и аллергические реакции.
- Дерматиты - воспалительное поражение кожи, возникающее в результате воздействия на нее внешних повреждающих факторов, например употребление моющих средств, при которых наблюдается покраснение и зуд кожи.
- Нечеткость зрения

Реакция отмены стероидов: при длительном применении стероидов может возникнуть реакция отмены, которая проявляется в виде некоторых или всех следующих признаков: покраснение кожи, которое может выходить за пределы первоначально обработанного

участка, чувство жжения или покалывания, сильный зуд, шелушение кожи, сочащиеся открытые язвы.

Отчетность о побочных эффектах

Если у Вас возникают какие-либо нежелательные реакции, проконсультируйтесь с врачом или фармацевтом. Данная рекомендация распространяется на любые возможные нежелательные реакции, в том числе на не перечисленные в листке-вкладыше. Вы также можете сообщить о нежелательных реакциях непосредственно в Научный центр экспертизы лекарств и медицинских технологий имени Академика Габриеляна МЗ РА по ссылке www.pharm.am (vigilance@pharm.am) или позвонить по номеру горячей линии: +374 (10) 20 05 05, +374 (96) 22 05 05.

5. Хранение препарата Бетацид

- Препарат следует хранить в недоступном для детей и сухом месте, при температуре не выше 25°C.
- Срок годности – 3 года. Не принимать Бетацид по истечении срока годности, указанного на упаковке препарата. При указании срока годности имеется в виду последний день указанного месяца.
- Не следует спускать лекарства в сточные воды или в канализацию. Спросите у фармацевта, как распорядиться с препаратом, который Вам больше не понадобится. Эти меры направлены на защиту окружающей среды.

6. Содержимое упаковки и дополнительная информация

Что содержит Бетацид

Каждый грамм содержит:

активные вещества: 0.5 мг бетаметазона (в форме дипропионата), 30 мг салициловой кислоты;

вспомогательные вещества: парафин жидкий, пропилпарабен, вазелин белый, этиловый спирт.

Внешний вид Бетацида и содержимое упаковки:

Мазь от белого до желтовато-белого цвета, без запаха.

Описание упаковки

15 г мази в тубах алюминиевых вместе с листком-вкладышем в пачке из картона.

Каковы условия отпуска Бетацида из аптек:

Отпускается по рецепту

Производитель

ООО "АРПИМЕД"

Республика Армения, Котайкская область, г. Абовян, 2-ой мкр 2204, дом 19

Тел.: 374 (222) 21703, 21740 Факс: 374 (222) 21924

Владелец регистрационного удостоверения

ООО "АРПИМЕД"

Республика Армения, Котайкская область, г. Абовян, 2-ой мкр 2204, дом 19

Тел.: 374 (222) 21703, 21740 Факс: 374 (222) 21924

Дата последнего пересмотра текста.