

Листок - вкладыш
(Информация для потребителей)

Бензил бензоат

25% эмульсия для наружного применения

Бензил бензоат

**Прочтите внимательно листок-вкладыш перед началом применения этого
лекарственного препарата**

Этот лекарственный препарат отпускается без назначения врача. Несмотря на это, для получения наилучших результатов лечения, Вам следует осторожно соблюдать инструкции к применению лекарственного препарата.

- Сохраните этот листок-вкладыш. У Вас может появиться необходимость прочитать ее снова.

- Если Вам необходима дополнительная информация или совет, спросите Вашего фармацевта

- Вам следует обратиться за помощью к врачу, если Ваши симптомы ухудшаются или не наблюдается их улучшение после использования Бензил бензоата.

- Если любое из побочных действий становится серьезным или заметите другие, не описанные в данном листке-вкладыше побочные действия, просим уведомить об этом Вашего врача или фармацевта.

Содержание листка-вкладыша:

1. Что такое Бензил бензоат и для чего он применяется
2. Что необходимо знать перед применением Бензил бензоата
3. Как принимать Бензил бензоат
4. Возможные побочные эффекты
5. Как хранить Бензил бензоат
6. Дополнительная информация

1. Что такое Бензил бензоат и для чего он применяется

Название препарата Бензил бензоат. Это эмульсия белого цвета со специфическим запахом. Активным веществом препарата Бензил бензоат 25% эмульсия является бензил бензоат в концентрации 25% в/об. Этот препарат используется для лечения чесотки и головного или платяного педикулеза.

Чесотка - это постоянные зудящие высыпания на коже, вызванные поражением кожи клещом. Зуд усиливается после купания и ночью. Чесотка широко поражает представителей всех рас и социальных классов.

Педикулез - это довольно распространенная проблема у детей школьного возраста в различных регионах мира. Представители женского пола всех возрастных групп чаще заражаются, чем мужчины. Не обнаружено какой-либо прямой корреляции между длиной волос и частотой заражения.

2. Что необходимо знать перед применением Бензил бензоата

Не применять Бензил бензоат, если

- у Вас аллергия (гиперчувствительность) к бензил бензоату или любому другому компоненту препарата (см. раздел 6)

Особые указания и меры предосторожности

- Умеренное покраснение и раздражение кожи на месте применения. В случае сильной реакции кожи, препарат следует смыть с помощью мыла и воды.
- Следует избегать попадания препарата на слизистые оболочки и в глаза!
- При отсутствии улучшения обратитесь к врачу

Другие лекарственные препараты и Бензил бензоат

- Проинформируйте своего врача, если Вы принимаете, недавно принимали или должны принимать любые другие препараты.

Беременность, кормление грудью и фертильность

Отсутствуют достаточные данные по применению бензил бензоата у беременных женщин, и у женщин, кормящих грудью, потенциальный риск применения бензил бензоата во время беременности и в период кормления грудью не установлен, но не может быть исключен.

Проконсультируйтесь со своим лечащим врачом или фармацевтом перед тем, как принимать любые другие препараты.

Важная информация об ингредиентах, входящих в состав Бензил бензоата

- Препарат содержит метилпарабен и пропилпарабен, которые могут вызывать аллергические реакции отсроченного характера.
- Препарат содержит пропиленгликоль, который может вызывать раздражение кожи.

Влияние на способность управления автомобилем и пользования механизмами

Не влияет, если следовать прописанным рекомендациям по применению.

3. Как принимать Бензил бензоат

• Лечение чесотки

Эмульсию тщательно втирают на все тело на ночь, начиная с ног на весь кожный покров, исключая голову и шею, в течение 2 ночей подряд. После втирания эмульсию оставляют на 8-12 часов каждую ночь, после чего можно повторить процедуру через 7 дней. В случае поражения головы, лица и/или шеи перед использованием препарата необходима консультация специалиста. После каждого применения следует тщательно вымыться и полностью сменить одежду и постельные принадлежности. Вся контактная одежда и постельные принадлежности, должны быть постираны и/или подвергнуты специальной обработке.

• Лечение педикулеза

Нанесите на пораженные участки и оставьте на 24 часа, затем тщательно промойте. В тяжелых случаях необходимо повторить процедуру 2 или 3 раза через 7 и 14 дней. Необходимо тщательно вымыться с полной сменой одежды и постельных принадлежностей. Всю контактирующую одежду и постельные принадлежности следует выстирать и/или отдать на специальную обработку.

• Дети и младенцы

Применение эмульсии бензил бензоата в данной возрастной группе возможно только путем разбавления с равным количеством воды для детей более старшего возраста и с 3 частями воды - для младенцев.

Если вы использовали большее количество Бензил бензоата, чем следует

Лечение отравления включает аспирацию и промывание желудка, а также соответствующие симптоматические меры.

Если Вы пропустили очередную процедуру нанесения Бензил бензоата

Нанесите, как только вспомните.

4. Возможные побочные эффекты

Применение бензил бензоата может вызывать раздражение глаз и слизистых оболочек (в том числе ноздрей, рта, губ, ушей и области гениталий). При случайном проглатывании или после излишнего местного применения 25% эмульсии бензил бензоата может возникнуть неконтролируемая дрожь всего тела. В случае сильной кожной реакции, препарат следует немедленно смыть, используя мыло и теплую воду. Если Вы испытываете любой из этих симптомов, обратитесь к врачу или фармацевту, а в более тяжелых случаях в ближайшее отделение скорой и неотложной помощи.

Отчетность о побочных эффектах:

Если Вы отметили какие-либо побочные эффекты, сообщите об этом своему лечащему врачу, провизору или фармацевту, в том числе и о побочных эффектах, не перечисленных в этом листке-вкладыше. Так же Вы можете сообщить о побочных эффектах компании ООО «Арпимед», перейдя на сайт www.arpimed.com и заполнить соответствующую форму «Сообщить о побочном действии или неэффективности лекарства» и в Научный центр экспертизы лекарств и медицинских технологий им. академика Э.Габриеляна, перейдя на сайт www.pharm.am в раздел “Сообщить о побочном эффекте лекарства” и заполнить форму “Карта сообщений о побочном действии лекарства”. Телефон горячей линии научного центра: +37410200505; +37496220505.

5. Как хранить Бензил бензоат

- Хранить в недоступном для детей месте.
- Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25⁰С.
- Срок годности – 3 года. Не использовать Бензил бензоат после истечения срока годности, указанного на этикетке препарата. При указании срока годности имеется в виду последний день указанного месяца.
- После вскрытия флакона использовать до истечения срока годности
- Следует избегать попадания препарата на слизистые оболочки и в глаза!
- **Не замораживать!**
- **Перед употреблением взбалтывать!**

Не следует спускать лекарства в сточные воды или в канализацию. Спросите у фармацевта, как распорядиться с препаратом, который Вам больше не понадобится. Эти меры направлены на защиту окружающей среды.

6. Дополнительная информация

Что содержит Бензил бензоат

1мл эмульсии содержит:

активное вещество: бензил бензоат – 250 мг

другие компоненты: стеариновая кислота, триэтаноламин, пропиленгликоль, глицерин, метилпарабен, пропилпарабен, вода очищенная.

Как выглядит Бензил бензоат и содержимое упаковки:

Эмульсия белого цвета со специфическим запахом.

Описание упаковки

120 мл 25% эмульсии для наружного применения в стеклянном флаконе янтарного цвета вместе с листком- вкладышем в пачке из картона.

Каковы условия отпуска Бензил бензоата из аптек

Отпускается без рецепта врача.

Производитель

ООО "АРПИМЕД"

Республика Армения, Котайкская область, г. Абовян, 2204, 2-ой мкр., дом 19

Тел.: 374 (222) 21703, 21740 Факс: 374 (222) 21924

Держатель регистрационного удостоверения

ООО "АРПИМЕД"

Республика Армения, Котайкская область, г. Абовян, 2204, 2-ой мкр., дом 19

Тел.: 374 (222) 21703, 21740 Факс: 374 (222) 21924

Дата последнего пересмотра текста