

Листок-вкладыш: Информация для потребителя

Лиотон® 1000 МЕ/г гель

Гепарина натриевая соль

Перед началом приема данного лекарственного препарата внимательно прочтите весь листок-вкладыш, так как в нем содержится важная для Вас информация.

Данный препарат всегда используйте в точности так, как описано в данном листке-вкладыше, или же так, как Вам объяснил лечащий врач или работник аптеки.

- Сохраните этот листок-вкладыш. Возможно, Вам понадобится прочесть его снова.
- Если Вам нужна дополнительная информация или совет, проконсультируйтесь у работника аптеки.
- При появлении у Вас каких-либо побочных действий обратитесь к лечащему врачу или работнику аптеки. Это касается также любых возможных побочных действий, не указанных в данном листке-вкладыше. См. раздел 4.
- Если в течение 7 дней улучшение не наступило или же Ваше самочувствие ухудшилось, обратитесь к врачу.

Содержание данного листка-вкладыша


1. Что представляет собой препарат Лиотон® 1000 МЕ/г гель и для чего он используется
2. Что необходимо знать перед началом приема препарата Лиотон® 1000 МЕ/г гель
3. Как применять препарат Лиотон® 1000 МЕ/г гель
4. Возможные побочные действия
5. Как хранить препарат Лиотон® 1000 МЕ/г гель
6. Содержимое упаковки и прочие сведения

1. Что представляет собой препарат Лиотон® 1000 МЕ/г гель и для чего он используется

Действующим веществом препарата Лиотон® 1000 МЕ/г гель является гепарин (в виде гепарина натриевой соли). Препарат Лиотон® 1000 МЕ/г гель выпускается в форме геля для нанесения на кожу. При нанесении на пораженные участки гепарин предотвращает образование тромбов в поверхностных венах, улучшает местную микроциркуляцию (циркуляция крови в мелких сосудах) и уменьшает отек.

Лиотон® 1000 МЕ/г гель применяется для:

- симптоматического лечения при заболеваниях поверхностных вен (такие, например, заболевания, для которых характерно варикозное расширение вен и их осложнения: образование тромбов в пораженных венах с воспалением или без воспаления стенки вен, воспаление тканей, окружающих вены, а также язвы, появляющиеся на коже в области варикозно расширенных вен);
- лечения при воспалении стенки вены, пораженной вследствие оперативных вмешательств;
- снижения выраженности явлений, имеющих место после оперативных вмешательств, проведенных на венах (например, синяки и отеки),
- устранения отеков и синяков в области суставов и мышц после их травм и растяжений.



Лиотон® 1000 МЕ/г гель можно использовать в качестве отдельно взятого препарата при наличии показаний к местному лечению или же в комбинации с системной терапией.

2. Что необходимо знать перед началом приема препарата Лиотон® 1000 МЕ/г гель

Не используйте препарат Лиотон® 1000 МЕ/г гель

- если у Вас аллергия на гепарина натриевую соль или на любой другой из компонентов данного лекарственного средства (перечислены в разделе 6).

Предупреждения и меры предосторожности

Перед использованием препарата Лиотон® 1000 МЕ/г гель обратитесь за консультацией к лечащему врачу, работнику аптеки:

- Если у Вас повышенная склонность к кровотечениям. В таком случае лечащий врач должен тщательно проанализировать возможность лечения с использованием препарата Лиотон® 1000 МЕ/г гель;
- Если у Вас после использования препарата Лиотон® 1000 МЕ/г гель появляются признаки аллергии (повышенной чувствительности). В этом случае использование препарата Лиотон® 1000 МЕ/г гель следует немедленно прекратить;
- Если у Вас в области, где должен наноситься препарат, есть открытые раны, кожные кровотечения или же имеет место кожная инфекция: на такие участки Лиотон® 1000 МЕ/г гель наносить не следует; Лиотон® 1000 МЕ/г гель также не следует использовать на участках, не покрытых кожей (например, половые органы, рот).

Дети и подростки

Лиотон® 1000 МЕ/г гель не следует применять у детей и подростков, поскольку безопасность и эффективность препарата в этой возрастной группе не выяснена.

Другие лекарственные средства и препарат Лиотон® 1000 МЕ/г гель

Если Вы используете, использовали в недавнем прошлом или, возможно, могли использовать какие-либо другие лекарственные средства, сообщите об этом своему врачу или работнику аптеки. Соблюдайте особую осторожность, если Вы принимаете антикоагулянты (т.е. лекарства для предотвращения образования тромбов). В этих случаях нанесение гепарина на кожу может способствовать удлинению времени свертывания крови.


Беременность, грудное вскармливание и детородная функция

Данные об использовании препарата Лиотон® 1000 МЕ/г гель в период беременности или лактации отсутствуют.

Если Вы беременны или кормите грудью, предполагаете, что беременны, или планируете беременность, перед приемом данного лекарственного средства обратитесь за консультацией к лечащему врачу или работнику аптеки.

Управление автотранспортными средствами и работа с механизмами

Лиотон® 1000 МЕ/г гель не оказывает влияния на способность к управлению транспортными средствами и обслуживанию механизмов.



В препарате Лиотон® 1000 МЕ/г гель содержатся метилпарагидроксибензоат (E218), пропилпарагидроксибензоат (E216), неролиевый ароматизатор и лавандиновое масло

В данном препарате в качестве консервантов содержатся метилпарагидроксибензоат (E218) и пропилпарагидроксибензоат (E216). Они могут вызывать аллергические реакции, возможно, замедленного типа.

В состав данного лекарственного препарата входят ароматизаторы, в которых содержатся цитраль, цитронеллол, кумарин, D-лимонен, фарнезол, гераниол и линалоол. Вещества цитраль, цитронеллол, кумарин, D-лимонен, фарнезол, гераниол и линалоол могут вызывать аллергические реакции.

В препарате Лиотон® 1000 МЕ/г гель содержится этанол

В этом лекарственном препарате содержится 233 мг спирта (этанола) в каждом г геля. Этанол может вызывать чувство жжения на поврежденной коже.

3. Как применять препарат Лиотон® 1000 МЕ/г гель

Всегда принимайте данный препарат строго в соответствии с рекомендациями лечащего врача или работника аптеки. При появлении сомнений посоветуйтесь с лечащим врачом или работником аптеки.

Дозировка и способ применения

Наносите гель на пораженный участок от одного до трех раз в сутки и втирайте легкими массирующими движениями. Рекомендуется выдавливать из тюбика полоску геля длиной 3-10 сантиметров.

Если симптомы усугубились или же по истечении 7 дней улучшения не наступило, Вы должны обратиться к врачу.

Если Вы нанесли препарат Лиотон® 1000 МЕ/г гель в большем количестве, чем Вам следовало

Сообщений о случаях передозировки препарата Лиотон® 1000 МЕ/г гель не поступало. В случае ее возникновения действие гепарина можно нейтрализовать с помощью протамина сульфата.

Если Вы забыли нанести препарат Лиотон® 1000 МЕ/г гель


Если Вы забыли использовать Лиотон® 1000 МЕ/г гель, нанесите препарат как только Вы вспомните об этом. Не используйте препарат в двойной дозе для восполнения пропущенного приема.

Если у Вас имеются какие-либо дополнительные вопросы относительно применения данного препарата, обратитесь к своему врачу или работнику аптеки.

4. Возможные нежелательные реакции

Как и все лекарственные средства, данный препарат может вызывать нежелательные реакции, хотя они возникают не у всех.

Аллергические реакции на гепарин после его нанесения на кожу наблюдаются очень редко (менее чем у 1 из 10 000 пациентов, получавших лечение).



В единичных случаях (неизвестно: на основании имеющихся данных частота оценке не поддается) могут развиться реакции повышенной чувствительности – такие, как покраснение кожи и зуд. Эти реакции, обычно, быстро исчезают после отмены препарата.

Сообщение о побочных действиях

При появлении у Вас каких-либо побочных действий обратитесь к лечащему врачу или работнику аптеки. Это касается также любых возможных побочных действий, не указанных в данном листке-вкладыше. Вы также можете сообщить о побочном действии непосредственно через национальную систему оповещения. Сообщая о побочных действиях, Вы можете помочь собрать больше информации о безопасности данного лекарственного препарата.

5. Как хранить препарат Лиотон® 1000 МЕ/г гель

Хранить препарат в невидном и недоступном для детей месте.

Хранить ниже 25°C.

Срок годности после первого вскрытия тубы: 6 месяцев.

Не используйте это лекарственное средство по истечении срока годности, указанного на внешней упаковке и тубе после слов «годен до». Датой истечения срока годности является последний день месяца.

Никакие лекарственные препараты не выбрасывайте в канализацию. В отношении утилизации уже ненужного Вам лекарственного препарата проконсультируйтесь у работника аптеки. Эти меры способствуют защите окружающей среды.

6. Содержимое упаковки и прочие сведения

Состав препарата Лиотон® 1000 МЕ/г гель

- Действующим веществом является гепарина натриевая соль: 1000 МЕ (международных единиц) на 1 г геля.
- Прочие компоненты: этанол 96%-й, карбомер, троламин, метилпарагидроксibenзоат, пропилпарагидроксibenзоат, неролиевый ароматизатор (в нем содержатся линалоол, D-лимонен, гераниол, цитраль, цитронеллол и фарнезол), масло лавандиновое (в нем содержатся линалоол, D-лимонен, гераниол и кумарин), вода очищенная.

Внешний вид препарата Лиотон® 1000 МЕ/г гель и содержимое упаковки

Препарат Лиотон® 1000 МЕ/г гель применяется путем нанесения на кожу.

Препарат Лиотон® 1000 МЕ/г гель представляет собой гель вязкой консистенции, бесцветный или слегка желтоватого цвета, почти прозрачный, с ароматным запахом.

Лекарственное средство выпускается в тубах по 30 г, 50 г и 100 г геля. В продаже могут находиться упаковки не всех размеров.

Владелец регистрационного удостоверения

А. Менарини Индустриэ Фармачеутике Риунитэ с.р.л., Виа Сеттэ Санти 3, 50131 Флоренция, Италия

Производитель

А. Менарини Мэньюфкчеринг Лоджистикс энд Сервисиз с.р.л., Виа Сеттэ Санти 3, 50131

Флоренция, Италия

Уполномоченный представитель:

Берлин-Хеми АГ

Глиникер Вег 125

12489 Берлин, Германия

Дата последней редакции данного листка-вкладыша: июнь 2022 г.