

ИНСТРУКЦИЯ
по медицинскому применению препарата
АнвиМакс®

Торговое наименование: АнвиМакс®

Лекарственная форма: порошок для приготовления раствора для приема внутрь [лимонный, лимонный с медом, малиновый, черносмородиновый].

Состав

Действующие вещества: парацетамол – 360 мг, аскорбиновая кислота – 300 мг, кальция глюконат моногидрат – 100 мг, римантадина гидрохлорид – 50 мг, рутозид (рутин) – 20 мг, лоратадин – 3 мг; *вспомогательные вещества:* аспартам, гипромеллоза, кремния диоксид коллоидный, лактоза, ароматизатор пищевой [лимон или лимон с медом, или малиновый, или черносмородиновый].

Описание

Содержимое пакетика – смесь гранул почти белого цвета с порошком желтовато-зеленоватого цвета с характерным запахом (лимона, лимона с медом, малины, черной смородины).

Раствор после растворения порошка – бесцветный или с желтоватым оттенком, слегка мутный раствор с характерным запахом (лимона, лимона с медом, малины, черной смородины). Допускается наличие нерастворенных частиц желтого цвета.

Фармакотерапевтическая группа

ОРЗ и «простуды» симптомов средство устранения.

Код АТХ: R05X.

Фармакологические свойства

Комбинированный препарат, обладает противовирусным и интерферогенным, жаропонижающим, противовоспалительным, обезболивающим, антигистаминным, ангиопротекторным действием.

Парацетамол обладает жаропонижающим, противовоспалительным и обезболивающим действием.

Аскорбиновая кислота участвует в регуляции окислительно-восстановительных процессов, углеводного обмена, проницаемости капилляров, свертываемости крови, регенерации тканей, активирует иммунные реакции.

Кальция глюконат моногидрат предотвращает развитие повышенной проницаемости и ломкости сосудов, обуславливающих геморрагические процессы при гриппе и острой респираторной вирусной инфекции (ОРВИ), а также восстанавливает капиллярное кровообращение, оказывает антиаллергическое действие.

Римантадина гидрохлорид обладает противовирусной активностью в отношении вируса гриппа типа А (особенно А2), уменьшает токсические проявления, вызванные вирусами гриппа других типов и вирусами, вызывающими ОРВИ. Обладает выраженными интерферогенными свойствами, повышая общее содержание интерферонов и особенно интерферона-гамма в крови, усиливает защитные свойства препарата от вирусной инфекции, повреждающей дыхательные пути.

Рутозид (рутин) является ангиопротектором. Уменьшает проницаемость капилляров, отечность и воспаление, укрепляет сосудистую стенку. Тормозит агрегацию и увеличивает степень деформации эритроцитов.

Лоратадин обладает выраженным антигистаминным действием, предупреждает развитие отека тканей, связанного с высвобождением гистамина.

Показания к применению

Этиопатогенетическое и симптоматическое лечение гриппа, ОРВИ, лихорадочных состояний вследствие вирусного поражения дыхательных путей у взрослых и детей старше 12 лет.

Противопоказания

Гиперчувствительность к одному или нескольким компонентам, входящим в состав препарата; эрозивно-язвенные поражения ЖКТ в фазе обострения; желудочно-кишечные кровотечения; гемофилия; геморрагический диатез; гипопротромбинемия; портальная гипертензия; авитаминоз К; почечная недостаточность; беременность, период лактации; тиреотоксикоз, острые заболевания почек, печени (острый гломерулонефрит, острый пиелонефрит, острый гепатит, либо обострение хронических заболеваний данных органов); хронический алкоголизм. Ограничение применения при эпилепсии, церебральном атеросклерозе.

Способ применения и дозы

Внутрь.

Растворить содержимое одного пакетика в 1 стакане кипяченой горячей воды.

Употреблять в горячем виде. Перед употреблением раствор размешать.

Взрослым и детям старше 12 лет: принимать по одному пакетiku, 2-3 раза в день после еды, в течение 3-5 дней (не более 5 дней), до исчезновения симптомов болезни.

Если в течение 3 дней после начала приема препарата не наблюдается улучшения самочувствия, прием препарата следует прекратить и обратиться к врачу.

Побочное действие

В соответствии с входящими в состав компонентами.

Со стороны ЦНС. Редко повышенная возбудимость, тремор, гиперкинезия.

Со стороны ЖКТ. При длительности приема более 7 дней, возможные повреждения слизистой оболочки желудка и двенадцатиперстной кишки, диспепсия, сухость во рту, анорексия, метеоризм, диарея.

Со стороны системы крови. В частности, при длительности приема более 7 дней, агранулоцитоз, лейкопения, тромбоцитопения, нейтропения, анемия.

Аллергические реакции. Редко, возможны кожная сыпь, зуд, крапивница.

В случае появления симптомов побочного действия, немедленно прекратить прием данного препарата и обратиться к врачу.

Передозировка

Симптомы: в первые 24 ч возможны бледность, тошнота, рвота и боль в эпигастральной области, тремор, сонливость, тахикардия, увеличение билирубина в крови, нарушение обмена веществ, обострение сопутствующих хронических заболеваний.

Лечение: вызвать рвотный рефлекс, промывание желудка, прием адсорбентов, симптоматическая терапия.

Необходимо обратиться к врачу.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами

При необходимости совместного приема с другими лекарственными средствами, проконсультируйтесь с лечащим врачом.

Не рекомендуется назначать с антикоагулянтами, глюкокортикоидными препаратами, гепатотоксическими средствами, барбитуратами, противосудорожными средствами, рифампицином, алкоголем.

При одновременном назначении с метоклопрамидом возможно увеличение абсорбции.

При одновременном применении с производными кумарина возможно развитие небольшой гипопротромбинемии.

Особые указания

Длительность применения - не более 5 дней. При длительном применении (свыше 7 дней) возможно обострение хронических сопутствующих заболеваний, у пожилых пациентов с артериальной гипертензией повышается риск развития геморрагического инсульта (за счет входящего в состав препарата римантадина гидрохлорида).

Не применять при наличии метастазирующих опухолей.

При непереносимости лактозы следует учитывать, что каждый пакетик препарата АнвиМакс® содержит 4086 мг лактозы моногидрата.

В состав лекарственного препарата входит аспартам, который является источником фенилаланина и противопоказан пациентам с фенилкетонурией.

Не назначать детям до 12-летнего возраста.

Применение при беременности и в период грудного вскармливания

Беременность

Применение препарата противопоказано во время беременности.

Лактация

Применение препарата в период грудного вскармливания противопоказано. При необходимости применения препарата в период лактации следует решить вопрос о прекращении грудного вскармливания.

Форма выпуска

По 5 г порошка для приготовления раствора для приема внутрь [лимонного] или [лимонного с медом], или [малинового], или [черносмородинового] в пакетиках термосвариваемых из материала пленочного комбинированного, либо из материала пленочного комбинированного многослойного, либо из материала комбинированного «буфлен».

3, 6, 8, 12 или 24 пакетика с инструкцией по применению в пачке из картона.

Условия хранения

В защищенном от света месте при температуре не выше 25 °С. Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности

2 года.

Не использовать по истечении срока годности, указанного на упаковке.

Условия отпуска

Отпускают без рецепта.

Владелец регистрационного удостоверения/организация, принимающая претензии

ООО «АнвиЛаб»

Россия, 141302, Московская обл., Сергиево-Посадский муниципальный р-н, городское поселение Сергиев Посад, г. Сергиев Посад, ул. Фестивальная, д. 10.

Тел./факс: +7(495) 921-43-42.

Производитель

АО «Фармпроект»

Россия, 192236, г. Санкт-Петербург, ул. Софийская, д. 14, лит. А.

Тел./факс: +7(812) 331-93-10.