

Листок-вкладыш - информация для пациента
Фурацилин Татфарм, 20 мг, таблетки для приготовления раствора для местного и
наружного применения
Действующее вещество: Нитрофурал

Перед применением препарата полностью прочитайте листок-вкладыш, поскольку в нем содержатся важные для Вас сведения.

- Всегда применяйте препарат в точности с листком-вкладышем или рекомендациями лечащего врача или работника аптеки;
- Сохраните листок-вкладыш. Возможно, Вам потребуется прочитать его еще раз;
- Если Вам нужны дополнительные сведения или рекомендации, обратитесь к работнику аптеки;
- Если у Вас возникли какие-либо нежелательные реакции, обратитесь к лечащему врачу, или работнику аптеки. Данная рекомендация распространяется на любые возможные нежелательные реакции, в том числе на не перечисленные в разделе 4 листка-вкладыша.
- Если состояние не улучшается или оно ухудшается, через 4-5 дней от начала применения препарата, Вам следует обратиться к врачу.

Содержание листка-вкладыша

1. Что из себя представляет препарат Фурацилин Татфарм и для чего его применяют.
2. О чем следует знать перед применением препарата Фурацилин Татфарм.
3. Применение препарата Фурацилин Татфарм.
4. Возможные нежелательные реакции.
5. Хранение препарата Фурацилин Татфарм
6. Содержимое упаковки и прочие сведения.

1. Что из себя представляет препарат Фурацилин Татфарм и для чего его применяют

Препарат Фурацилин Татфарм содержит действующее вещество нитрофурал.

Нитрофурал – противомикробное средство для лечения бактериальных инфекций.

Показания к применению

Наружно: гнойные раны, пролежни, ожоги II-III степени, мелкие повреждения кожи (в том числе ссадины, царапины, трещины, порезы).

Местно: блефарит, конъюнктивит, остеомиелит, эмпиема придаточных пазух носа и плевры, инфекции мочевыводящих путей (промывание полостей), острый тонзиллит, стоматит, гингивит.

2. О чем следует знать перед применением препарата Фурацилин Татфарм

Противопоказания

Не применяйте препарат Фурацилин Татфарм, если у Вас одно из перечисленных заболеваний/состояний:

- аллергия на нитрофурал, производные нитрофурана и/или на другие компоненты препарата, перечисленных в разделе 6 листка-вкладыша;
- кровотечение;
- аллергодерматозы;
- выраженные нарушения функции почек.

Если любое из приведенных выше состояний относится к Вам, сообщите об этом врачу или работнику аптеки, прежде чем применять препарат Фурацилин Татфарм.

Особые указания и меры предосторожности

Перед применением препарата Фурацилин Татфарм проконсультируйтесь с лечащим врачом или работником аптеки.

Применение препарата при тяжелых ожогах на больших поверхностях: при нарушении функции почек возможно прогрессирование почечной недостаточности (уремия, нарушение водно-электролитного баланса, метаболический ацидоз).

Другие препараты и препарат Фурацилин Татфарм

Несовместим с эпинефрином (адреналин), прокаинам (новокаин), тетракаином, резорцинолом (резорцин) и другими восстановителями, так как разлагается с образованием окрашенных в розовый или буроватый цвет продуктов. Несовместим с калия перманганатом, перекисью водорода и другими окислителями вследствие окисления препарата.

Беременность и грудное вскармливание

Если Вы беременны или кормите грудью, думаете, что забеременели, или планируете беременность, перед началом применения препарата проконсультируйтесь с лечащим врачом или работником аптеки.

Применение препарата при беременности и в период грудного вскармливания возможно, если предполагаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода или ребенка.

Управление транспортными средствами и работа с механизмами

Препарат не влияет на способность управлять транспортными средствами, работать с механизмами и заниматься другими потенциально опасными видами деятельности, требующими повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций.

3. Применение препарата Фурацилин Татфарм

Всегда применяется препарат в полном соответствии с листком-вкладышем или с рекомендациями лечащего врача, работника аптеки. При появлении сомнений посоветуйтесь с лечащим врачом или работником аптеки.

Путь и способ введения

Наружно, местно.

Применяют в виде водного 0,02 % (1:5000) раствора. Раствор фурацилина готовят непосредственно перед применением.

Для приготовления 0,02 % водного раствора фурацилина 1 таблетку (20 мг) растворяют в 100 мл дистиллированной или кипяченой воды. Для более быстрого растворения рекомендуется горячая вода. Затем раствор охлаждают до комнатной температуры.

Наружно:

При гнойных ранах, пролежнях, ожогах II-III степени – орошают раны водным раствором фурацилина и накладывают влажные повязки.

Местно:

При остеомиелите – после операции промывают полость водным раствором фурацилина и накладывают влажную повязку.

При эмпиеме придаточных пазух носа (в том числе при гайморите) - промывают водным раствором фурацилина гайморову и другие околоносовые пазухи.

При эмпиеме плевры – после удаления гноя проводят промывание плевральной полости и вводят 20-100 мл водного раствора фурацилина.

Для промывания мочеиспускательного канала и мочевого пузыря - применяют водный раствор фурацилина с экспозицией 20 мин.

При блефарите, конъюнктивите – инстилляцией водного раствора фурацилина в конъюнктивальный мешок.

При остром тонзиллите, стоматите, гингивите – полоскание рта и горла теплым водным раствором фурацилина по 100 мл 2-3 раза в день.

Продолжительность терапии

Продолжительность лечения – по показаниям в зависимости от характера и локализации пораженного участка.

Применяйте препарат только согласно тому способу применения и в тех дозах, которые указаны в листке-вкладыше.

При наличии вопросов по применению препарата обратитесь к лечащему врачу или работнику аптеки.

4. Возможные нежелательные реакции

Подобно всем лекарственным препаратам Фурацилин Татфарм может вызывать нежелательные реакции, однако они возникают не у всех.

Возможны аллергические реакции. При наружном применении – зуд кожи, дерматиты, требующие временного перерыва или прекращения применения препарата.

Если любые из указанных в листке-вкладыше нежелательных реакций усугубляются, или отмечаются любые другие, не указанные в листке-вкладыше, следует немедленно сообщить об этом врачу.

Сообщение о нежелательных реакциях

Если у Вас возникают какие-либо нежелательные реакции, проконсультируйтесь с врачом или работником аптеки.

Данная рекомендация распространяется на любые возможные нежелательные реакции, в том числе на не перечисленные в листке-вкладыше. Вы также можете сообщить о нежелательных реакциях напрямую (см. ниже). Сообщая о нежелательных реакциях, Вы помогаете получить больше сведений о безопасности препарата.

Армения

«НАУЧНЫЙ ЦЕНТР ЭКСПЕРТИЗЫ ЛЕКАРСТВ И МЕДИЦИНСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ
ИМ. АКАДЕМИКА Э. ГАБРИЕЛЯНА» АОЗТ

Отдел мониторинга безопасности лекарств

Горячая линия: (+374 10) 20-05-05, (+ 374 96) 22-05-05

e-mail: vigilance@pharm.am

Электронную версию карты сообщения можно найти на сайте www.pharm.am

Российская Федерация

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор)

Адрес: 109012, г. Москва, Славянская площадь, д. 4, стр. 1

Телефон: +7 800 550 99 03

Электронная почта: pharm@roszdravnadzor.gov.ru

Сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:
<http://www.roszdravnadzor.gov.ru/>

5. Хранение препарата Фурацилин Татфарм

Хранить в защищенном от света месте при температуре не выше 25 °С.

Хранить в недоступном для детей месте.

Не применяйте препарат после истечения срока годности (срока хранения), указанного на контурной ячейковой упаковке, картонной пачке после «Годен до:». Датой истечения срока годности является последний день данного месяца.

Датой истечения срока годности является последний день данного месяца.

Не выбрасывайте препарат в канализацию. Уточните у работника аптеки, как следует утилизировать препарат, который больше не потребуется. Эти меры позволят защитить окружающую среду.

6. Содержимое упаковки и прочие сведения

Препарат Фурацилин Татфарм содержит

Действующим веществом является нитрофуран.

Каждая таблетка содержит 20 мг нитрофура.

Прочим ингредиентом (вспомогательным веществом) является натрия хлорид.

Внешний вид препарата Фурацилин Татфарм и содержимое его упаковки

Таблетки для приготовления раствора для местного и наружного применения.

Круглые плоскоцилиндрические таблетки желтого или зеленовато-желтого цвета с неравномерной окраской поверхности с фаской и риской.

По 10 таблеток в контурную безъячейковую упаковку из материала упаковочного комбинированного на бумажной основе.

По 10 таблеток в контурную ячейковую упаковку из пленки поливинилхлоридной и фольги алюминиевой печатной лакированной.

Контурные безъячейковые упаковки с равным количеством листов-вкладышей помещают в ящик или коробку из картона гофрированного.

Контурные ячейковые упаковки с равным количеством листов-вкладышей помещают в ящик или коробку из картона гофрированного.

Условия отпуска

Без рецепта

Держатель регистрационного удостоверения и производитель

АО «Татхимфармпрепараты», Россия

420091, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Беломорская, д. 260

тел.: +7 (843) 526-98-88

e-mail: marketing@tatpharm.ru

За любой информацией о препарате, а также в случаях возникновения претензий следует обращаться к представителю держателя регистрационного удостоверения или держателю регистрационного удостоверения.

АО «Татхимфармпрепараты», Россия

420091, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Беломорская, д. 260

тел.: +7 (843) 526-98-88

e-mail: marketing@tatpharm.ru

Листок-вкладыш пересмотрен