

ԴԵՂԻ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ՀՐԱՀԱՆԳ
(ՆԵՐՂԻՐ-ԹԵՐԹԻԿ)
ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ՊԱՅԻՆՏԻ ՀԱՄԱՐ

Ռեսպերո Միրտոլ ֆորտե, աղելույծ փափուկ դեղապատիճ, 300 մգ
նիվենու, քաղցր նարնջի, մրտենու և կիտրոնի զտված եթերային յուղերի
խառնուրդի թորվածք

Նախքան դեղի կիրառումը ուշադիր կարդացեք ներդիր-թերթիկն ամբողջությամբ, քանի որ այն պարունակում է կարևոր տեղեկատվություն:

- Պահեք այս ներդիր-թերթիկը: Հնարավոր է այն կրկին կարդալու կարիք լինի:
- Եթե ունեք լրացուցիչ հարցեր, դիմեք բուժող բժշկին, դեղագետին կամ բուժքրոջը:
- Այս դեղը բժիշկը նշանակել է անձամբ Ձեզ: Չի կարելի այն փոխանցել այլ անձանց: Դեղը կարող է վնասել նրանց, եթե նույնիսկ հիվանդության ախտանիշները համընկնում են:
- Եթե ի հայտ է եկել որևէ կողմնակի ազդեցություն, այդ թվում՝ նաև այնպիսին, որը ներառված չէ այս ներդիր-թերթիկի 4-րդ բաժնում, դիմեք բուժող բժշկին, դեղագետին կամ բուժքրոջը:

Ինչ բովանդակություն ունի այս ներդիր-թերթիկը

1. Ինչ է Ռեսպերո Միրտոլ ֆորտե դեղը և ինչի համար է այն օգտագործվում:
2. Ինչ պետք է իմանալ Ռեսպերո Միրտոլ ֆորտե դեղն օգտագործելուց առաջ:
3. Ինչպես օգտագործել Ռեսպերո Միրտոլ ֆորտե դեղը:
4. Ինչպիսի կողմնակի ազդեցություններ կարող են առաջանալ:
5. Ինչպես պահել Ռեսպերո Միրտոլ ֆորտե դեղը:
6. Ինչ է պարունակում դեղի փաթեթը և այլ տեղեկություններ:

1. ԻՆՉ Է ՌԵՍՊԵՐՈ ՄԻՐՏՈԼ ՖՈՐՏԵ ԴԵՂԸ ԵՎ ԻՆՉԻ ՀԱՄԱՐ Է ԱՅՆ ՕԳՏԱԳՈՐԾՎՈՒՄ

Ռեսպերո Միրտոլ ֆորտե դեղը կիրառվում է սուր և քրոնիկական բրոնխիտի ու սինուսիտի բուժման համար: Այն թեթևացնում է նաև սինուսիտի (օրինակ՝ ցավ դեմքի շրջանում, քթի լցվածություն) և բրոնխիտի (օրինակ՝ հագ) հիմնական ախտանիշները: Ռեսպերո Միրտոլ ֆորտե դեղը նոսրացնում է մածուցիկ խորիւր, մեծացնում է մուկոցիլիար արտազատումը, նպաստում է խորիւր դուրսբերմանը և ցուցաբերում է հակաբորբոքային ազդեցություն:

2. ԻՆՉ ՊԵՏՔ Է ԻՄԱՆԱԼ ՌԵՍՊԵՐՈ ՄԻՐՏՈԼ ՖՈՐՏԵ ԴԵՂՆ ՕԳՏԱԳՈՐԾԵԼՈՒՑ ԱՌԱՋ

Մի օգտագործեք Ռեսպերո Միրտոլ ֆորտե դեղը, եթե՝

- ունեք ալերգիա ակտիվ բաղադրատարրի կամ օժանդակ նյութերից որևէ մեկի (թվարկված են ներդիր-թերթիկի 6-րդ բաժնում) նկատմամբ,
- ունեք ստամոքս-աղիքային ուղու բորբոքային հիվանդություն և լեղուղիների հիվանդություն կամ լյարդի ծանր հիվանդություն:

Ռեսպերո Միրտոլ ֆորտե դեղը չի կարելի նշանակել 6 տարեկանից ցածր երեխաներին:

Կիրառման հատուկ հրահանգներ և նախազգուշացումներ

Ռեսպերո Միրտոլ ֆորտե դեղն օգտագործելուց առաջ խորհրդակցեք բուժող բժշկի կամ դեղագետի հետ:

Եթե ախտանիշները չեն վերանում կամ վատթարանում են, կամ առաջացել է հևոց կամ տենդ, կամ առաջացել է արյուն կամ թարախ պարունակող խորխ, ապա պետք է անհապաղ դիմել բժշկի:

Հատուկ նախազգուշացումներ

Եթե ունեք բրոնխային ասթմա, կապույտ հազ կամ շնչառական համակարգի արտահայտված զգայունությամբ ուղեկցվող շնչուղիների հիվանդություն, Ռեսպերո Միրտոլ ֆորտե դեղը կարող եք ընդունել միայն բուժող բժշկի հետ խորհրդակցելուց հետո:

Ռեսպերո Միրտոլ ֆորտե դեղը պարունակում է սորբիտոլ (E 420): Եթե ունեք ֆրուկտոզի հազվադեպ ժառանգական անտանելիություն, ապա այս դեղը չի կարելի ընդունել:

Ռեսպերո Միրտոլ ֆորտե դեղի և այլ դեղերի միաժամանակյա կիրառում

Ռեսպերո Միրտոլ ֆորտե դեղի բուժական դեղաչափերի կիրառման դեպքում փոխազդեցությունների վերաբերյալ հաղորդումներ չեն ստացվել:

Տեղեկացրեք բուժող բժշկին կամ դեղագետին, եթե ընդունում եք կամ վերջերս ընդունել եք որևէ այլ դեղ:

Հղիություն և կրծքով կերակրման շրջան

Եթե հղի եք կամ կարծում եք, որ հղի եք, կամ կրծքով կերակրում եք, կամ պատրաստվում եք հղիանալ, Ռեսպերո Միրտոլ ֆորտե դեղն ընդունելուց առաջ խորհրդակցեք բուժող բժշկի կամ դեղագետի հետ:

Քանի որ հղիների շրջանում Ռեսպերո Միրտոլ ֆորտե դեղի կիրառման փորձը բացակայում է, այն անհրաժեշտ է օգտագործել միայն բժշկի կողմից ռիսկի և օգուտի մանրակրկիտ գնահատումից հետո:

Հաշվի առնելով, որ Ռեսպերո Միրտոլ ֆորտե դեղը լուծվում է ճարպերում, մեծ է հավանականությունը, որ այն կներթափանցի կրծքի կաթ: Սակայն, կենդանիների շրջանում իրականացված հետազոտությունները ցույց են տվել, որ կրծքով կերակրվող ձագերի պլազմայում կոնցենտրացիաները հայտնաբերման սահմանից ցածր են:

Ինչպես կրծքով կերակրման շրջանում կիրառվող ցանկացած դեղի դեպքում, Ռեսպերո Միրտոլ ֆորտե դեղի կիրառումից առաջ նույնպես անհրաժեշտ է խորհրդակցել բժշկի հետ:

Ազդեցությունը փոխադրամիջոցներ վարելու և սարքավորումների հետ աշխատելու կարողության վրա

Փոխադրամիջոցներ վարելու և սարքավորումներ կառավարելու կարողությունների վրա բացասական ազդեցության վերաբերյալ տվյալները բացակայում են:

3. ԻՆՉՊԵՍ ՕԳՏԱԳՈՐԾԵԼ ՌԵՍՊԵՐՈ ՄԻՐՏՈԼ ՖՈՐՏԵ ԴԵԼԸ

Ռեսպերո Միրտոլ ֆորտե դեղը միշտ անհրաժեշտ է օգտագործել բուժող բժշկի հրահանգներին խիստ համապատասխան: Եթե համոզված չեք, թե ինչպես պետք է դեղն ընդունել, խորհրդակցեք բուժող բժշկի կամ դեղագետի հետ:

Թույլատրելի դեղաչափ

Եթե Ռեսպերո Միրտոլ ֆորտե դեղը նշանակված չէ այլ կերպ, ապա խորհուրդ է տրվում այն օգտագործել հետևյալ դեղաչափերով՝

Հիվանդության սուր ընթացքի դեպքում 6–12 տարեկան երեխաները պետք է օգտագործեն մեկ դեղապատիճ օրական 1–3 անգամ, իսկ հիվանդության քրոնիկական ընթացքի դեպքում՝ մեկ դեղապատիճ օրական 1–2 անգամ:

Հիվանդության սուր ընթացքի դեպքում 12 տարեկանից բարձր դեռահասները և չափահասները պետք է օգտագործեն մեկ դեղապատիճ օրական 3–4 անգամ, իսկ հիվանդության քրոնիկական ընթացքի դեպքում՝ մեկ դեղապատիճ օրական 2–3 անգամ:

Ռեսպերո Միրտոլ ֆորտե դեղի դեղապատիճները պետք ընդունել ամբողջական՝ առանց ծամելու, ուտելուց կես ժամ առաջ և մեծ քանակությամբ սառը հեղուկով: Վերջին դեղաչափը կարելի է ընդունել քնելուց առաջ:

Ռեսպերո Միրտոլ ֆորտե դեղը չի կարելի նշանակել 6 տարեկանից ցածր երեխաներին:

Ռեսպերո Միրտոլ ֆորտե դեղի կիրառման տևողությունը կախված է ախտանիշներից: Շնչուղիների քրոնիկական հիվանդության դեպքում հնարավոր է երկարատև բուժում:

Եթե Ռեսպերո Միրտոլ ֆորտե դեղն ավելի շատ եք օգտագործել, քան թույլատրելի է Տեղեկացրեք բուժող բժշկին, նա կորոշի, թե ինչ միջոցառումներ են անհրաժեշտ:

Եթե մոռացել եք օգտագործել Ռեսպերո Միրտոլ ֆորտե դեղը

Մի ընդունեք կրկնակի դեղաչափ բաց թողնվածը լրացնելու նպատակով:

Եթե դադարեցրել եք Ռեսպերո Միրտոլ ֆորտե դեղի ընդունումը

Ռեսպերո Միրտոլ ֆորտե դեղը կանոնավոր ընդունեք՝ ըստ բուժող բժշկի նշանակած տևողության:

Մի դադարեցրեք Ռեսպերո Միրտոլ ֆորտե դեղի ընդունումն առանց բժշկի հետ խորհրդակցելու:

Եթե դեղի ընդունման հետ կապված հարցեր ունեք, դիմեք բուժող բժշկին կամ դեղագետին:

4. ԻՆՉՊԻՄԻ ԿՈՂՄՆԱԿԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՐՈՂ ԵՆ ԱՌԱՋԱՆԱԼ

Ինչպես բոլոր դեղերը, Ռեսպերո Միրտոլ ֆորտե դեղը նույնպես կարող է առաջացնել կողմնակի ազդեցություններ, թեև ոչ բոլոր պացիենտների շրջանում դրանք կարող են դրսևորվել:

Ոչ հաճախ (կարող են ի հայտ գալ ոչ ավելի հաճախ, քան 100 պացիենտից մեկի մոտ) գրանցվում են ստամոքս-աղիքային խանգարումների (օրինակ՝ ցավ ստամոքսում/անհանգստություն էպիգաստրալ հատվածում) և համի փոփոխության հետ կապված գանգատներ:

Հազվադեպ (կարող են ի հայտ գալ ոչ ավելի հաճախ, քան 1000 պացիենտից մեկի մոտ) հաղորդվել է սրտխառնոցի, փսխման կամ փորլուծության դեպքերի, ինչպես նաև գերզգայնության ռեակցիաների (օրինակ՝ մաշկի ցան, քոր, դեմքի այտուց, հևոց կամ արյան շրջանառության խանգարում) մասին:

Շատ հազվադեպ (կարող են ի հայտ գալ ոչ ավելի հաճախ, քան 10000 պացիենտից մեկի մոտ) հնարավոր է երիկամներում կամ լեղապարկում առկա քարերի շարժունակության մեծացում:

Կողմնակի ազդեցությունների վերաբերյալ հաղորդում

Կողմնակի ազդեցության ի հայտ գալու դեպքում խորհրդակցեք բժշկի, դեղագետի կամ բուժքրոջ հետ: Սա վերաբերում է նաև այս ներդիր-թերթիկում չնշված որևէ այլ կողմնակի ազդեցությանը: Դուք կարող եք կողմնակի ազդեցությունների, այդ

թվում՝ դեղերի անարդյունավետության մասին ուղղակիորեն առցանց հաղորդել ՀՀ ԱՆ Դեղերի և բժշկական տեխնոլոգիաների փորձագիտական կենտրոն՝ հետևյալ հղումով. www.pharm.am կամ զանգահարել թեժ գիծ. հեռախոսահամարներ՝ (+374 10) 20 05 05 և (+374 96) 22 05 05:

Կողմնակի ազդեցությունների մասին հաղորդելով՝ Դուք նպաստում եք այս դեղի անվտանգության վերաբերյալ լրացուցիչ տեղեկատվության ապահովմանը:

5. ԻՆՉՊԵՍ ՊԱՀԵԼ ՌԵՍՊԵՐՈ ՄԻՐՏՈԼ ՖՈՐՏԵ ԴԵՂԸ

Պահել երեխաների համար անհասանելի տեղում:

Դեղը չի կարելի կիրառել բլիստերի կամ ստվարաթղթե տուփի վրա նշված պիտանիության ժամկետի ավարտից հետո:

Պիտանիության ժամկետի ավարտը հանդիսանում է ամսվա վերջին օրը:

Պահել 25°C-ից ոչ բարձր ջերմաստիճանի պայմաններում, խոնավությունից պաշտպանված տեղում՝ դեղի տուփի մեջ:

Դեղերը չի կարելի նետել կոյուղու կամ կենցաղային թափոնների մեջ: Զօգտագործված դեղերի հետ վարվելու մասին հարցրեք դեղագետին: Այս միջոցառումներն ուղղված են շրջակա միջավայրի պահպանությանը:

6. ԻՆՉ Է ՊԱՐՈՒՆԱԿՈՒՄ ԴԵՂԻ ՓԱԹԵԹԸ ԵՎ ԱՅԼ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

6.1 Ռեսպերո Միրտոլ ֆորտե դեղը պարունակում է.

Ակտիվ բաղադրատարր՝ նիվենու, քաղցր նարնջի, մրտենու և կիտրոնի զտված եթերային յուղերի խառնուրդի թորվածքը՝ 300 մգ:

Օժանդակ նյութեր՝ Կանոլայի զտված յուղ, ժելատին, գլիցերին 85%, սորբիտոլի 70% լուծույթ (չբյուրեղացող), նոսրացված աղաթթու, հիպրոմելոզի ագետատի սուկցինատ, տրիէթիլ ցիտրատ, նատրիումի լաուրիլսուլֆատ, տալկ, դեքստրին, ամոնիումի գլիցիրիդատ:

6.2 Ինչ տեսք ունի Ռեսպերո Միրտոլ ֆորտե դեղը և ինչ է պարունակում փաթեթը

Անգույնից մինչև դեղնավուն, օվալաձև, թափանցիկ փափուկ ժելատինե դեղապատիճներ:

Տուփը պարունակում է 20, 50 կամ 100 դեղապատիճ:

10 դեղապատիճները տեղադրված են լամինացված և ալյումինե նրբաթիթեղից պատրաստված շրջագծված, բնիկավոր տուփի մեջ:

2, 5 կամ 10 բլիստերները տեղադրված են ստվարաթղթե տուփի մեջ՝ ներդիր-թերթիկի հետ միասին:

Գրանցման հավաստագրի իրավատեր և արտադրող

Գ. Պոհլ-Բոսկամպ ԳմբՀ ընդ Կո.ԿԳ

Գերմանիա

25551, Հոհենլոկշտեդտ

Կիլեր Շտրասե 11

Հեռ.՝ +49 (0) 4826 / 59 0

Ֆաքս՝ +49 (0) 4286 / 59 109

Էլ. փոստ՝ info@pohl-boskamp.de

Գրանցման հավաստագրի իրավատիրոջ ներկայացուցիչ

Հայաստանի Հանրապետություն

Բեռլին-Քեմի ԱԳ հայաստանյան ներկայացուցչություն

ք. Երևան, 0010, Արամի 4, բն. 3

Հեռ.՝ +(374 11) 500-771, +(374 11) 500- 773

Ֆաքս՝ +(374 11) 500- 772

Էլ. փոստ՝ office-armenia@berlin-chemie.com

Ներդիր-թերթիկի վերանայման ամսաթիվ

ЛИСТОК-ВКЛАДЫШ - ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПАЦИЕНТА

Респиро Миртол форте, 300 мг, мягкие кишечнорастворимые капсулы
Дистиллят смеси ректифицированных эфирных масел эвкалипта, апельсина
сладкого, мирта и лимона

Перед применением препарата внимательно полностью прочитайте листок-вкладыш, поскольку в нем содержатся важные для вас сведения.

- Сохраните листок-вкладыш. Возможно, вам потребуется прочитать его еще раз.
- Если у вас возникли дополнительные вопросы, обратитесь к лечащему врачу, или работнику аптеки, или медицинской сестре.
- Препарат назначен именно вам. Не передавайте его другим людям. Он может навредить им, даже если симптомы их заболевания совпадают с вашими.
- Если у вас возникли какие-либо нежелательные реакции, обратитесь к лечащему врачу, или работнику аптеки, или медицинской сестре. Данная рекомендация распространяется на любые возможные нежелательные реакции, в том числе на не перечисленные в разделе 4 листка-вкладыша.

СОДЕРЖАНИЕ ЛИСТКА-ВКЛАДЫША

1. Что из себя представляет препарат Респиро Миртол форте и для чего его применяют.
2. О чем следует знать перед применением препарата Респиро Миртол форте.
3. Применение препарата Респиро Миртол форте.
4. Возможные нежелательные реакции.
5. Хранение препарата Респиро Миртол форте.
6. Содержимое упаковки и прочие сведения.

1. ЧТО ИЗ СЕБЯ ПРЕДСТАВЛЯЕТ ПРЕПАРАТ РЕСПИРО МИРТОЛ ФОРТЕ И ДЛЯ ЧЕГО ЕГО ПРИМЕНЯЮТ

Данный лекарственный препарат используется для лечения острых и хронических бронхитов и синуситов, а также он облегчает основные симптомы синусита (например, боль в области лица, заложенность носа) и бронхита (например, кашель). Он разжижает вязкую мокроту, повышает мукоцилиарный клиренс, способствует отделению мокроты и оказывает противовоспалительное действие.

2. О ЧЕМ СЛЕДУЕТ ЗНАТЬ ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ ПРЕПАРАТА РЕСПИРО МИРТОЛ ФОРТЕ

Не принимайте Респиро Миртол форте:

- если у вас есть аллергия на активное вещество или какие-либо другие компоненты данного препарата;

- если у вас есть воспалительное желудочно-кишечное заболевание и заболевание желчевыводящих путей, либо тяжелое заболевание печени.

Этот препарат нельзя назначать детям младше 6 лет.

Особые указания и меры предосторожности

Перед применением препарата Респиро Миртол форте проконсультируйтесь с лечащим врачом или работником аптеки.

Если симптомы не исчезают или усугубляются, или если у вас появилась одышка или лихорадка, или если у вас появилась мокрота, содержащая кровь или гной, вам следует незамедлительно обратиться к врачу.

Особые предупреждения

Если вы страдаете бронхиальной астмой, коклюшем или заболеванием дыхательных путей, сопровождающимися выраженной повышенной чувствительностью дыхательной системы, вы можете принимать этот препарат только после консультации с вашим врачом.

Данный препарат содержит сорбитол (Е 420). Если у вас редкая наследственная непереносимость фруктозы вам не следует принимать данный препарат.

Другие препараты и препарат Респиро Миртол форте

При применении в терапевтических дозах о взаимодействии не сообщалось.

Пожалуйста, сообщите своему врачу или фармацевту, если вы принимаете или недавно принимали любые другие лекарства.

Беременность и грудное вскармливание

Если вы беременны или кормите грудью, думаете, что забеременели, или планируете беременность, перед началом применения препарата проконсультируйтесь с лечащим врачом или работником аптеки.

Поскольку опыт применения данного препарата у беременных женщин отсутствует, его следует принимать только после тщательной оценки риска и пользы, выполненной врачом.

Учитывая способность этого препарата растворяться в жирах, высока вероятность его проникновения в грудное молоко. Однако испытания на животных показали, что концентрация в плазме ниже предела обнаружения у вскармливаемого потомства. Как и с любыми лекарствами во время кормления грудью, перед применением препарата Респиро Миртол форте следует проконсультироваться с врачом.

Управление транспортными средствами и работа с механизмами.

Данные о негативном воздействии на способность водить транспортное средство или управлять механизмами отсутствуют.

3. ПРИМЕНЕНИЕ ПРЕПАРАТА РЕСПЕРО МИРТОЛ ФОРТЕ

Всегда принимайте препарат в полном соответствии с рекомендациями лечащего врача. При появлении сомнений посоветуйтесь с лечащим врачом или работником аптеки.

Рекомендуемая доза

Если не назначено иное, рекомендуется использовать препарат в следующих дозах:

При острой форме заболевания: дети в возрасте 6–12 лет должны принимать по 1 капсуле 1–3 раза в сутки; при хронической форме заболевания: по 1 капсуле 1–2 раза в сутки.

При острой форме заболевания: подростки и взрослые лица старше 12 лет должны принимать по 1 капсуле 3–4 раза в сутки; при хронической форме заболевания: по 1 капсуле 2–3 раза в сутки.

Капсулы Респеро Миртол форте следует принимать, не разжевывая, за полчаса до приема пищи, запивая большим количеством холодной жидкости. Последнюю дозу можно принять перед сном.

Этот препарат нельзя назначать детям младше 6 лет.

Продолжительность приема препарата Респеро Миртол форте зависит от симптомов. При наличии хронического заболевания дыхательных путей возможна длительная терапия.

Если вы приняли препарата Респеро Миртол форте больше, чем следовало

Проинформируйте своего врача, и он сможет принять решение о необходимых мерах.

Если Вы забыли принять препарат Респеро Миртол форте

Не принимайте двойную дозу, чтобы компенсировать пропущенную дозу.

Если вы прекратили прием препарата Респеро Миртол форте

Принимайте Респеро Миртол форте регулярно и до тех пор, пока ваш врач это рекомендует.

Не прекращайте прием Респеро Миртол форте, не посоветовавшись предварительно с врачом.

При наличии вопросов по применению препарата обратитесь к лечащему врачу или работнику аптеки.

4. ВОЗМОЖНЫЕ НЕЖЕЛАТЕЛЬНЫЕ РЕАКЦИИ

Подобно всем лекарственным препаратам препарат может вызывать нежелательные реакции, однако они возникают не у всех.

Нечасто (у 1 из 100 человек) отмечаются жалобы на нарушения со стороны желудочно-кишечного тракта (например, боль в желудке/дискомфорт в области эпигастрия) и изменения вкуса.

В редких случаях (у 1 из 1000 человек) сообщалось о тошноте, рвоте или диарее, а также реакциях повышенной чувствительности (например, кожная сыпь, зуд, отек лица, одышка или нарушение кровообращения).

В очень редких случаях (у не более 1 из 10 000 людей) возможно повышение подвижности существующих камней в почках или желчном пузыре.

Сообщение о нежелательных реакциях

Если у вас возникают какие-либо нежелательные реакции, проконсультируйтесь с лечащим врачом или работником аптеки. Данная рекомендация распространяется на любые возможные нежелательные реакции, в том числе на не перечисленные в листке-вкладыше.

Вы также можете сообщить о нежелательных реакциях, включая сообщения о неэффективности лекарственных препаратов, выявленным на территории Армении, непосредственно через национальную систему сообщения о нежелательных реакциях.

Сообщая о нежелательных реакциях, вы помогаете получить больше сведений о безопасности препарата.

5. ХРАНЕНИЕ ПРЕПАРАТА РЕСПЕРО МИРТОЛ ФОРТЕ

Храните препарат в недоступном для детей месте.

Не применяйте препарат после истечения срока годности, указанного на блистере или картонной коробке.

Датой истечения срока годности является последний день месяца.

Хранить в оригинальной упаковке в защищенном от влаги месте, при температуре не выше 25 °C.

Не выбрасывайте лекарства в канализацию или бытовые отходы. Спросите у фармацевта, как утилизировать лекарства, которые вы больше не применяете. Эти меры помогут защитить окружающую среду.

6. СОДЕРЖИМОЕ УПАКОВКИ И ПРОЧИЕ СВЕДЕНИЯ

Препарат Респеро Миртол форте содержит

Действующим веществом является: дистиллят смеси ректифицированных эфирных масел эвкалипта, апельсина сладкого, мирта и лимона, 300 мг.

Вспомогательными веществами являются: рапсовое рафинированное масло; желатин, глицерин 85%, раствор сорбитола 70% (некристаллизующийся), разбавленная соляная кислота, гипромеллозы ацетата сукцинат, триэтилцитрат, натрия лаурилсульфат, тальк, декстрин, аммония глицирризинат.

Внешний вид Респеро Миртол форте и содержимое упаковки

Прозрачные мягкие желатиновые капсулы от бесцветного до желтоватого цвета, овальной формы.

Упаковка содержит 20, 50 или 100 капсул:

По 10 капсул помещают в контурную ячейковую упаковку из ламинированной и алюминиевой фольги.

По 2, 5 или 10 блистерных упаковок вместе с инструкцией по применению в картонной коробке.

Владелец регистрационного удостоверения и производитель

Г. Поль-Боскамп ГмбХ и Ко. КГ (G. Pohl-Boskamp GmbH & Co. KG)

Килер штрассе 11 (Kieler Strasse 11)

25551 Хоенлокштедт, Германия (25551 Hohenlockstedt, Germany)

Телефон: +49 (0) 4826 / 59 0

Факс: +49 (0) 4286 / 59 109

Адрес электронной почты: info@pohl-boskamp.de

Местный представитель

Республика Армения

Представительство Берлин-Хеми АГ

0010, г.Ереван, ул. Арами 4; кв.3

Телефон: +(374 11) 500-771, +(374 11) 500-773

Факс: +(374 11) 500-772

Эл. почта: office-armenia@berlin-chemie.com

Разрешения в других государствах-членах ЕАЭС

Россия: Респерио Миртол форте № П N013662/01

Беларусь: ГелоМиртол форте № 7982/06/12/13/17/19

Киргизия: Гело Миртол форте № KG.1.3.270.08833-2021

Казахстан: Респерио Миртол форте № РК-ЛС-5№025045

Дата последней редакции листка-вкладыша: xxx 2024 г.