

ИНСТРУКЦИЯ

по медицинскому применению препарата

СТРЕПТОЦИД

Торговое название препарата: Стрептоцид

Международное непатентованное название: Сульфаниламид (sulfanilamide)

Лекарственная форма: Порошок для наружного применения.

Описание: Белый или почти белый с желтоватым оттенком кристаллический порошок без запаха.

Состав: каждый пакетик содержит: *активное вещество* – 0,3 г сульфаниламида; *вспомогательные вещества* отсутствуют.

Фармакотерапевтическая группа: противомикробные средства для наружного применения; сульфаниламиды.

Код АТХ: D06BA05

Фармакологические свойства

Фармакодинамика

Антибактериальное средство для местного применения, производное сульфаниламида. Обладает широким спектром противомикробного действия. Сульфаниламид - один из первых представителей химиотерапевтических средств группы сульфаниламидов. Оказывает бактериостатическое действие путем ингибирования бактериального синтеза дигидрофолиевой кислоты. Механизм действия связан с конкурентным антагонизмом с пара-аминобензойной кислотой и конкурентным угнетением дигидроптероатсинтетазы, что приводит к нарушению синтеза тетрагидрофолиевой кислоты, необходимой для синтеза пуринов и пиримидинов.

Сульфаниламид активен в отношении грамположительных и грамотрицательных бактерий: *Escherichia coli*, *Shigella spp.*, *Vibrio cholerae*, *Clostridium perfringens*, *Bacillus anthracis*, *Corynebacterium diphtheriae*, *Yersinia pestis*, *Chlamydia spp.*, *Actinomyces israelii*, *Toxoplasma gondii*.

Фармакокинетика

При местном применении возможно отсутствие всасывания или незначительное всасывание в системный кровоток через воспаленную кожу. Степень всасывания зависит также от размеров пораженных участков кожи.

Показания к применению

Инфицированные поверхностные раны различной этиологии, ожоги (I-II ст.), фолликулиты, фурункул, карбункул, рожистые воспаления, др. гнойно-воспалительные процессы кожи.

Способ применения и режим дозирования

Применяется наружно путем непосредственного нанесения на пораженные участки кожи. Количество наносимого препарата зависит от размеров очага поражения - от 1 до 5-и пакетика, сверху накладывают обычную повязку; перевязки производят через 1-2 дня.

Противопоказания

Гиперчувствительность к действующему веществу или к группе сульфаниламидов, заболевания кроветворной системы, угнетение костномозгового кроветворения, анемия, хроническая сердечная недостаточность, тиреотоксикоз, почечная, печеночная недостаточность, азотемия, порфирия, врожденный дефицит глюкозо-6-

фосфатдегидрогеназы, беременность, период грудного вскармливания, детский возраст до 18 лет (для данной формы выпуска).

Применение при беременности и кормлении грудью

Противопоказан к применению во время беременности и в период кормления грудью. Перед применением препарата необходимо обратиться к врачу.

Побочные действия

Со стороны пищеварительной системы: тошнота, рвота, диарея.

Со стороны системы кроветворения: редко - эозинофилия, тромбоцитопения, лейкопения, гипопротромбинемия, агранулоцитоз.

Со стороны ЦНС и периферической нервной системы: в единичных случаях - нарушение зрения, головная боль, головокружение, периферическая нейропатия, атаксия.

Прочие: кожные аллергические реакции; редко - нефротоксические реакции (наиболее вероятны у пациентов с нарушениями функции почек); кристаллурия. В единичных случаях - гипотиреозидизм.

Передозировка

При местном применении препарата не отмечалось развития симптомов передозировки.

Особые указания и меры предосторожности

Перед назначением пациенту препарата желательно определить чувствительность к нему микрофлоры, вызвавшей заболевание у данного больного. При появлении реакций повышенной чувствительности лечение следует прекратить.

С осторожностью применять у пациентов с нарушениями функции почек. В период лечения необходимо обильное щелочное питье.

При длительном лечении рекомендуется систематический контроль картины крови, функции почек и печени.

Влияние на способность управлять транспортными средствами, механизмами

Исследования влияния препарата на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами не проводилось.

Учитывая побочные действия лекарственного средства (головокружение) следует соблюдать осторожность при управлении транспортными средствами, механизмами.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами

Миелотоксические лекарственные средства усиливают проявления гематотоксичности препарата.

Упаковка

По 10 пакетиков в полиэтиленовой упаковке.

Условия хранения

Хранить при температуре не выше 25°C, недоступном для детей месте.

Не применять препарат после окончания срока годности, указанного на упаковке!

Срок годности – 2 года.

Условия отпуска из аптек – Отпускается без рецепта врача.

Держатель регистрационного удостоверения и производитель

ООО “ЭСКО-ФАРМ”

Республика Армения, Ереван 0079, V Нор Норкский массив, ул. Микояна 13

Тел.: (+37410) 673903, E-mail: farm-esco@mail.ru