

ИНСТРУКЦИЯ ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ПРЕПАРАТА

Аллохол

Торговое наименование: Аллохол

Лекарственная форма: таблетки, покрытые оболочкой. Описание: таблетки круглые, двояковыпуклые, покрытые оболочкой светло-желтого цвета. На поперечном разрезе видны три слоя: ядро – серо-черного цвета с вкраплениями; средний слой – белого цвета и наружный светло-желтого цвета.

Состав: на одну таблетку:

активные вещества: желчь крупного рогатого скота сухая – 80 мг; чеснок сушеный – 40 мг; уголь активированный – 25 мг; крапивы листья – 5 мг.

вспомогательные вещества (ядро): магния оксид (магния окись) – 11 мг, крахмал картофельный – 43 мг, тальк – 3 мг, кремния диоксид коллоидный (аэросил) – 1 мг, кальция стеарат – 2 мг.

вспомогательные вещества (оболочка): сахароза (сахар) – 164 мг, магния гидроксикарбонат (магния карбонат основной) – 35 мг, кремния диоксид коллоидный (аэросил) – 2 мг, титана диоксид – 3 мг, повидон (поливинилпирролидон) – 2 мг, тальк – 3 мг, краситель тропеолин О – 0,04 мг, воск пчелиный – 0,2 мг.

Фармакотерапевтическая группа: желчегонное средство.

Код АТХ: Отсутствует.

Фармакологические свойства

Фармакодинамика

Желчегонное (холекинетическое и холеретическое) средство, снижает процессы гниения и брожения в кишечнике. Усиливает секреторную функцию клеток печени, рефлекторно повышает секреторную и двигательную активность органов желудочно-кишечного тракта (ЖКТ).

Усиливает образование желчи и желчных кислот.

Действие желчи обусловлено рефлекторным влиянием на секреторную функцию паренхимы печени. Желчь также усиливает секреторную и двигательную функцию ЖКТ. Вещества, содержащиеся в чесноке, усиливают секреторную и моторную функцию ЖКТ, стимулируют секрецию желчи.

Листья крапивы обладают желчегонными и противовоспалительными свойствами.

Уголь активированный является адсорбентом, связывающим токсические вещества в ЖКТ.

Фармакокинетика

Аллохол хорошо всасывается в ЖКТ. Холевая и хенодзоксихолевая кислоты, содержащиеся в Аллохоле, подвергаются метаболизму в печени: конъюгируют с аминокислотами, секретируются в желчь, откуда вновь выделяются в кишечник, затем частично реабсорбируются; остальная часть выводится через кишечник.

Показания к применению

В составе комплексной терапии при хроническом реактивном гепатите, холангите, бескаменном (некалькулезном) холецистите, дискинезии желчевыводящих путей по гипокинетическому типу, атоническом запоре, постхолецистэктомическом синдроме.

Противопоказания

Гиперчувствительность, калькулезный холецистит, обтурационная желтуха, острый гепатит, острая и подострая дистрофия печени, язвенная болезнь желудка и 12-перстной кишки (в фазе обострения), острый панкреатит, детский возраст до 12 лет, дефицит

сахарозы/изомальтазы, непереносимость фруктозы, глюкозо-галактозная мальабсорбция (так как в составе сахараза).

С осторожностью

Сахарный диабет (в составе препарата содержится сахараза).

Способ применения и дозы

Внутрь, после еды, по 1-2 таблетки 3-4 раза в сутки в течение 3-4 недель.

Детям старше 12 лет – по 1 таблетке 3 раза в день (после еды) в течение 3-4 недель.

Повторные курсы проводят с интервалом в 3 мес.

Побочное действие

Диарея, аллергические реакции, повышение активности «печеночных» трансаминаз в сыворотке крови.

Передозировка

Возможны диарея, тошнота, изжога, кожный зуд. Лечение симптоматическое.

Взаимодействие с другими лекарственными препаратами

Препараты, содержащие алюминия гидроксид, колестирамин, колестипол снижают абсорбцию и уменьшают эффект препарата. Одновременный прием нецелесообразен.

Применение при беременности и в период лактации

Применение препарата в периоды беременности и лактации возможно по рекомендации врача, когда польза для матери больше, чем риск для плода или ребенка.

Влияние препарата на выполнение потенциально опасных видов деятельности, требующих особого внимания и быстрых реакций

Препарат не влияет на способность управлять автомобилем и на выполнение потенциально опасных видов деятельности, требующих особого внимания и быстрых реакций.

Форма выпуска

Таблетки, покрытые оболочкой.

По 50 таблеток в банку из полимерных материалов.

По 10 таблеток в контурную ячейковую упаковку из пленки поливинилхлоридной и фольги алюминиевой печатной лакированной.

1 банку из полимерных материалов вместе с инструкцией по медицинскому применению помещают в пачку из картона.

Контурные ячейковые упаковки вместе с равным количеством инструкций по медицинскому применению помещают в групповую упаковку.

Условия хранения

Хранить в сухом месте, при температуре не выше 25°C.

Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности

4 года.

По истечении срока годности препарат не применять.

Условия отпуска

Отпускают без рецепта.

Производитель/ Организация, принимающая претензии потребителей
ОАО «Ирбитский химфармзавод»
623856, Россия, Свердловская обл., г. Ирбит, ул. Кирова, д. 172.
Тел/факс: (34355) 3-60-90.

Адрес производства:

Свердловская обл., г. Ирбит, ул. Карла Маркса, д. 124а.

Генеральный директор
ОАО «Ирбитский химфармзавод»



Л. А. Абросимова