

1. Наименование лекарственного препарата

МАСЛО КАМФОРНОЕ

1.1. Дозировка

100 мг/мл

1.2. Лекарственная форма

Раствор для наружного применения

2. Качественный и количественный состав

Активное вещество: 10 г камфора;

вспомогательное вещество: подсолнечное масло до 100 мл.

3. Описание лекарственной формы

Маслянистая прозрачная жидкость желтого цвета с сильным запахом камфоры.

4. Клинические данные

4.1. Показания к применению

Препарат показан к применению у взрослых для симптоматического лечения мышечно-суставных болей, профилактики развития пролежней.

4.2. Режим дозирования и способ применения

Применяется местно. Препарат следует наносить на чистые и неповрежденные участки кожи. При нанесении раствора следует избегать травмирующих кожу движений. Обработка больших поверхностей тела не рекомендована.

При мышечно-суставных болях наносят наружно на область поражения 2-3 раза в день.

Для профилактики образования пролежней раствор наносят на локализованные участки покраснения кожи 2-3 раза в день.

Не рекомендуется применять препарат более 7 дней.

4.3. Противопоказания

- повышенная индивидуальная чувствительность к компонентам препарата;
- нарушение целостности кожных покровов, воспалительные заболевания кожи в месте нанесения (такие как дерматит, экзема);
- склонность к судорожным состояниям
- период беременности и лактация;
- детский возраст до 18 лет.

4.4. Особые указания и меры предосторожности при применении

Перед применением необходимо нанести небольшое количество лекарственного препарата на небольшой участок кожи. При этом не должна возникать боль. В случае возникновения боли, отека или высыпаний на коже необходимо прекратить применение и обратиться к врачу.

Не следует наносить препарат на открытые раны, в области глаз и слизистые оболочки. При случайном попадании на слизистые оболочки или в глаза необходимо промыть пораженные участки большим количеством воды.

После применения раствора необходимо тщательно вымыть руки теплой водой с мылом. После нанесения раствора не рекомендуется применять местное тепло (грелки, пакеты с горячей водой) в связи с увеличением риска возникновения кожных реакций.

При применении препарата следует избегать вдыхания.

4.5. Взаимодействие с другими лекарственными препаратами и другие виды взаимодействия

Клинически значимое взаимодействие с какими-либо другими лекарствами не описано.

4.6. Фертильность, беременность и лактация

Безопасность применения препарата Камфорное масло во время беременности и в период лактации не установлена.

Применение препарата во время беременности и в период лактации противопоказано. Не следует наносить препарат на кожу молочной железы во время лактации.

4.7. Влияние на способность управлять транспортными средствами и работать с механизмами

Влияние препарата на способность управлять транспортными средствами и работать с механизмами не изучалось. Рекомендуется соблюдать осторожность при управлении транспортными средствами и работе с опасными механизмами.

4.8. Нежелательные реакции

Возможно развитие нежелательных реакций: аллергические кожные реакции (крапивница), раздражение кожи, головная боль, головокружение.

4.9. Передозировка

При соблюдении рекомендуемого способа применения случаи передозировки неизвестны.

При случайном приеме лекарственного препарата могут возникать симптомы передозировки: желудочно-кишечные (тошнота, рвота, диарея, боли в животе) и неврологические (головная боль, головокружение, ощущение жара/приливы, судороги, угнетение дыхания и кома).

Лечение симптоматическое, включая противосудорожную терапию. При передозировке Камфорой не следует вызывать рвоту из-за рисков, связанных с последующей ингаляцией камфоры и развитием ларингоспазма, который может привести к летальному исходу.

5. Фармакологические свойства

Фармакотерапевтическая группа: Прочие препараты для местного применения при суставной и мышечной боли

Код АТХ - M02AX10

5.1. Фармакодинамические свойства

Препарат оказывает антисептическое, местнораздражающее, местное анальгезирующее и противовоспалительное действие.

5.2. Фармакокинетические свойства

При нанесении на поверхность кожи частично всасывается.

Подвергается окислению.

Продукты окисления соединяются с глюкуроновой кислотой и выводятся почками. Часть камфоры выделяется в неизмененном виде легкими и с желчью.

6. Фармацевтические свойства

6.1. Перечень вспомогательных веществ

- подсолнечное масло

6.2. Несовместимость

Нет данных

6.3. Срок годности

2 года.

6.4. Особые меры предосторожности при хранении

Хранить при температуре не выше 25°C, защищенном от света и недоступном для детей месте.

6.5. Характер и содержание первичной упаковки

Во флаконах из стекла или пластика по 30мл.

6.6. Особые меры предосторожности при уничтожении использованного лекарственного препарата или отходов, полученных после применения лекарственного препарата или работы с ним

Нет особых требований к утилизации.

7. Держатель Регистрационного Удостоверения

ООО “Эско-Фарм”

Республика Армения, Ереван 0079, V Нор Норкский массив, ул. Микояна 13

Тел.: (+37410) 673903

E-mail: farm-esco@mail.ru

8. Номер регистрационного удостоверения

18807

9. Дата подтверждения регистрации

29.10.2018

10. Дата пересмотра текста

Март, 2024г.