

Листок-вкладыш: Информация для пациента/потребителя
КЛОТРИМАЗОЛ, 10 мг/г, крем
Клотримазол

Перед применением препарата полностью прочитайте листок-вкладыш, поскольку в нем содержатся важные для вас сведения.

Всегда применяйте препарат в точности с данным листком-вкладышем или рекомендациями лечащего врача или фармацевта.

- Сохраните листок-вкладыш. Возможно, вам потребуется прочитать его еще раз.
- Если вам нужны дополнительные сведения или рекомендации, обратитесь к фармацевту.
- Если у вас возникли какие-либо нежелательные реакции, обратитесь к лечащему врачу или фармацевту. Данная рекомендация распространяется на любые возможные нежелательные реакции, в том числе на не перечисленные в разделе 4 листка-вкладыша.
- Если состояние не улучшается или оно ухудшается, через 7 дней вам следует обратиться к врачу.

Содержание листка-вкладыша

1. Что из себя представляет препарат Клотримазол и для чего его применяют
2. О чем следует знать перед применением препарата Клотримазол
3. Применение препарата Клотримазол
4. Возможные нежелательные реакции
5. Хранение препарата Клотримазол
6. Содержимое упаковки и прочие сведения

1. Что из себя представляет препарат Клотримазол и для чего его применяют

Клотримазол представляет собой крем, который содержит действующее вещество клотримазол. Клотримазол обладает широким противогрибковым спектром действия, уничтожает грибки, вызывающие кожные заболевания. Препарат предназначен для наружного лечения грибковых заболеваний кожи, в том числе грибка стоп.

Показания к применению

- Дерматомикозы, вызванные плесневыми и другими чувствительными к клотримазолу грибами (например, *Trichophyton*);
- дерматомикозы, вызванные дрожжевыми грибами рода *Candida*;
- заболевания кожи со вторичным инфицированием чувствительными к клотримазолу грибами;
- опрелость, вызванная грибами рода *Candida*;
- вульвит, баланит;
- разноцветный лишай.

2. О чем следует знать перед применением препарата Клотримазол

Не применяйте препарат Клотримазол

- если у вас аллергия (гиперчувствительность) на клотримазол или любые другие компоненты препарата, перечисленные в разделе 6 листка-вкладыша.

Особые указания и меры предосторожности

Перед применением препарата, проконсультируйтесь с лечащим врачом или фармацевтом. Необходимо избегать попадания крема на слизистую оболочку глаз. Не глотать.

Все пораженные участки кожи следует лечить одновременно.

Другие препараты и препарат Клотримазол

Сообщите лечащему врачу или фармацевту о том, что вы принимаете, недавно принимали или можете начать принимать какие-либо другие препараты.

При одновременном применении препарат Клотримазол может нарушать целостность латексных контрацептивов и тем самым ослабить их эффективность. Вам следует использовать альтернативные методы контрацепции во время лечения и в течение не менее 5 дней после окончания курса терапии.

Беременность и грудное вскармливание

Если вы беременны или кормите грудью, думаете, что забеременели, или планируете беременность, перед началом применения препарата проконсультируйтесь с лечащим врачом или фармацевтом.

Беременность

При наружном применении клотримазол плохо всасывается через кожу, поэтому вряд ли возможно отрицательное воздействие на плод. Тем не менее, применять препарат в период беременности возможно только под наблюдением врача.

Грудное вскармливание

В период кормления грудью необходимость лечения препаратом Клотримазол должна определяться врачом. При необходимости следует решить вопрос о прекращении грудного вскармливания.

Управление транспортными средствами и работа с механизмами

Клотримазол при нанесении на кожу не влияет на способность управлять транспортными средствами и работать с механизмами.

Препарат Клотримазол крем содержит цетостеариловый спирт, который может вызывать местные кожные реакции (например, контактный дерматит).

3. Применение препарата Клотримазол

Всегда применяйте данный препарат в полном соответствии с рекомендациями лечащего врача или фармацевта. При появлении сомнений, посоветуйтесь с лечащим врачом или фармацевтом.

Рекомендуемая доза

Крем следует наносить на пораженные участки кожи 2-3 раза в день. Для предотвращения рецидивов лечение следует продолжать, по крайней мере, в течение двух недель после исчезновения всех симптомов инфекции.

Путь и способ введения

Для наружного применения.

Крем следует наносить на чистые сухие участки пораженной кожи (вымытой мылом с нейтральным значением pH). При нанесении на стопы следует их тщательно вымыть, высушить и затем наносить крем между пальцами ног.

Продолжительность лечения

- инфекции, вызываемые дерматофитами - не менее одного месяца;
- инфекции, вызываемые грибами рода *Candida* - не менее двух недель.

Особые группы пациентов

Отсутствует необходимость в коррекции дозы у пациентов молодого и пожилого возраста.

Если вы применили препарат Клотримазол больше, чем следовало

При наружном применении препарата передозировка маловероятна.

Если вы случайно проглотили большое количество крема, у вас могут возникнуть головокружение, тошнота, рвота и вам может понадобиться врачебная помощь.

Если вы забыли применить препарат Клотримазол

Если вы пропустили применение препарата в обычное время, примените его, когда вспомните и продолжайте по схеме.

Не применяйте двойную дозу, чтобы компенсировать пропущенную дозу.

Если вы прекратили применение препарата Клотримазол

Чтобы обеспечить полное выздоровление и предотвратить реинфекцию, не прекращайте лечение раньше, не посоветовавшись с лечащим врачом.

При наличии вопросов по применению препарата, обратитесь к лечащему врачу или фармацевту.

4. Возможные нежелательные реакции

Подобно всем лекарственным препаратам, данный препарат может вызывать нежелательные реакции, однако они возникают не у всех.

1) Во время лечения могут возникнуть серьезные нежелательные реакции:

Частота неизвестна (исходя из имеющихся данных частоту возникновения определить невозможно)

- аллергическая реакция, проявляющаяся зудом, покраснением кожи с появлением пузырей (крапивница), отдышкой, снижением артериального давления, обмороком.

В случае появления таких серьезных нежелательных реакций, прекратите применение препарата Клотримазол и НЕМЕДЛЕННО обратитесь к лечащему врачу.

2) Другие возможные нежелательные реакции:

Частота неизвестна (исходя из имеющихся данных частоту возникновения определить невозможно)

- сыпь, зуд, пузырьковые высыпания, шелушение, боль или дискомфорт, отек, жжение, раздражение, покраснение, покалывание.

Сообщение о нежелательных реакциях

Если у Вас возникают какие-либо нежелательные реакции, проконсультируйтесь с врачом. К ним также относятся любые нежелательные реакции, не указанные в листке-вкладыше. Вы также можете сообщить о нежелательных реакциях напрямую (см. ниже). Сообщая о нежелательных реакциях, вы помогаете получить больше сведений о безопасности препарата.

Республика Армения

ГНКО «Центр экспертизы лекарств и медицинских технологий»

Адрес: 0051, г. Ереван, пр. Комитаса 49/5

Телефон: +(374 10) 20-05-05, +(374 96) 22-05-05

Эл. почта: vigilance@pharm.am

Сайт: www.pharm.am

4. Хранение препарата Клотримазол

Храните препарат в недоступном и невидном для детей месте.

Хранить при температуре не выше 25 °С. Не замораживать.

Не применяйте препарат после истечения срока годности (срока хранения), указанного на упаковке после «Годен до». Датой истечения срока годности является последний день данного месяца.

Не выбрасывайте препараты в сточные воды или с бытовыми отходами. Уточните у фармацевта, как следует утилизировать (уничтожать) препараты, которые больше не потребуются. Эти меры позволят защитить окружающую среду.

5. Содержимое упаковки и прочие сведения

Препарат Клотримазол содержит

- Действующим веществом является клотримазол. 1 г крема содержит 10 мг клотримазола.
- Прочими ингредиентами являются: полисорбат 60, сорбитана моностеарат, цетостеариловый спирт, октилдодеканол, цетилпальмитат, бензиловый спирт, вода очищенная.

Внешний вид препарата Клотримазол и содержимое упаковки

Препарат представляет собой однородный крем белого или почти белого цвета.

Клотримазол упакован по 15 г крема в алюминиевой тубе вместе с листком-вкладышем в картонную пачку.

Держатель регистрационного удостоверения и производитель

ООО «ФАРМАПРИМ»

Адрес: ул. Кринилор, 5, с. Порумбень, р-он Криулень

Республика Молдова, MD-4829

Телефон: (+373-22)-28-18-45

Тел./факс: (+373-22)-28-18-46

Эл. почта: safety@farmaprim.md

Данный листок-вкладыш пересмотрен

Прочие источники информации

Подробные сведения о препарате содержатся на веб-сайте <https://www.pharm.am>