

Инструкция по медицинскому применению препарата ФУКОРЦИН

Торговое название препарата

Фукорцин

Основные синонимы

Жидкость Кастеллани, Фукосептол

МНН

Резорцинол

Количественный и качественный состав препарата

1 мл препарата содержит:

Действующее вещество: Резорцин 0.078 г.

Вспомогательные вещества: борная кислота 0.008г; фуксин основной 0.004г; фенол 0.039г; ацетон 0.049мл; спирт этиловый 96% 0.096мл; вода очищенная до 1мл.

Физико-химические свойства

Темно-красная жидкость с характерным запахом фенола.

Лекарственная форма

Раствор для наружного применения.

Фармакологическая группа

Дерматологические препараты. Препараты для лечения угревой сыпи. Препараты для лечения угревой сыпи местного применения. Препараты для лечения угревой сыпи для местного назначения другие. Резорцинол.

АТХ

D10AX02

Фармакологическое действие

Обладает кератолитическим действием.

Коагулирует белки (в т. ч. ферментные) микробной клетки, нарушает проницаемость клеточной мембраны.

Вызывает гибель вегетативных форм микроорганизмов, на споры оказывает слабое действие.

Показания к применению

Себорейный дерматит, акне.

Способ применения и дозы

Наружно. Раствор наносят с помощью ватного тампона или стеклянной палочки на пораженные участки кожи 2-4 раза в день. После подсыхания жидкости на обработанный участок можно наносить мази и пасты.

Противопоказания

Гиперчувствительность к компонентам препарата.

Нарушение функции почек, беременность и кормление грудью, детский возраст.
Раствор “Фукорцин” также противопоказан при обширных поражениях кожи и слизистых оболочек, нарушениях целостности кожных покровов.

Побочное действие

Кратковременное ощущение жжения и боли, не требующее отмены препарата, покраснение, шелушение кожи.

Особые указания

Не следует наносить Фукорцин на большие участки кожи т.к. фенол, входящий в состав раствора, проникает в кровь и может вызвать токсические явления (головокружение, слабость).

Избегать попадания препарата в глаза.

Препарат имеет своеобразный запах, красный цвет и может пачкать белье.

Беременность и кормление грудью: Препарат противопоказан беременным и кормящим матерям.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами

Не изучалось.

Влияние на способность управлять транспортными средствами, механизмами

Препарат не оказывает влияние на способность управлять транспортными средствами, механизмами.

Передозировка

Всасываясь через кожу в больших дозах, при передозировке и длительном применении, при нарушениях функции почек, может привести к возникновению острых и хронических токсических реакций.

Симптомы передозировки: тошнота, рвота, диарея, кожная сыпь, головная боль, спутанность сознания, олигурия, головокружение, общая слабость, коллапс, затруднение дыхания.

Условия хранения

Хранить в защищенном от света и недоступном для детей месте, при температуре не выше 25°C.

Условия отпуска из аптек

Без рецепта.

Срок годности

2 года.

После первого вскрытия флакона препарат при комнатной температуре хранения годен к применению в течение 2 месяцев.

Не использовать после окончания срока годности.

Форма выпуска

По 10мл, 15мл, 25мл, 30мл во флаконах из темного стекла.

Производитель и владелец регистрационного удостоверения:

За любой информацией о препарате следует обращаться к локальному представителю держателя регистрационного удостоверения:

ООО «Арсанит» Масис-Ранчпар шоссе 7, г. Масис, Араратская область,
Армения, тел: +37410524553; e-mail: info@arsanit.am

Дата пересмотра текста

15.04.2025г.