

Листок-вкладыш - информация для пациента

Назилок, 0,025%, капли назальные

Назилок, 0,05%, капли назальные

Назилок Бейби, 0,01%, капли назальные

Действующее вещество: оксиметазолин

Перед применением препарата полностью прочитайте листок вкладыш, поскольку в нем содержатся важные для Вас сведения.

- Всегда применяйте препарат в точности с листком-вкладышем или рекомендациями лечащего врача или работника аптеки.
- Сохраните листок-вкладыш. Возможно, Вам потребуется прочитать его еще раз.
- Если Вам нужны дополнительные сведения или рекомендации, обратитесь к работнику аптеки.
- Если у Вас возникли какие-либо нежелательные реакции, обратитесь к лечащему врачу или работнику аптеки. Данная рекомендация распространяется на любые возможные нежелательные реакции, в том числе на не перечисленные в разделе 4 листка-вкладыша.

СОДЕРЖАНИЕ ЛИСТКА-ВКЛАДЫША

1. Что из себя представляет препарат Назилок, Назилок Бейби, и для чего его применяют.
2. О чем следует знать перед применением препарата Назилок, Назилок Бейби.
3. Применение препарата Назилок, Назилок Бейби.
4. Возможные нежелательные реакции.
5. Хранение препарата Назилок, Назилок Бейби.
6. Содержимое упаковки и прочие сведения.

1. ЧТО ИЗ СЕБЯ ПРЕДСТАВЛЯЕТ ПРЕПАРАТ НАЗИЛОК, НАЗИЛОК БЕЙБИ И ДЛЯ ЧЕГО ЕГО ПРИМЕНЯЮТ

Препарат Назилок, препарат Назилок Бейби содержит действующее вещество оксиметазолин: относится к препаратам, применяемым местно для лечения заболеваний носа и снижающим отек слизистой оболочки (деконгестантам). Оксиметазолин оказывает сосудосуживающее (симпатомиметическое) действие. При местном нанесении на воспаленную слизистую оболочку полости носа уменьшает ее отечность и выделения из носа.

Восстанавливает носовое дыхание.

Устранение отека слизистой оболочки полости носа способствует восстановлению аэрации (естественного прохождения воздуха) придаточных пазух полости носа, полости среднего уха, что предотвращает развитие бактериальных осложнений (гайморита, синусита, среднего отита).

При местном интраназальном применении в рекомендованных дозах не раздражает и не вызывает гиперемии (покраснение) слизистой оболочки полости носа.

Препарат начинает действовать быстро (в течение нескольких минут).

Продолжительность действия препарата до 12 часов.

Показания к применению

Препарат Назилор, 0,025% и 0,05%, капли назальные, препарат Назилор Бейби, 0,01%, капли назальные рекомендуется принимать по следующим показаниям:

- острые респираторные заболевания с явлениями ринита (насморка);
- острый аллергический ринит;
- обострение вазомоторного ринита (хронического заболевания, при котором наблюдается заложенность носа или обильный насморк, не связанные с каким-либо аллергеном или инфекцией);
- для восстановления дренажа (оттока жидкости) при воспалении придаточных пазух полости носа (синуситах), евстахиите (воспалении слизистой оболочки слуховой трубы и барабанной полости), среднем отите;
- для устранения отека перед диагностическими манипуляциями в носовых ходах.

Если улучшение не наступило или Вы чувствуете ухудшение через 3 дня, необходимо обратиться к врачу.

2. О ЧЕМ СЛЕДУЕТ ЗНАТЬ ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ ПРЕПАРАТА НАЗИЛОК, НАЗИЛОК БЕЙБИ

Противопоказания

Не принимайте препарат Назилор, препарат Назилор Бейби если у Вас:

- гиперчувствительность к оксиметазолину или любым другим компонентам препарата (перечисленные в разделе 6 листка-вкладыша);
- атрофический ринит;
- закрытоугольная глаукома;
- были хирургические вмешательства на твердой мозговой оболочке (в анамнезе);
- состояние после хирургической операции по удалению гипофиза через носовые ходы (транссфеноидальной гипofизэктомии);
- воспаление кожи и слизистой оболочки области преддверия носа.

Дети

Препарат Назилор Бейби назальные капли нельзя применять детям в возрасте до 3 месяцев;

Препарат Назилор 0,025% назальные капли нельзя применять детям в возрасте до 1 года;

Препарат Назилор 0,05% назальные капли нельзя применять детям в возрасте до 6 лет.

Особые указания и меры предосторожности

Перед применением препарата Назилок, препарата Назилок Бейби проконсультируйтесь с лечащим врачом или работником аптеки.

Сообщите лечащему врачу, если у Вас:

- необходимость приема ингибиторов моноаминоксидазы (МАО), трициклических антидепрессантов, а также других препаратов, повышающих артериальное давление, или бромокриптина;
- повышенное внутриглазное давление;
- тяжелые заболевания сердечно-сосудистой системы, такие как хроническая сердечная недостаточность, повышенное артериальное давление, стенокардия (приступы боли за грудиной или в области сердца), выраженный атеросклероз (отложение холестерина в стенках артерий, приводящее к сужению их просвета), тахикардия (учащенное сердцебиение), аритмия (нерегулярное сердцебиение);
- феохромоцитому (опухоль ткани надпочечников, которая выделяет гормоны, повышающие артериальное давление);
- нарушения обмена веществ, например, гипертиреоз (повышение функции щитовидной железы), сахарный диабет (заболевание, обусловленное повышением уровня глюкозы в крови), порфирия (редкое генетическое заболевание, связанное с нарушением пигментного обмена и накоплением в организме токсических соединений - порфиринов);
- гиперплазия предстательной железы (разрастание ткани предстательной железы);
- хроническая почечная недостаточность (серьезное нарушение функции почек);
- если Вы беременны или кормите грудью.

Избегайте длительного применения и передозировки препарата, особенно у детей, так как это может привести к снижению эффективности сосудосуживающих препаратов.

Эффективность сосудосуживающих препаратов, к которым относится препарат Назилок, препарат Назилок Бейби, может снижаться при длительном применении или передозировке. Это может привести к применению более высоких доз или к более частому применению препаратов, что, в свою очередь, может привести к постоянному применению препаратов.

Немедленно прекратите применение сосудосуживающих препаратов, к которым относится препарат Назилок, препарат Назилок Бейби, если Вы долго применяете препарат или у Вас признаки передозировки (более подробная информация представлена в подразделе «Если Вы приняли препарата Назилок, препарата Назилок Бейби больше, чем следовало»).

В случае отсутствия эффекта или при утяжелении симптомов заболевания обратитесь к врачу. Если у Вас или Вашего ребенка хронический ринит, показано медицинское наблюдение.

Избегайте попадания препарата в глаза. Во избежание распространения инфекции необходимо применять препарат индивидуально.

Препарат не следует применять непрерывно на протяжении более 7 дней. Длительное или чрезмерное применение препарата может вызвать привыкание (тахифилаксию), повторное появление симптомов, которые отсутствовали или контролировались во время применения препарата (эффект «рикошета») и истощение (атрофию) слизистой оболочки полости носа.

Описаны редкие случаи развития синдрома задней обратимой энцефалопатии (СЗОЭ) или синдрома обратимой церебральной вазоконстрикции (СОЦВ) на фоне терапии симпатомиметическими препаратами, к которым относится препарат Назилок, препарат Назилок Бейби. СЗОЭ и СОЦВ — это патологические состояния, симптомы которых включают внезапное появление сильной головной боли, тошноты, рвоты и нарушений зрения. В большинстве случаев состояние улучшалось или явление разрешилось в течение нескольких дней после соответствующего лечения. При развитии симптомов СЗОЭ или СОЦВ, церебральной вазоконстрикции немедленно прекратите лечение препаратом Назилок, препаратом Назилок Бейби и обратитесь за медицинской помощью.

Консервант (бензалкония хлорид), содержащийся в препарате Назилок и препарате Назилок Бейби может вызывать раздражение или отек в носу, особенно при длительном применении. Если есть подозрение на такую реакцию (постоянная заложенность носа), по возможности следует использовать препарат для назального применения без содержания консерванта. Если таких лекарственных препаратов для назального применения без содержания консерванта нет в наличии, следует рассмотреть другую форму введения.

Дети

Уделите особое внимание каждой процедуре применения препарата - не допускайте превышения дозы.

Медицинское наблюдение показано недоношенным новорожденным или новорожденным с недостаточным весом для исключения риска передозировки.

Другие препараты и препарат Назилок, Назилок Бейби

Сообщите лечащему врачу или работнику аптеки о том, что Вы принимаете, недавно принимали или можете начать принимать какие-либо другие препараты.

При применении препарата Назилок, препарата Назилок Бейби с другими лекарственными препаратами (независимо от способа введения) возможно взаимное усиление побочных эффектов.

Особенно важно сообщить о следующих препаратах:

- ингибиторы моноаминоксидазы (препараты для лечения депрессии), принимаемые в течение предшествующих 2-х недель и в течение 2-х недель после их отмены,

трициклические антидепрессанты или другие препараты, способствующие повышению артериального давления;

- другие сосудосуживающие лекарственные средства из-за повышения риска развития побочных эффектов;
- местноанестезирующие лекарственные средства, в связи с тем, что препарат Назилок, препарат Назилок Бейби замедляет всасывание и удлиняет их действие.

Беременность, грудное вскармливание и фертильность

Если Вы беременны или кормите грудью, думаете, что забеременели, или планируете беременность, перед началом применения препарата проконсультируйтесь с лечащим врачом или работником аптеки.

В период беременности и/или грудного вскармливания следует применять только после консультации с лечащим врачом, когда врач оценил пользу препарата для Вас и риск его применения для плода или ребенка.

Не превышайте рекомендуемую дозу. Частое или длительное применение препарата в больших дозах может привести к снижению плацентарного кровотока. Ваш врач решит вопрос о возможности продолжения лечения препаратом в случае, если у Вас имеются артериальная гипертензия или признаки снижения плацентарного кровотока. Частое или длительное применение препарата в больших дозах может привести к снижению плацентарного кровотока. Не превышайте рекомендуемую дозу.

Управление транспортными средствами и работа с механизмами

В рекомендованных дозах средство от насморка, содержащее оксиметазолин, не влияет на способность управлять транспортным средством или работу с механизмами.

После длительного применения средства от насморка, в дозировках, превышающих рекомендуемые, нельзя исключать общее влияние на сердечно-сосудистую систему и центральную нервную систему. В этих случаях способность управлять транспортным средством или механизмами может снижаться.

3. ПРИМЕНЕНИЕ ПРЕПАРАТА НАЗИЛОК И НАЗИЛОК БЕЙБИ

Всегда применяйте препарат в полном соответствии с данным листком-вкладышем или с рекомендациями лечащего врача или работника аптеки. При появлении сомнений посоветуйтесь с лечащим врачом или работником аптеки.

Режим дозирования

Применение препарата Назилок

Рекомендуемая доза для взрослых и детей старше 6 лет:

Применять по 1-2 капли 0,05% раствора в каждый носовой ход 2-3 раза в день.

Рекомендуемая доза для детей от 1 года до 6 лет:

Применять по 1-2 капли 0,025% раствора в каждый носовой ход 2-3 раза в день.

Применение препарата Назилок Бейби у детей от 3 месяцев до 1 года

Детям в возрасте от 3 месяцев до 1 года – по 1-2 капли 0,01% раствора в каждый носовой ход 2-3 раза в день.

Путь и (или) способ введения

Интраназально (в полость носа).

Перед применением лекарственного препарата необходимо очистить носовые ходы.

Колпачок отвинчивают, снимают и слегка нажимают на корпус флакона.

Продолжительность терапии

Препарат применяется от 3 до 5 дней.

В рекомендуемой дозе без консультации с врачом не применяйте более 7 дней подряд.

Если симптомы усиливаются и улучшение не наступает в течение 3-х дней, проконсультируйтесь с врачом.

Повторный курс лечения препаратом возможен только спустя несколько дней, в течение которых препарат не применялся.

При частом или длительном применении препарата ощущение «заложенности» носа может появиться вновь или ухудшиться. В этом случае прекратите лечение и обратитесь к врачу.

Если вы приняли препарат Назилок, препарат Назилок Бейби больше, чем следовало

Если Вы приняли слишком много препарата Назилок, препарата Назилок Бейби, обратитесь к врачу. По возможности возьмите с собой упаковку с данным лекарственным средством и/или данный листок-вкладыш.

Эффективность сосудосуживающих препаратов может снижаться (тахифилаксия) при длительном применении или передозировке. Не допускайте применения более высоких доз, более частого или постоянного применения препаратов что, в свою очередь, может привести к постоянному применению препаратов. Немедленно прекратите применение любых сосудосуживающих препаратов, к которым относится препарат Назилок, препарат Назилок Бейби, если Вы долго применяете препарат или у вас признаки передозировки.

Признаки интоксикации производными имидазола, к которым относится оксиметазолин, могут быть неспецифическими и нечеткими, поскольку фазы гиперактивности сменяются фазами угнетения центральной нервной системы (сонливость, снижение температуры тела), сердечно-сосудистой (уменьшение частоты сердечных сокращений, снижение артериального давления) и дыхательной систем (остановка дыхания и кома).

В случае передозировки препарата Назилок, препарата Назилок Бейби могут появиться следующие симптомы: сужение зрачков, тошнота, рвота, цианоз (синюшный цвет кожных покровов), повышение температуры тела, тахикардия, аритмия, коллапс, угнетение сердечной деятельности, артериальная гипертензия, отек легких, дыхательные расстройства. Кроме того, могут появляться психические расстройства, а также угнетение функций центральной нервной системы, сопровождающееся сонливостью, понижением температуры тела, брадикардией, артериальной гипотензией, остановкой дыхания и возможным развитием комы (длительного отсутствия сознания).

Дети

У детей передозировка может быть причиной развития таких симптомов со стороны центральной нервной системы, как возбуждение, судороги, кома, брадикардия, остановка дыхания, а также повышение артериального давления с последующим возможным снижением артериального давления.

Лечение

При тяжелой передозировке показана интенсивная терапия в условиях стационара.

При случайном приеме или случайном попадании препарата внутрь проводят промывание желудка, назначают прием активированного угля.

Применение сосудосуживающих средств противопоказано.

Если Вы забыли применить препарат Назилок, препарат Назилок Бейби

Не применяйте двойную дозу, чтобы компенсировать пропущенную дозу.

При наличии вопросов по применению препарата обратитесь к лечащему врачу или работнику аптеки.

4. ВОЗМОЖНЫЕ НЕЖЕЛАТЕЛЬНЫЕ РЕАКЦИИ

Подобно всем лекарственным препаратам, Назилок, Назилок Бейби могут вызывать нежелательные реакции, однако они возникают не у всех.

Прекратите применение препарата Назилок, препарата Назилок Бейби и немедленно обратитесь за медицинской помощью в случае возникновения следующих симптомов серьезных нежелательных реакций:

Нечасто (могут возникать не более чем у 1 человека из 100):

- отек лица (губы, веки, щеки) и слизистой рта, который может распространяться на гортань, вызывая затруднение дыхания, охриплость голоса и лающий кашель (ангионевротический отек).

Очень редко (могут возникать не более чем у 1 человека из 10 000):

- галлюцинации (особенно у детей);
- остановка дыхания (у новорожденных и младенцев).

Частота неизвестна (исходя из имеющихся данных, частоту возникновения определить невозможно):

- судороги

Другие возможные нежелательные реакции, которые могут наблюдаться при применении препарата Назилок и препарата Назилок Бейби.

Часто (могут возникнуть не более чем у 1 человека из 10):

- ощущение дискомфорта со стороны слизистой носа (ощущение жжения или сухость слизистой оболочки полости носа);
- чихание

Нечасто (могут возникать не более чем у 1 человека из 100):

- сыпь, кожный зуд (реакции гиперчувствительности);
- учащенное сердцебиение (тахикардия);
- повышение артериального давления;
- чувство «заложенности» носа (реактивная гиперемия);
- носовое кровотечение.

Редко (могут возникать не более чем у 1 человека из 1 000):

- бессонница;
- головная боль;
- ощущение сердцебиения.

Очень редко (могут возникать не более чем у 1 человека из 10 000):

- беспокойство;
- сонливость.

Частота неизвестна (исходя из имеющихся данных, частоту возникновения определить невозможно):

- чувство тревоги;
- раздражительность;
- нарушение сна (у детей);
- подавленность;
- головокружение;
- утомляемость;
- отсутствие эффекта препарата (тахифилаксия) вследствие длительного применения или передозировки;
- тошнота;
- нарушение зрения (при попадании в глаза);
- высыпания на коже (экзантема).

Длительное или непрерывное применение сосудосуживающих препаратов может привести к повторному появлению или усилению заложенности носа (медикаментозный ринит), истощению (атрофии) слизистой оболочки полости носа и снижению эффективности препарата (тахифилаксии). Препарат Назилок, препарат Назилок Бейби содержит бензалкония хлорид, который может вызывать местные кожные реакции.

Сообщение о нежелательных реакциях

Если у Вас возникают какие-либо нежелательные реакции, проконсультируйтесь с врачом или работником аптеки. Данная рекомендация распространяется на любые возможные нежелательные реакции, в том числе на не перечисленные в листке-вкладыше.

Вы можете сообщить о нежелательных реакциях напрямую в «Центр экспертизы лекарств и медицинских технологий» ГНКО Республика Армения 0051, г. Ереван, пр. Комитаса, 49/5. Тел.: (+374 10) 20 05 05, (+374 96) 22 05 05; e-mail: info@ampra.am, vigilance@pharm.am.

О нежелательных реакциях лекарственного препарата также можно сообщить держателю регистрационного удостоверения - компании «Арсанит» ООО: Республика Армения, Арагатская область Масис, Масис-Ранчпар ш. 7 Тел: (374 60) 52 45 53..

Сообщая о нежелательных реакциях, вы помогаете получить больше сведений о безопасности препарата.

5. ХРАНЕНИЕ ПРЕПАРАТА НАЗИЛОК

Храните препарат в недоступном для детей месте.

Храните в защищенном от света месте при температуре не выше 25°C.

Срок годности: 3 года. Не применяйте препарат после истечения срока годности, указанного на упаковке «Годен до». Датой истечения срока годности является последний день месяца.

Не выбрасывайте препарат в канализацию. Уточните у работника аптеки, как избавиться от препарата, который больше не требуется. Эти меры позволят защитить окружающую среду.

6. СОДЕРЖИМОЕ УПАКОВКИ И ПРОЧИЕ СВЕДЕНИЯ

Препарат Назилок, препарат Назилок Бейби содержит

Действующим веществом является оксиметазолин.

Каждый мл 0,01% препарата Назилок Бейби содержит 0,1 мг оксиметазолина (в виде гидрохлорида).

Каждый мл 0,025% препарата Назилок содержит 0,25 мг оксиметазолина (в виде гидрохлорида).

Каждый мл 0,05% препарата Назилок содержит 0,5мг оксиметазолина (в виде гидрохлорида).

Прочими ингредиентами (вспомогательными веществами) являются: бензалкония хлорид (50%), натрия дигидрофосфат, динатрия фосфат, динатриевая соль этилендиаминтетрауксусной кислоты (Трилон Б), натрия хлорид, сорбит, вода очищенная.

Внешний вид препарата Назилок, Назилок Бейби и содержимое упаковки

Капли назальные.

Прозрачный бесцветный или слегка желтоватый раствор.

По 5мл препарата в пластиковые флаконы-капельницы, укупоренные колпачками с контролем первого вскрытия или по 10мл в пластиковые флаконы-капельницы, укупоренные колпачками с контролем первого вскрытия. На каждый флакон наклеивают этикетку. По одному флакону вместе с листком-вкладышем в пачку картонную.

Категория отпуска лекарственного препарата

Без рецепта.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ / ДЕРЖАТЕЛЬ РЕГИСТРАЦИОННОГО УДОСТОВЕРЕНИЯ

ООО «Арсанит»

Арагатская область, г. Масис

Масис-Ранчпар ш. 7

Республика Армения

Листок-вкладыш пересмотрен

02/2026