

**ЛИСТОК-ВКЛАДЫШ**  
(Информация для потребителей)

**КОУЛ ТАР**  
**2% шампунь для наружного применения**

**Регистрационное свидетельство №**

**Торговое название:** КОУЛ ТАР

**Международное непатентованное название:** Деготь каменноугольный (COAL TAR)

**Лекарственная форма:** шампунь для наружного применения.

**Состав**

Каждый мл шампуня для наружного применения содержит:

**действующее вещество:** деготь каменноугольный– 20 мг;

**вспомогательные вещества:** кокамидопропил бетаин, натрия лаурет сульфат, кокамид DEA, натрия хлорид, динатрия ЭДТА, метилпарабен, лимонная кислота, вода очищенная.

**Фармакологическая группа и код АТХ**

Дерматологический препарат.

Код АТХ – D11AC30

**Описание**

Желтовато-коричневая вязкая жидкость с сильным, проникающим и характерным запахом.

**Фармакологические свойства**

Препарат неочищенного каменноугольного дегтя для местного применения в дерматологии. Тормозит пролиферацию и инфильтрацию клеток эпидермиса, оказывает слабое антисептическое, противозудное, вяжущее действие. Стимулирует регенерацию эпидермиса и процессы ороговения. Обладает фотосенсибилизирующим действием.

**Фармакокинетика**

Препарат предназначен для местного применения, данных о системной абсорбции не имеется.

**Показания к применению**

Себорейный дерматит.

**Способ применения**

Перед применением хорошо взбалтывать содержимое флакона.

Необходимое количество шампуня нанести на мокрые волосы и втереть до образования пены, затем смыть и нанести вновь. Пену необходимо оставить на голове примерно на 5 мин, затем волосы тщательно промыть. КОУЛ ТАР рекомендуется применять 2 раза в неделю. Длительность применения устанавливается врачом.

**Побочные реакции**

Из-за раздражающего действия препарата возможны дерматит волосистой части кожи головы (при длительном применении); хронический фолликулит; фоточувствительность.

КОУЛ ТАР содержит метилпарабен, который может вызвать аллергические реакции, возможно замедленного типа.

## **Противопоказания**

- Повышенная чувствительность к компонентам препарата.
- Инфицированная, поврежденная кожа.
- Детский возраст младше 12 лет.
- Беременность, кормление грудью.
- УФ облучение.

## **Особые указания**

При проведении лечения рекомендуется избегать пребывания на солнце.

Следует избегать попадания КОУЛ ТАРа в глаза, рот, нос, на слизистые оболочки, на открытую рану; в случае попадания следует немедленно смыть водой.

## **Фертильность, беременность и лактация**

### **Фертильность**

Данные о влиянии препаратов местного действия каменноугольной смолы на фертильность человека отсутствуют.

Данное лекарство следует применять во время беременности только в случае крайней необходимости.

### **Беременность**

Имеются ограниченные данные об использовании препаратов каменноугольной смолы у беременных женщин.

Было показано, что каменноугольная смола является фетотоксичной и тератогенной для потомства лабораторных животных при местном, пероральном или ингаляционном применении в высоких и токсичных для материнского организма дозах.

Применение данного препарата во время беременности следует рассматривать только в том случае, если ожидаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода.

Следует избегать применения этого препарата в первом триместре беременности.

### **Лактация**

Безопасность местного применения препаратов на основе каменноугольной смолы в период лактации не установлена. Неизвестно, может ли местное применение препаратов каменноугольной смолы привести к системной абсорбции, достаточной для образования обнаруживаемых количеств в грудном молоке.

Применение препаратов на основе каменноугольной смолы во время лактации следует рассматривать только в том случае, если ожидаемая польза для матери перевешивает потенциальный риск для младенца.

При использовании препарата в период лактации пациенткам следует рекомендовать тщательно смыть остатки препарата с груди перед кормлением грудью, чтобы избежать случайного проглатывания младенцем.

## **Влияние на способность управлять транспортными средствами и механизмами**

Влияния на способность управлять транспортными средствами и механизмами не наблюдалось.

## **Передозировка**

### **Симптомы и признаки**

Передозировка местного применения каменноугольной смолы может усилить раздражение кожи и светочувствительность.

### **Уход**

Лечение должно проводиться в соответствии с клиническими показаниями или рекомендациями национального токсикологического центра, если таковые имеются.

**Взаимодействие с другими препаратами**

КОУЛ ТАР не рекомендуется применять одновременно с препаратами, имеющими фототоксическое и фотоактивное действие (например, тетрациклины, псоралены, третиноин).

**Форма выпуска**

Шампунь для наружного применения 2% в пластмассовых флаконах по 90 мл вместе с листком-вкладышем в пачке из картона.

**Срок годности**

3 года. Не использовать по истечении срока годности.

**Условия хранения**

Хранить в сухом, недоступном для детей месте при температуре не выше 25<sup>0</sup> С.

**Условия отпуска из аптек**

Отпускается по рецепту врача.

**Производитель****ООО "АРПИМЕД"**

Республика Армения, Котайкская область, г. Абовян, 2204, 2-ой микрорайон, здание 19

Тел.: 374 (222) 21703, 21740

Факс: 374 (222) 21924

**Держатель регистрационного удостоверения****ООО "АРПИМЕД"**

Республика Армения, Котайкская область, г. Абовян, 2204, 2-ой микрорайон, здание 19

Тел.: 374 (222) 21703, 21740

Факс: 374 (222) 21924

**За любой информацией о препарате следует обращаться к локальному представителю держателя регистрационного удостоверения:**

**ООО "АРПИМЕД"**

Республика Армения, Котайкская область, г. Абовян, 2204, 2-ой микрорайон, здание 19

Тел.: 374 (222) 21703, 21740

Факс: 374 (222) 21924

**Дата последнего пересмотра текста.**