

Листок-вкладыш — информация для пациента

КАМФОРНЫЙ СПИРТ-АРГО 2%, раствор для наружного применения спиртовой

Действующее вещество: камфора.

Перед приемом препарата полностью прочитайте листок-вкладыш, поскольку в нем содержатся важные для Вас сведения.

- Всегда применяйте препарат в точности с листком-вкладышем или рекомендациями лечащего врача или работника аптеки.
- Сохраните листок-вкладыш. Возможно, Вам потребуется прочитать его еще раз.
- Если Вам нужны дополнительные сведения или рекомендации, обратитесь к работнику аптеки.
- Если у Вас возникли какие-либо нежелательные реакции, обратитесь к лечащему врачу или работнику аптеки. Данная рекомендация распространяется на любые возможные нежелательные реакции, в том числе на не перечисленные в разделе 4 листка-вкладыша.
- Если состояние не улучшается или оно ухудшается, Вам следует обратиться к врачу.

Содержание листка-вкладыша

1. Что из себя представляет препарат Камфорный спирт-Арго и для чего его применяют.
2. О чем следует знать перед применением препарата Камфорный спирт-Арго.
3. Применение препарата Камфорный спирт-Арго.
4. Возможные нежелательные реакции.
5. Хранение препарата Камфорный спирт-Арго.
6. Содержимое упаковки и прочие сведения.

1. Что из себя представляет препарат Камфорный спирт-Арго и для чего его применяют

Действующим веществом препарата Камфорный спирт-Арго является камфора.

Это препарат для наружного применения при мышечных и суставных болях.

Показания к применению

Камфорный спирт-Арго показан к применению у взрослых в возрасте от 18 лет при:

- миалгии;
- миозите;
- артралгии;
- ишиасе;
- профилактике образования пролежней.

Если улучшение не наступило или Вы чувствуете ухудшение, необходимо обратиться к врачу.

2. О чем следует знать перед применением препарата Камфорный спирт-Арго

Противопоказания

Не применяйте препарат Камфорный спирт-Арго:

- если у Вас аллергия на камфору или любые другие компоненты препарата (перечислены в разделе 6 листка-вкладыша);
- если у Вас имеется нарушение целостности кожных покровов или воспалительные заболевания кожи в месте предполагаемого нанесения (в том числе дерматит, экзема);
- если Вы беременны;
- если Вы кормите грудью;
- если Вам нет 18 лет.

Особые указания и меры предосторожности

Перед применением препарата Камфорный спирт-Арго проконсультируйтесь с лечащим врачом или работником аптеки.

Не допускать попадания препарата в глаза. Не наносите препарат на слизистые оболочки, открытые раны и поврежденные или воспаленные участки кожи. При попадании препарата в рот или нос тщательно промойте их водой. После нанесения препарата тщательно вымойте руки теплой водой.

Дети и подростки

Не применяйте препарат у детей в возрасте от 0 до 18 лет вследствие риска неэффективности и вероятной небезопасности. Данные отсутствуют.

Другие препараты и препарат Камфорный спирт-Арго

Сообщите лечащему врачу или работнику аптеки о том, что Вы принимаете, недавно принимали или можете начать принимать какие-либо другие препараты.

Данные по взаимодействию с другими лекарственными средствами отсутствуют.

Беременность, грудное вскармливание и фертильность

Если Вы беременны или кормите грудью, думаете, что забеременели или планируете беременность, перед началом применения препарата проконсультируйтесь с лечащим врачом или работником аптеки.

Беременность

Не применяйте препарат Камфорный спирт-Арго во время беременности.

Грудное вскармливание

Не применяйте препарат Камфорный спирт-Арго в период грудного вскармливания.

Фертильность

Данные по влиянию препарата на фертильность отсутствуют.

Управление транспортными средствами и работа с механизмами

Не установлено влияния препарата на выполнение потенциально опасных видов деятельности, требующих особого внимания и быстрых реакций (работа диспетчера, управление автотранспортом, работа с движущимися механизмами).

3. Применение препарата Камфорный спирт-Арго

Всегда применяйте данный препарат в полном соответствии с листком-вкладышем или рекомендациями лечащего врача или работника аптеки. При появлении сомнений посоветуйтесь с лечащим врачом или работником аптеки.

Рекомендуемая доза

Миалгия, миозит, артралгия, ишиас:

наносите на кожу над пораженной областью 2-3 раза в день. Продолжительность лечения 7-10 суток.

Профилактика образования пролежней:

обрабатывайте кожу 2-3 раза в день.

Путь и (или) способ введения

Наружно.

Если Вы применили препарата Камфорный спирт-Арго больше, чем следовало

Если Вы применили большую дозу, чем Вам назначено, обратитесь к врачу или в местную поликлинику или больницу. Не забудьте взять с собой упаковку лекарства, чтобы врачу было понятно, какое лекарство Вы применили.

При передозировке препаратом у Вас могут возникнуть возбуждение, увеличение частоты сердечных сокращений (тахикардия), внезапные непроизвольные сокращения мышц (судороги). При возникновении данных симптомов немедленно обратитесь за медицинской помощью.

Если Вы забыли применить препарат Камфорный спирт-Арго

Если Вы забыли применить препарат Камфорный спирт-Арго, не применяйте двойную дозу, чтобы компенсировать пропущенную, примените следующую дозу в обычное время. При наличии вопросов по применению препарата обратитесь к лечащему врачу или работнику аптеки.

4. Возможные нежелательные реакции

Подобно всем лекарственным препаратам, препарат Камфорный спирт-Арго может вызывать нежелательные реакции, однако они возникают не у всех.

Прекратите применение препарата Камфорный спирт-Арго и немедленно обратитесь к врачу, если заметите какой-либо из следующих побочных эффектов:

- покраснение кожи, зуд, сыпь (аллергические кожные реакции (крапивница));
- раздражение кожи;
- головная боль, головокружение.

Сообщение о нежелательных реакциях

Если у Вас возникают какие-либо нежелательные реакции, проконсультируйтесь с врачом или работником аптеки. Данная рекомендация распространяется на любые возможные нежелательные реакции, в том числе на не перечисленные в листке-вкладыше. Вы также можете сообщить о нежелательных реакциях напрямую через систему сообщений государств – членов Евразийского экономического союза. Сообщая о нежелательных реакциях, Вы помогаете получить больше сведений о безопасности препарата.

Республика Армения

«Центр экспертизы лекарств и медицинских технологий» ГНКО

Адрес: 0051, г. Ереван, пр. Комитаса, 49/5

Телефоны: +374 60 83-00-73, +374 10 23-08-96, 23-16-82

Горячая линия: (+374 10) 20-05-05, (+374 96) 22-05-05

Электронная почта: info@ampra.am, vigilance@pharm.am

www.pharm.am

5. Хранение препарата Камфорный спирт-Арго

Храните препарат в недоступном для ребенка месте так, чтобы ребенок не мог увидеть его. Не применяйте препарат после истечения срока годности (срока хранения), указанного на флаконе и картонной пачке после «Годен до:». Датой истечения срока годности является последний день данного месяца.

Хранить в оригинальной упаковке (флакон в пачке) при температуре не выше 25 °С.

Не выливайте препарат в канализацию. Уточните у работника аптеки, как следует утилизировать препарат, который больше не потребуется. Эти меры позволят защитить окружающую среду.

6. Содержимое упаковки и прочие сведения

Препарат Камфорный спирт-Арго содержит

Действующим веществом является камфора.

В 1 мл раствора содержится 20 мг камфоры.

Прочим ингредиентом (вспомогательным веществом) является:
этиловый спирт 70%.

Внешний вид препарата Камфорный спирт-Арго и содержимое его упаковки

Раствор для наружного применения спиртовой.

Прозрачная бесцветная жидкость с характерным запахом камфоры.

По 40 мл раствора во флаконы оранжевого стекла, укупоренные полиэтиленовыми пробками и навинчиваемыми крышками. 1 флакон вместе с листком-вкладышем помещают в пачку картонную.

Держатель регистрационного удостоверения

ООО «Арго-Фарм»

Республика Армения,

0012, Ереван, ул. Сундукяна 13 кв. 9

Тел.: (+374 11) 74-40-80, (+374 12) 74-40-80

info@argopharm.am

Производитель

Акционерное общество "Ярославская фармацевтическая фабрика" (АО "ЯФФ")

Российская Федерация,

Ярославская область, г. Ярославль, ул. 1-я Путевая, д. 5, 150030

За любой информацией о препарате, а также в случае возникновения претензий следует обращаться к местному представителю держателя регистрационного удостоверения:

ООО «Арго-Фарм»

Республика Армения,

0012, Ереван, ул. Сундукяна 13 кв. 9

Тел.: (+374 11) 74-40-80, (+374 12) 74-40-80

info@argopharm.am

Листок-вкладыш пересмотрен:

Прочие источники информации

Подробные сведения о данном препарате содержатся на веб сайте Союза
<http://eec.eaeunion.org>.