

Листок-вкладыш – информация для пациента

Фервекс, 500 мг + 25 мг + 200 мг

Порошок для приготовления раствора для приема внутрь, лимонный

Действующие вещества: парацетамол + фенирамин + аскорбиновая кислота

Перед приемом препарата полностью прочитайте листок-вкладыш, поскольку в нем содержатся важные для Вас сведения.

- Сохраните листок-вкладыш. Возможно, Вам потребуется прочитать его еще раз.
- Если у Вас возникли дополнительные вопросы, обратитесь к лечащему врачу.
- Препарат назначен именно Вам. Не передавайте его другим людям. Он может навредить им, даже если симптомы их заболевания совпадают с Вашими.
- Если у Вас возникли какие-либо нежелательные реакции, обратитесь к лечащему врачу. Данная рекомендация распространяется на любые возможные нежелательные реакции, в том числе на не перечисленные в разделе 4 листка-вкладыша.

Содержание листка-вкладыша

1. Что из себя представляет препарат Фервекс, и для чего его применяют.
2. О чем следует знать перед применением препарата Фервекс.
3. Прием препарата Фервекс.
4. Возможные нежелательные реакции.
5. Хранение препарата Фервекс.
6. Содержимое упаковки и прочие сведения.

1. Что из себя представляет препарат Фервекс и для чего его применяют
Фармакотерапевтическая группа: анальгетики; другие анальгетики и антипиретики; анилиды, код АТХ: N02BE51. Фервекс – комбинированный препарат, который содержит парацетамол, фенирамин и аскорбиновую кислоту. Парацетамол – ненаркотический анальгетик, блокирует циклооксигеназу, преимущественно в центральной нервной системе, воздействуя на центры боли и терморегуляции; оказывает анальгезирующее и жаропонижающее действие. Фенирамин – блокатор H1-гистаминовых рецепторов, снижает ринорею и слезотечение, устраняет спастические явления, отечность и гиперемия слизистой оболочки полости носа, носоглотки и придаточных пазух носа.

Аскорбиновая кислота (витамин С) участвует в регулировании окислительно-восстановительных процессов, углеводного обмена, свертываемости крови, регенерации тканей, в синтезе стероидных гормонов; уменьшает сосудистую проницаемость, снижает потребность в витаминах B1, B2, A, E, фолиевой кислоте, пантотеновой кислоте. Улучшает переносимость парацетамола и удлиняет его действие (связано с удлинением T1/2).

Показания к применению:

Препарат рекомендован к применению у детей с 15 лет и взрослых при острых респираторных заболеваниях, острых респираторных вирусных инфекциях, ринофарингите для облегчения следующих симптомов:

- ринорея, заложенность носа;
- головная боль;
- повышенная температура тела;
- слезотечение;
- чихание.

Если улучшение не наступило или Вы чувствуете ухудшение, необходимо обратиться к врачу.

2. О чем следует знать перед применением препарата Фервекс**Противопоказания****Не принимайте препарат Фервекс, если:**

- у Вас аллергия на парацетамол, фенирамин, аскорбиновую кислоту или любое из вспомогательных веществ, перечисленных в разделе 6 листка-вкладыша;
- у Вас эрозивно-язвенные поражения желудочно-кишечного тракта (в фазе обострения);
- у Вас тяжелая печеночная недостаточность;
- у Вас закрытоугольная глаукома;
- у Вас задержка мочи, связанная с заболеваниями предстательной железы и нарушениями мочеиспускания;
- у Вас портальная гипертензия;
- у Вас алкоголизм;
- у Вас фенилкетонурия, так как препарат содержит аспартам (E951);
- у Вас дефицит глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы;
- у Вас детский возраст (до 15 лет);
- у Вас беременность и период лактации (безопасность не изучена).

Особые указания и меры предосторожности

Перед применением препарата Фервекс проконсультируйтесь с лечащим врачом.

В случае передозировки или случайного применения слишком высокой дозы немедленно обратитесь к врачу.

Препарат не содержит сахара и может применяться пациентами с сахарным диабетом.

Фервекс не следует применять одновременно с другими лекарствами, содержащими парацетамол и/или фенирамина малеат или другие антигистаминные препараты, и/или

витамин С, включая препараты, отпускаемые без рецепта. Не принимайте их одновременно, чтобы не превышать рекомендуемую суточную дозу (см. раздел 3 **Применение препарата Фервекс**). При необходимости принимать другие препараты, содержащие эти вещества, одновременно с препаратом Фервекс сначала проконсультируйтесь с врачом или работником аптеки.

При превышении рекомендованных доз и при длительном применении может появиться психическая зависимость от препарата.

В связи с наличием парацетамола в препарате

Перед приемом препарата сообщите своему врачу или фармацевту при наличии у Вас любого из следующих состояний:

- Ваш вес ниже 50 кг,
- у Вас гепатоцеллюлярная недостаточность от легкой до умеренной степени тяжести,
- Вы воздерживаетесь от приёма пищи, у Вас хроническая недостаточность питания (низкий запас печеночного глутатиона),
- у Вас обезвоживание,
- у Вас почечная недостаточность,
- у Вас врожденные гипербилирубинемии (синдромы Жильбера, Дубина-Джонсона и Ротора),
- у Вас острый вирусный гепатит, или острый вирусный гепатит был диагностирован во время лечения препаратом Фервекс. В этом случае сообщите своему врачу. Врач может приостановить лечение.
- у Вас алкогольный гепатит,
- у Вас пожилой возраст.

Сообщите своему врачу, если что-либо из вышеперечисленного относится к Вам, прежде чем принимать это лекарственное средство.

Риск развития повреждений печени возрастает у больных с алкогольным гепатозом.

В связи с наличием фенирамина в препарате

Не следует применять одновременно с препаратами, обладающими снотворным и анксиолитическим действием (особенно барбитуратами) и натрия оксибутиратом (см. раздел **Другие лекарственные препараты и препарат Фервекс**).

В связи с наличием аскорбиновой кислоты в препарате

Перед приемом препарата Фервекс проконсультируйтесь с лечащим врачом или работником аптеки, если у Вас нарушения обмена железа и дефицит глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы.

Дети и подростки

Препарат Фервекс противопоказан к применению у детей от 0 до 15 лет (см. раздел **Противопоказания**).

Режим дозирования у подростков в возрасте от 15 до 18 лет не отличается от режима дозирования для взрослых.

Другие лекарственные препараты и препарат Фервекс

Сообщите своему врачу или фармацевту, если вы принимаете, недавно принимали или собираетесь принимать какие-либо другие препараты.

Относительно присутствия парацетамола

Глюкокортикостероиды при одновременном применении увеличивают риск развития глаукомы. Приём одновременно с салицилатами повышает риск токсического действия на почки (нефротоксического действия).

При использовании препарата, вместе с барбитуратами, трициклическими антидепрессантами, противосудорожными средствами (фенитоин), флумецинолом, фенилбутазоном, рифампицином и этанолом, значительно повышается риск токсического действия на печень (гепатотоксического действия).

Парацетамол, содержащийся в препарате, усиливает действие препаратов для уменьшения свертывания крови (антикоагулянтов непрямого действия) и снижает эффективность препаратов, которые увеличивают выведение мочевой кислоты с мочой (урикозурических препаратов).

Сочетания, требующие соблюдения мер предосторожности при применении

- Антагонисты витамина К

Существует риск усиления действия антагонистов витамина К (антикоагулянтов непрямого действия, уменьшающих свертываемость крови) и риск кровотечения при одновременном приеме парацетамола в максимальных дозах (4 г/день) в течение не менее 4 суток.

Сообщите своему врачу об одновременном приеме препарата Фервекс и антагонистов витамина К, так как возможно потребуются корректировка дозировки антивитамина К во время лечения препаратом Фервекс и после его прекращения.

- Флуклоксациллин

Соблюдайте осторожность при одновременном применении препарата Фервекс (в основном в высоких дозах и/или при длительном применении) с антибиотиком флуклоксациллином, поскольку одновременный прием этих препаратов был связан с метаболическим ацидозом с высоким анионным разрывом, особенно в случаях наличия у Вас тяжелой почечной недостаточности, циркуляции бактерий и их токсинов в крови, вызывающая поражение органов (сепсиса), недостаточного питания, хронического алкоголизма, а также при

применении максимальных суточных доз парацетамола. В данном случае проконсультируйтесь с врачом.

- Влияние на результаты лабораторных обследований

Прием препарата Фервекс, содержащего парацетамол, может исказить результаты анализа на глюкозу в крови глюкозооксидазно-пероксидазным методом в случае аномально высоких концентраций.

Прием препарата Фервекс, содержащего парацетамол, может исказить результаты определения мочевой кислоты в крови методом фосфорноватистой кислоты.

Сообщите врачу о приеме препарата Фервекс в случае назначения Вам врачом анализов на содержание мочевой кислоты или сахара в крови.

Относительно присутствия фенирамина

Нежелательные сочетания

- Этиловый спирт (в качестве напитка или вспомогательного вещества)

Алкоголь усиливает седативный эффект H1-антигистаминных препаратов. Снижение бдительности может сделать небезопасным вождение автомобиля и работу с механизмами. Избегайте приема алкогольных напитков и лекарственных препаратов, содержащих алкоголь во время лечения препаратом Фервекс (также см. раздел **Препарат Фервекс и алкоголь**).

- Оксibuтират натрия

Данное сочетание усиливает угнетение центральной нервной системы. Снижение бдительности может сделать небезопасным вождение автомобиля и работу с механизмами.

Комбинации, которые должны быть приняты во внимание

- Другие атропиновые препараты: имипраминовые антидепрессанты, большинство атропиновых H1-антигистаминных препаратов, холинолитические антипаркинсонические препараты, атропиновые спазмолитики, дизопирамид, фенотиазиновые нейролептики, а также клозапин.

Данное сочетание усиливает нежелательные эффекты атропина, как задержка мочи, запор, сухость во рту.

- Другие седативные препараты: производные морфина (анальгетики, средства для подавления кашля и заместительная терапия), нейролептики, барбитураты, бензодиазепины, небензодиазепиновые анксиолитики (например, мепробамат, производные фенотиазина), гипнотики, седативные антидепрессанты (амитриптилин, доксепин, миансерин, мirtазапин, тримипрамин), седативные H1-антигистаминные препараты, средства для понижения артериального давления (центральные антигипертензивные средства), баклофен и талидомид.

Данное сочетание усиливает угнетение центральной нервной системы. Снижение

бдительности может сделать небезопасным вождение автомобиля и работу с механизмами.

- Антихолинэстеразные препараты

Данное сочетание приводит к риску снижения эффективности антихолинэстераз.

- Опиоидные препараты

Данное сочетание приводит к значительному риску нарушения функции (акинезии) толстой кишки, с тяжелыми запорами.

Относительно присутствия аскорбиновой кислоты

Аскорбиновая кислота повышает концентрацию в крови бензилпенициллина и тетрациклинов; в дозе 1 г/день повышает биодоступность этинилэстрадиола (в т. ч. входящего в состав пероральных контрацептивов). Улучшает всасывание в кишечнике препаратов железа; может повышать выведение железа при одновременном применении с дефероксамином. Снижает эффективность гепарина и непрямых антикоагулянтов.

Препарат Фервекс и алкоголь

Во избежание токсического поражения печени парацетамол не следует сочетать с приемом алкогольных напитков, а также принимать лицам, склонным к хроническому потреблению алкоголя. Алкоголь усиливает седативное действие антигистаминных препаратов, поэтому следует избегать его приема в период лечения препаратом Фервекс. Кроме того, этанол при одновременном применении с фенирамином способствует развитию острого панкреатита.

Беременность, грудное вскармливание и фертильность

Если Вы беременны или кормите грудью, думаете, что забеременели, или планируете беременность, перед началом применения препарата проконсультируйтесь с лечащим врачом.

Беременность

Клинические данные о применении парацетамола в сочетании с витамином С и фенирамином отсутствуют.

Большое количество данных о применении у беременных женщин не указывает ни на пороки развития, ни на фето/неонатальную токсичность. Эпидемиологические исследования развития нервной системы у детей, подвергшихся воздействию парацетамола внутриутробно, показывают неубедительные результаты.

Следовательно, в качестве меры предосторожности, препарат Фервекс не рекомендуется применять во время беременности (см. раздел **Противопоказания**).

Грудное вскармливание

В отсутствие исследований на животных и клинических данных на людях риск для ребенка, находящегося на грудном вскармливании, неизвестен. Поэтому препарат Фервекс запрещено применять в период грудного вскармливания (см. раздел **Противопоказания**).

Фертильность

Из-за потенциального механизма действия на циклооксигеназу и синтез простагландинов, парацетамол может ухудшать фертильность у женщин, влияя на овуляцию. Данный эффект является обратимым после прекращения приема препарата. Поэтому не принимайте препарат Фервекс, если Вы хотите забеременеть.

Влияние на мужскую фертильность наблюдалось в одном исследовании на животных. Значимость этих эффектов для людей неизвестна.

Управление транспортными средствами и работа с механизмами

Препарат Фервекс оказывает сильное влияние на способность управлять транспортными средствами и работать с механизмами. Учитывая возможность развития таких нежелательных эффектов, как сонливость и головокружение, в период лечения препаратом рекомендуется воздержаться от управления автомобилем и механизмами. Этот эффект усиливается при употреблении алкогольных напитков, спиртосодержащих лекарственных препаратов или седативных препаратов.

Препарат Фервекс содержит маннитол, аспартам (источник фенилаланина) и этанол

В состав препарата входит маннитол. Маннитол может оказывать слабое слабительное действие.

В состав препарата входит аспартам. Аспартам содержит источник фенилаланина. Может оказаться вредным для людей с фенилкетонурией.

Данный препарат содержит менее 1 ммоль (23 мг) натрия на один пакетик, то есть, по сути, не содержит натрия.

Данный лекарственный препарат содержит 3 мг этанола (алкоголя) в каждом пакете. Что равно менее чем 1 мл пива или 1 мл вина на дозу. Вреден для лиц с алкоголизмом. Необходимо учитывать детям и таким группам высокого риска, как пациенты с заболеваниями печени и эпилепсией.

3. Применение препарата Фервекс

Всегда принимайте препарат в полном соответствии с листком-вкладышем или с рекомендациями данными Вам лечащим врачом или работником аптеки. При появлении сомнений посоветуйтесь с лечащим врачом или работником аптеки.

Рекомендуемая доза

Данная лекарственная форма предназначена для взрослых и детей с 15 лет.

Возраст (масса тела)	Доза на 1 прием	Интервал между приемами	Максимальная суточная доза
----------------------	-----------------	-------------------------	----------------------------

Взрослые и дети старше 15 лет (более 50 кг)	1 пакетик	Не менее 4 часов	3 пакетика
--	------------------	-----------------------------	-------------------

Относительно присутствия парацетамола в лекарственном препарате

Максимальная суточная доза парацетамола (учитывая все другие препараты, содержащие парацетамол, которые Вы можете принимать) у взрослых и детей при массе тела более 50 кг не должна превышать 4 грамма в день.

Пациенты с почечной недостаточностью

Если у Вас нарушения функции почек при клиренсе креатинина менее 10 мл/мин интервал между приемами препарата должен составлять не менее 8 часов. При клиренсе креатинина 10–50 мл/мин интервал между приемами препарата должен составлять не менее 6 часов. При клиренсе креатинина более 50 мл/мин интервал между приемами препарата должен составлять не менее 4 часов. Суммарная доза парацетамола (учитывая все другие препараты, содержащие парацетамол, которые Вы можете принимать) не должна превышать 3 грамма в день.

Способ и путь введения

Внутрь.

Перед применением содержимое пакетика необходимо растворить в достаточном количестве горячей или холодной воды. При гриппоподобных заболеваниях рекомендуется принимать препарат вечером с горячей водой.

Частота применения

Интервал между приемами препарата должен быть не менее 4 часов. У пациентов с серьезными нарушениями функции почек интервал между приемами препарата должен составлять не менее 8 часов.

Длительность лечения

Максимальная длительность лечения составляет 5 дней.

Не следует принимать препарат более 3-х дней в качестве жаропонижающего средства и более 5 дней в качестве обезболивающего средства.

Если не наблюдается облегчения симптомов в течение 5 дней после начала приема препарата, сохраняется повышенная температура тела или после первоначального снижения она внезапно повышается снова, необходимо обратиться к врачу.

Если Вы приняли препарата Фервекс больше, чем следовало

Необходимо прекратить лечение и немедленно обратиться к врачу или в службу

неотложной медицинской помощи. Возьмите с собой упаковку и/или данный листок - вкладыш, чтобы показать врачу, какой препарат Вы приняли.

Передозировка может привести к летальному исходу.

В первые 24 часа основными симптомами отравления являются тошнота, рвота, бледность, недомогание, потливость, снижение аппетита, ощущение дискомфорта и (или) боль в животе.

Передозировка может вызвать повреждение печени, воспаление головного мозга, кому и даже смерть, особенно в группах повышенного риска, например дети, пожилые люди и в определенных ситуациях (заболевания печени или почек, хронический алкоголизм, хроническая недостаточность питания, голодание, недавняя потеря веса, синдром Жильбера и у пациентов, одновременно принимающих некоторые препараты). Также сообщалось о случаях воспаления поджелудочной железы, почечной недостаточности и одновременном снижении в крови эритроцитов, лейкоцитов и тромбоцитов.

Передозировка фенирамина может вызвать судороги (особенно у детей), потерю сознания и кому.

Передозировка аскорбиновой кислоты может вызвать желудочно-кишечные расстройства (изжогу, диарею, боль в животе).

Если Вы забыли принять препарат Фервекс

Не принимайте двойную дозу, чтобы компенсировать пропущенную дозу.

Если у Вас есть дополнительные вопросы по применению этого лекарственного средства, обратитесь к врачу.

4. Возможные нежелательные реакции

Подобно всем лекарственным препаратам препарат может вызывать нежелательные реакции, однако они возникают не у всех.

Связанные с наличием в составе парацетамола

Некоторые нежелательные реакции могут оказаться серьезными. Немедленно прекратите лечение, предупредите лечащего врача, и никогда больше не принимайте препараты, содержащие парацетамол, если у Вас появился один из нижеперечисленных симптомов, которые

- наблюдались редко – могут возникать не более, чем у 1 человека из 1000:

- Крапивница, покраснение кожи (эритема), кожная сыпь;

- наблюдались очень редко – могут возникать не более чем у 1 человека из 10000:

- Серьезные кожные реакции,

- наблюдались с неизвестной частотой – исходя из имеющихся данных частоту возникновения определить невозможно:

- Сыпь или покраснение кожи или аллергическая реакция (анафилактическая реакция), которая может проявляться в виде резкого отека лица и шеи, что может привести к затруднению дыхания (отек Квинке, ангионевротический отек) или резкому недомоганию с падением артериального давления (анафилактический шок),
- Бронхоспазм.

Немедленно прекратите лечение, и в дальнейшем консультируйтесь с лечащим врачом перед приемом любых препаратов, содержащих парацетамол, если у Вас появились симптомы, которые наблюдались с неизвестной частотой – исходя из имеющихся данных частоту возникновения определить невозможно:

- Подкожные кровоизлияния (пурпура),
- Не проходящее покраснение кожи, вызванное приемом определенных лекарственных средств (стойкая лекарственная эритема),

Другие возможные нежелательные реакции, которые могут наблюдаться при приеме препарата Фервекс:

- очень редко – могут возникать не более чем у 1 человека из 10000:

- Биологические изменения, требующие проведения анализа крови: нарушения в работе печени, аномально низкий уровень определенных белых кровяных телец (лейкопения) или таких клеток крови, как тромбоциты (тромбоцитопения) или нейтрофилы (нейтропения), что может привести к развитию кровотечения из носа или десен,

- неизвестно – частота не может быть оценена на основе имеющихся данных:

- Критическое снижение содержания гранулоцитов в крови (агранулоцитоз),
- Снижение количества эритроцитов и гемоглобина в крови (анемия),
- Диарея, боли в животе,
- Повышенный уровень ферментов печени,
- Повышенная кислотность крови вследствие накопления пироглутаминовой кислоты (пироглутаминовый ацидоз) на фоне низкого уровня глутатиона,
- Острый генерализованный экзантематозный пустулез,
- Токсический эпидермальный некролиз,
- Синдром Стивенса-Джонсона.

В случае наличия подобных симптомов обратитесь к врачу.

Связанные с наличием в составе фенирамина

Некоторые нежелательные реакции могут оказаться серьезными. Немедленно прекратите лечение, предупредите лечащего врача, и никогда больше не принимайте препараты,

содержащие фенирамин, если у Вас появился один из нижеперечисленных симптомов:

- Покраснение кожи (эритема), зуд, экзема, крапивница,
- Отек, реже отек Квинке, анафилактический шок,

Немедленно прекратите лечение, и в дальнейшем консультируйтесь с лечащим врачом перед приемом любых препаратов, содержащих фенирамин, если у Вас появился симптом:

- Подкожные кровоизлияния (пурпура).

Другие возможные нежелательные реакции, которые могут наблюдаться при приеме препарата Фервекс:

- Нарушения мочеиспускания (значительное снижение количества выделяемой мочи, затрудненное мочеиспускание),
- Сухость во рту, нарушения зрения (нарушения аккомодации, расширение зрачка (мидриаз)), запоры, ощущение сердцебиения,
- Нарушения памяти или концентрации, головокружение, нарушение равновесия (чаще встречается у пожилых пациентов),
- Спутанность сознания, галлюцинации,
- Нарушения координации движений, тремор,
- Сонливость и снижение бдительности, более выраженные в начале лечения,
- Падение артериального давления при переходе в положение стоя (ортостатическая гипотензия), которое может сопровождаться головокружением,
- Реже могут возникать возбуждение, нервозность, бессонница,
- Снижение содержания эритроцитов, лейкоцитов или тромбоцитов в крови, анемия, отличительным признаком которой является ускоренное разрушение красных кровяных телец (гемолитическая анемия).

В случае наличия подобных симптомов обратитесь к врачу.

Сообщение о нежелательных реакциях

Если у Вас возникают какие-либо нежелательные реакции, проконсультируйтесь с лечащим врачом или работником аптеки. Данная рекомендация также относится к любым нежелательным реакциям, не указанным в листке-вкладыше. Вы также можете сообщить о нежелательных реакциях напрямую через систему сообщений государства-члена Евразийского экономического союза. Сообщая о нежелательных реакциях, Вы помогаете получить больше сведений о безопасности препарата.

Республика Армения

«ГНКО «Центр экспертизы лекарств и медицинских технологий»

Адрес: 0051, г. Ереван, пр. Комитаса, 49/5

Телефон: (+374 10) 20-05-05, (+374 96) 22-05-05

Адрес электронной почты: vigilance@pharm.am

Интернет-сайт: www.pharm.am

Республика Казахстан

РГП на ПХВ «Национальный Центр экспертизы лекарственных средств и медицинских изделий» Комитета медицинского и фармацевтического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан

Адрес: 010000, г. Астана, район Байконыр, ул. А. Иманова, 13 (БЦ «Нурсаулет 2»)

Телефон.: +7 (7172) 235 135

Адрес электронной почты: farm@dari.kz

Интернет-сайт: www.ndda.kz

Республика Кыргызстан

Департамент лекарственных средств и медицинских изделий Министерства здравоохранения Кыргызской Республики

Адрес: 720044, г. Бишкек, ул. 3-я линия, 25

Телефон: (996) 312 21-92-86, факс: 21-05-08

Адрес электронной почты: dlsmi@pharm.kg

Интернет-сайт: <http://www.pharm.kg/>

Российская Федерация

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор)

Адрес: 109012, г. Москва, Славянская площадь, д. 4, строение 1

Телефон: +7 800 550 99 03

Адрес электронной почты: pharm@roszdravnadzor.gov.ru

Интернет-сайт: <https://www.roszdravnadzor.gov.ru>

5. Хранение препарата Фервекс

Храните препарат в недоступном для ребенка месте так, чтобы ребенок не мог увидеть его. Не принимайте препарат после истечения срока годности, указанного на пакетике и картонной упаковке (пачке) после «Годен до:». Датой истечения срока годности является последний день данного месяца.

Хранить при температуре от 15 до 25 °С.

Не выбрасывайте препарат в канализацию. Уточните у работника аптеки, как следует утилизировать препарат, который больше не потребуется. Эти меры позволяют защитить окружающую среду.

6. Содержимое упаковки прочие сведения

Препарат Фервекс содержит:

Действующими веществами препарата Фервекс являются парацетамол, фенирамина

малеат и аскорбиновая кислота.

Каждый пакетик, содержит 0,500 г парацетамола, 0,025 г фенирамина малеата и 0,200 г аскорбиновой кислоты.

Вспомогательными веществами являются

маннитол; лимонная кислота; повидон К30; магния цитрат; аспартам, ароматизатор лимонный*.

*Состав ароматизатора лимонного: компоненты, придающие аромат – α -пинен; β -пинен, сабинен, мирцен, лимонен, γ -терпинен, пара-цимен, линалоол, нераль, гераниаль, геранилацетат, гераниол; другие компоненты – триацетин (E1518), крахмал модифицированный (E1450), камедь акации (E414), этанол.

Внешний вид препарата Фервекс и содержимое упаковки

Порошок для приготовления раствора для приема внутрь, лимонный.

Порошок белого или почти белого цвета. Допускается наличие вкраплений коричневого цвета.

По 4,95 г в пакетик из бумаги/алюминия/полиэтилена. По 8 пакетиков вместе с инструкцией по применению (листком-вкладышем) в пачку картонную.

Держатель регистрационного удостоверения и производитель

Держатель регистрационного удостоверения:

Франция

УПСА САС

3, rue Жозеф Монье, 92500 Рюэй-Мальмезон, Франция.

UPSA SAS

3, rue Joseph Monier, 92500 Rueil-Malmaison, France.

Производитель:

Франция

УПСА САС

979 авеню де Пирене, 47520 Ле Пассаж, Франция.

UPSA SAS

979 avenue des Pyrenees, 47520 Le Passage, France.

За любой информацией о препарате, а также в случаях возникновения претензий следует обращаться к местному представителю держателя регистрационного удостоверения или держателю регистрационного удостоверения:

Республика Армения

Представительство Акционерного общества «Дельта Медикел Промоушнз АГ» (Швейцария),

050010, Алматы, улица Казыбек Би 20А, офис 308

Телефон: +7 771 504 54 13

Адрес электронной почты: quality@deltaswiss.eu

Республика Казахстан

Представительство Акционерного общества «Дельта Медикел Промоушнз АГ»
(Швейцария),

050010, Алматы, улица Казыбек Би 20А, офис 308

Телефон: +7 771 504 54 13

Адрес электронной почты: quality@deltaswiss.eu

Республика Кыргызстан

Представительство Акционерного общества «Дельта Медикел Промоушнз АГ»
(Швейцария),

050010, Алматы, улица Казыбек Би 20А, офис 308

Телефон: +7 771 504 54 13

Адрес электронной почты: quality@deltaswiss.eu

Российская Федерация

ООО «Свикс Хэлскеа»

105064, Москва, ул. Земляной вал, дом 9

Тел.: 8 (495) 229-06-61

Адрес электронной почты: russia.info@swixxbiopharma.com

Листок-вкладыш пересмотрен:

Прочие источники информации

Подробные сведения о данном препарате содержатся на веб-сайте Союза
<https://eec.eaeunion.org/>