

Листок-вкладыш – информация для пациента

Аскофен-Дарница, 200 мг / 200 мг / 40 мг, таблетки

Действующие вещества: ацетилсалициловая кислота / парацетамол / кофеин

Перед приемом препарата полностью прочитайте листок-вкладыш, поскольку в нем содержатся важные для Вас сведения.

- Данный лекарственный препарат, является препаратом, отпускаемым без рецепта.
- Всегда принимайте препарат в точности с листком-вкладышем или рекомендациями лечащего врача или работника аптеки.
- Сохраните листок-вкладыш. Возможно, Вам потребуется прочитать его еще раз.
- Если Вам нужны дополнительные сведения или рекомендации, обратитесь к работнику аптеки.
- Если у Вас возникли какие-либо нежелательные реакции, обратитесь к лечащему врачу или работнику аптеки. Данная рекомендация распространяется на любые возможные нежелательные реакции, в том числе на не перечисленные в разделе 4 листка-вкладыша.
- Если состояние не улучшается или оно ухудшается, Вам следует обратиться к врачу.

Содержание листка-вкладыша

1. Что из себя представляет препарат Аскофен-Дарница, и для чего его применяют.
2. О чем следует знать перед приемом препарата Аскофен-Дарница.
3. Прием препарата Аскофен-Дарница.
4. Возможные нежелательные реакции.
5. Хранение препарата Аскофен-Дарница.
6. Содержимое упаковки и прочие сведения.

1. Что из себя представляет препарат Аскофен-Дарница, и для чего его применяют

Препарат Аскофен-Дарница содержит ацетилсалициловую кислоту, парацетамол, кофеин.

Относится к группе: анальгетики, другие анальгетики и антипиретики. Ацетилсалициловая кислота, комбинации без психолептиков.

Показания к применению

- лечение слабого или умеренного болевого синдрома: при головной или зубной боли, невралгии, миалгии, артралгии, при первичной дисменорее;
- как жаропонижающее средство при заболеваниях, которые сопровождаются лихорадкой.

Способ действия препарата Аскофен-Дарница

Лекарственный препарат оказывает анальгезирующее, жаропонижающее и противовоспалительное действие. Компоненты, входящие в состав лекарственного препарата, усиливают эффекты друг друга.

Если улучшение не наступило или Вы чувствуете ухудшение, необходимо обратиться к врачу.

2. О чем следует знать перед приемом препарата Аскофен-Дарница

Противопоказания

Не принимайте препарат Аскофен-Дарница, если у Вас:

- аллергия на ацетилсалициловую кислоту, парацетамол, кофеин или любые другие компоненты препарата (перечисленные в разделе 6 листка-вкладыша);
- аллергия на другие производные ксантинов (теофиллин, теобромин), другие салицилаты;
- бронхиальная астма, крапивница или ринит, вызванные приемом салицилатов или других нестероидных противовоспалительных препаратов (НПВП) в анамнезе;
- врожденная гипербилирубинемия, выраженная почечная недостаточность или печеночная недостаточность, синдром Жильбера, врожденная недостаточность глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы;
- заболевания крови, гемофилия, геморрагический диатез, гипопротромбинемия, анемия, лейкопения, повышенная склонность к кровотечениям, тромбоз, тромбофлебит, геморрагические болезни;
- острые желудочно-кишечные язвы, желудочно-кишечное кровотечение, хирургические вмешательства, сопровождающиеся значительным кровотечением;
- тяжелые сердечно-сосудистые заболевания, включая нарушения ритма, пароксизмальную тахикардию, выраженный атеросклероз, тяжелую форму ишемической болезни сердца, выраженную сердечную недостаточность, острый инфаркт миокарда, выраженную артериальную гипертензию, портальную гипертензию, склонность к спазму сосудов;
- состояния повышенного возбуждения, нарушения сна, пожилой возраст, алкоголизм, глаукома, гипертиреоз, острый панкреатит, гипертрофия предстательной железы, тяжелые формы сахарного диабета.

Не принимайте препарат Аскофен-Дарница одновременно с ингибиторами МАО, а также в течение 2 недель после прекращения их применения; с трициклическими антидепрессантами или β -блокаторами; в комбинации с метотрексатом в дозе 15 мг/неделю или больше.

Особые указания и меры предосторожности

Перед приемом препарата Аскофен-Дарница проконсультируйтесь с лечащим врачом или работником аптеки.

Если у Вас функциональная недостаточность печени или почек, Вы должны уменьшить дозу лекарственного препарата или увеличить интервал между приемами. При нарушении функции почек и печени интервал между приемами должен быть не менее 8 часов.

При длительном применении лекарственного препарата Вы должны проверять наличие крови в кале для выявления ulcerогенного действия и сдать анализы крови (влияние на агрегацию тромбоцитов, некоторая антикоагулянтная активность).

При гипертермии лекарственный препарат желательно назначать только в случае неэффективности других анальгетиков-антипиретиков, поскольку существует риск развития синдрома Рея. Если в результате применения лекарственного препарата возникнет рвота, то следует заподозрить синдром Рея.

Вы должны учитывать, что у больных с алкогольным поражением печени увеличивается риск гепатотоксического действия парацетамола. Заболевания печени повышают риск поражения печени парацетамолем. Опасность передозировки выше у пациентов с нециррозными алкогольными заболеваниями печени.

У пациентов с тяжелыми инфекциями, такими как сепсис, которые сопровождаются снижением уровня глутатиона, при приеме парацетамола повышается риск возникновения метаболического ацидоза. Симптомами метаболического ацидоза

является глубокое, учащенное или затрудненное дыхание, тошнота, рвота, потеря аппетита. Вы должны немедленно обратиться к врачу в случае появления этих симптомов.

При хирургических операциях (в том числе стоматологических) применение лекарственных препаратов, содержащих ацетилсалициловую кислоту, повышает вероятность появления/усиления кровотечения, что обусловлено угнетением агрегации тромбоцитов в течение некоторого времени после применения ацетилсалициловой кислоты. За 5–7 суток до хирургического вмешательства Вы должны отменить применение лекарственного препарата (для снижения риска повышенной кровоточивости).

Вы должны заранее предупредить врача о приеме лекарственного препарата Аскофен-Дарница.

У пациентов с аллергическими осложнениями, в том числе с бронхиальной астмой, аллергическим ринитом, крапивницей, кожным зудом, отеком слизистой оболочки и поллинозом носа, а также при их сочетании с хроническими инфекциями дыхательных путей и у больных с гиперчувствительностью к нестероидным противовоспалительным препаратам возможно развитие бронхоспазма или приступа бронхиальной астмы, поэтому противопоказано применение НПВП этой категории пациентов.

Ацетилсалициловая кислота, входящая в состав лекарственного препарата, даже в небольших дозах может снижать выведение мочевой кислоты из организма, что может стать причиной острого приступа подагры у чувствительных пациентов.

Вы должны проконсультироваться с врачом, если принимаете анальгетики каждый день при артритах легкой формы; в случае, если применяете варфарин или подобные лекарственные препараты, имеющие антикоагулянтный эффект; при применении лекарственного препарата перед началом приема ибупрофена как обезболивающего средства.

Вы не должны принимать препарат Аскофен-Дарница при гиперчувствительности к анальгетическим, противовоспалительным, противоревматическим средствам, и с осторожностью, при одновременном применении антикоагулянтов, если у Вас нарушения кровообращения (например, патология сосудов почки, застойная сердечная недостаточность, гиповолемия, обширные операции, сепсис или сильные кровотечения), поскольку ацетилсалициловая кислота также увеличивает риск нарушения функции почек и острой почечной недостаточности. Ибупрофен может уменьшить ингибиторное влияние ацетилсалициловой кислоты на агрегацию тромбоцитов.

Вам рекомендуется быть осторожными при одновременном применении парацетамола с флуоксацилином из-за повышенного риска метаболического ацидоза с высокой анионной щелью, особенно если у Вас тяжелая почечная недостаточность, сепсис, при недоедании и при наличии других причин дефицита глутатиона (например, хронический алкоголизм), а также в случае применения максимальных суточных доз парацетамола. Рекомендуется тщательный мониторинг Вашего состояния, включая измерение 5-оксопролина в моче.

Лекарственный препарат может влиять на результаты лабораторных исследований относительно содержания в крови глюкозы и мочевой кислоты.

Не рекомендуется применять лекарственный препарат без консультации врача более 5 дней как анальгезирующее и более 3 дней как жаропонижающее средство.

Если симптомы не исчезают, Вы должны обратиться к врачу.

Если головная боль становится постоянной, Вы должны обратиться к врачу.

Противопоказано назначать больным бронхиальной астмой, при повышенной кровоточивости, и с особой осторожностью при одновременной терапии антикоагулянтами (кумарин и гепарин), при нарушениях функции печени и заболеваниях почек, а также при одновременном проведении противовоспалительной терапии.

Дети и подростки

Не давайте препарат детям в возрасте до 18 лет из-за риска развития синдрома Рея (гиперпирексия, метаболический ацидоз, нарушения со стороны нервной системы и психики, рвота, нарушения функции печени) при гипертермии на фоне вирусных заболеваний.

Другие препараты и препарат Аскофен-Дарница

Сообщите лечащему врачу или работнику аптеки о том, что Вы принимаете, недавно принимали или можете начать принимать какие-либо другие препараты.

Противопоказанные комбинации.

Не принимайте препарат Аскофен-Дарница вместе с метотрексатом в дозе 15 мг/неделю и более, поскольку это может привести к повышению гематологической токсичности метотрексата вследствие снижения почечного клиренса метотрексата противовоспалительными агентами и вытеснения его из связи с протеинами плазмы.

Не принимайте препарат Аскофен-Дарница вместе с ингибиторами МАО, поскольку при комбинированном применении с кофеином возможно опасное повышение артериального давления.

Комбинации, которые нужно применять с осторожностью.

Парацетамол: противосудорожные лекарственные препараты (включая фенитоин, барбитураты, карбамазепин), антидепрессанты и другие стимуляторы микросомального окисления – эти лекарственные препараты увеличивают продукцию гидроксилированных активных метаболитов, влияющих на функцию печени, предопределяя возможность развития тяжелых интоксикаций при небольших передозировках лекарственного препарата.

При одновременном применении с гепатотоксическими средствами увеличивается токсическое влияние лекарственных препаратов на печень. Одновременное применение высоких доз парацетамола с изониазидом повышает риск развития гепатотоксического синдрома.

Скорость всасывания парацетамола может увеличиваться при одновременном применении с метоклопрамидом и домперидоном и уменьшаться при применении с холестирамином. Парацетамол снижает эффективность диуретиков. Производные кумарина (варфарина) при длительном применении парацетамола повышают риск развития кровотечений.

Под воздействием парацетамола увеличивается в 5 раз период полувыведения хлорамфеникола.

Вы должны быть осторожными при одновременном применении парацетамола с флуклоксациллином, поскольку одновременный прием ассоциируется с метаболическим ацидозом с высокой анионной щелью, особенно у пациентов с факторами риска (см. «Особые указания и меры предосторожности»).

Кофеин: циметидин, гормональные контрацептивы, изониазид усиливают действие кофеина. Кофеин снижает эффект опиоидных анальгетиков, анксиолитиков, снотворных

и седативных средств, является антагонистом средств для наркоза и других лекарственных препаратов, угнетающих центральную нервную систему (ЦНС), конкурентным антагонистом лекарственных препаратов, угнетающим ЦНС, конкурентным антагонистом лекарственных препаратов аденозина, АТФ. При одновременном применении кофеина с эрготамином улучшается всасывание эрготамин из пищеварительного тракта, с тиреотропными средствами – повышается тиреоидный эффект. Кофеин снижает концентрацию лития в крови. Кофеин повышает эффект (улучшает биодоступность) анальгетиков-антипиретиков, потенцирует эффекты производных ксантина, α - и β -адреномиметиков, психостимулирующих средств.

Ацетилсалициловая кислота: одновременное применение с урикозурическими средствами, такими как бензобромарон, пробенецид, снижает эффект выведения мочевой кислоты (благодаря конкуренции выведения мочевой кислоты почечными канальцами). При одновременном применении с дигоксином концентрация последнего в плазме крови повышается вследствие снижения почечной экскреции. Ингибиторы АПФ в комбинации с высокими дозами ацетилсалициловой кислоты вызывают снижение фильтрации в клубочках вследствие ингибирования вазодилаторных простагландинов и снижение гипотензивного эффекта. Селективные ингибиторы обратного захвата серотонина: повышается риск кровотечения из верхних отделов пищеварительного тракта из-за возможности синергического эффекта. При одновременном применении с вальпроевой кислотой ацетилсалициловая кислота вытесняет ее из связи с протеинами плазмы крови, повышая токсичность.

Лекарственный препарат усиливает действие средств, уменьшающих свертывание крови и агрегацию тромбоцитов, побочное действие кортикостероидов, сульфонилмочевины, метотрексата.

Вы должны избегать комбинаций с барбитуратами, противосудорожными средствами, салицилатами, рифампицином.

Не принимайте препарат Аскофен-Дарница вместе с другими лекарственными препаратами, содержащими парацетамол, ацетилсалициловую кислоту.

Препарат Аскофен-Дарница с напитками и алкоголем

Во время лечения лекарственным препаратом Вам не рекомендуется употреблять чрезмерное количество напитков, содержащих кофеин (например кофе, чая). Это может вызывать нарушения сна, тремор, чувство напряжения, раздражительность, неприятные ощущения за грудиной из-за сердцебиения.

Во время лечения препаратом Аскофен-Дарница не употребляйте алкогольные напитки из-за повышения риска желудочно-кишечного кровотечения.

Принимайте препарат Аскофен-Дарница, запивая водой, щелочными минеральными водами, раствором натрия гидрокарбоната (лучше всего – молоком) (см. раздел 3 «Прием препарата Аскофен-Дарница»).

Беременность и грудное вскармливание

Если Вы беременны или кормите грудью, предполагаете, что забеременели, или планируете беременность, перед началом применения препарата проконсультируйтесь с лечащим врачом или работником аптеки.

Беременность

Не принимайте препарат Аскофен-Дарница в период беременности.

Ацетилсалициловая кислота имеет тератогенное воздействие; при применении в период беременности в I триместре приводит к пороку развития – расщеплению верхнего неба,

в III триместре – к торможению родовой деятельности (ингибирование синтеза простагландинов), закрытию артериального протока у плода, что вызывает гиперплазию легочных сосудов и гипертензию в сосудах малого круга кровообращения, нарушение функции почек с возможным последующим развитием почечной недостаточности с олигогидроамниозом, продление времени кровотечения, антиагрегантный эффект, который может возникнуть даже после применения очень низких доз.

Кофеин повышает риск спонтанного выкидыша.

Грудное вскармливание

Не принимайте препарат Аскофен-Дарница в период кормления грудью.

Лекарственный препарат проникает в грудное молоко, что повышает риск возникновения кровотечений у детей вследствие нарушения функции тромбоцитов.

Управление транспортными средствами и работа с механизмами

Так как возможно возникновение побочных реакций со стороны нервной системы (головокружение, повышенная возбудимость, нарушение ориентации и внимания), при применении лекарственного препарата Вы должны избегать управления автомобилем и работы, требующей повышенного внимания и быстроты психомоторных реакций.

3. Прием препарата Аскофен-Дарница

Всегда принимайте препарат в полном соответствии с листком-вкладышем или с рекомендациями лечащего врача или работника аптеки. При появлении сомнений посоветуйтесь с лечащим врачом или работником аптеки.

Рекомендуемая доза:

Лекарственный препарат назначают взрослым по 1 таблетке 2–3 раза в сутки. Максимальная суточная доза лекарственного препарата составляет 6 таблеток (в 3 приема).

Не превышайте указанных доз лекарственного препарата.

Путь и (или) способ введения

Препарат назначают перорально.

Поскольку ацетилсалициловая кислота, как и все неселективные нестероидные противовоспалительные лекарственные препараты, вызывает раздражение слизистой оболочки пищеварительного тракта, Вы должны принимать лекарственный препарат только после еды, запивая водой, щелочными минеральными водами, раствором натрия гидрокарбоната (лучше всего – молоком).

Продолжительность терапии

Продолжительность курса лечения зависит от течения и тяжести заболевания и не должна превышать 5 дней при применении лекарственного препарата, как обезболивающего средства, и 3 дней – при применении, как жаропонижающего средства.

Препарат предназначен для кратковременного применения.

Если Вы приняли препарата Аскофен-Дарница больше, чем следовало

Ацетилсалициловая кислота

Симптомы

Передозировка салицилатов возможна из-за хронической интоксикации, которая возникла в результате длительной терапии (применение более 100 мг/кг в сутки более 2 дней может вызвать токсические эффекты), а также из-за острой интоксикации,

которая несет угрозу жизни (передозировка), и причинами появления которой могут быть случайное применение детьми или непредвиденная передозировка.

Хроническое отравление салицилатами может иметь скрытый характер, поскольку его признаки неспецифичны. Умеренная хроническая интоксикация, вызванная салицилатами, или салицилизм, встречается, как правило, только после повторных приемов больших доз. Основные симптомы: нарушение равновесия, головокружение, звон в ушах, глухота, усиленное потоотделение, тошнота и рвота, головная боль, спутанность сознания. Указанные симптомы можно контролировать снижением дозы. Звон в ушах может отмечаться при концентрации салицилатов в плазме крови свыше 150–300 мкг/мл. Более серьезные побочные реакции встречаются при концентрации салицилатов в плазме крови более 300 мкг/мл. Об острой интоксикации свидетельствует выраженное изменение кислотно-щелочного баланса, который может различаться в зависимости от возраста и тяжести интоксикации. Тяжесть состояния не может быть определена только на основании концентрации салицилатов в плазме крови.

Абсорбция ацетилсалициловой кислоты может замедляться в связи с задержкой желудочного высвобождения, формирования конкрементов в желудке.

Лечение

Интоксикация, вызванная передозировкой ацетилсалициловой кислотой, определяется степенью тяжести, клиническими симптомами и лечится стандартными методами, которые применяют при отравлении. Все принятые меры должны быть направлены на ускорение удаления лекарственного препарата и восстановления электролитного и кислотно-щелочного баланса. Применяют активированный уголь, форсированный щелочной диурез. В зависимости от состояния кислотно-щелочного равновесия и электролитного баланса проводят инфузионное введение растворов электролитов. При тяжелых отравлениях показан гемодиализ. При длительном применении высоких доз возможны апластическая анемия, тромбоцитопения, панцитопения, агранулоцитоз, нейтропения, лейкопения. При приеме высоких доз возможно возникновение нарушений со стороны центральной нервной системы (головокружение, психомоторное возбуждение, нарушение ориентации и внимания, бессонница, тремор, нервозность, беспокойство), со стороны мочевыделительной системы – нефротоксичность (почечная колика, интерстициальный нефрит, папиллярный некроз). В случае передозировки могут наблюдаться повышенное потоотделение, психомоторное возбуждение или угнетение ЦНС, сонливость, нарушение сознания, нарушение сердечного ритма, тахикардия, экстрасистолия, тремор, гиперрефлексия, судороги.

Парацетамол

Симптомы

Поражение печени возможно у взрослых, которые приняли 10 г и больше парацетамола, и у детей, которые приняли более 150 мг/кг массы тела. У пациентов с факторами риска (длительное лечение карбамазепином, фенobarбитоном, фенитоином, примидоном, рифампицином, зверобоем или другими лекарственными препаратами, которые индуцируют ферменты печени; регулярный прием избыточных количеств этанола; глютатионовая кахексия (расстройства пищеварения, муковисцидоз, ВИЧ-инфекция, голод, кахексия) прием 5 г или более парацетамола может привести к поражению печени.

Симптомы передозировки в первые 24 часа: бледность, тошнота, рвота, анорексия и боль в животе. Поражение печени может проявиться через 12–48 часов после передозировки. Могут возникать нарушения метаболизма глюкозы и метаболический ацидоз. При тяжелом отравлении печеночная недостаточность может прогрессировать

до энцефалопатии, кровоизлияния, гипогликемии, комы и иметь летальный исход. Острая почечная недостаточность с острым некрозом канальцев может проявляться сильной поясничной болью, гематурией, протеинурией и развиться даже при отсутствии тяжелого поражения почек. Отмечались также сердечная аритмия и панкреатит.

При длительном применении лекарственного препарата в больших дозах со стороны органов кроветворения может развиваться апластическая анемия, панцитопения, агранулоцитоз, нейтропения, лейкопения, тромбоцитопения. При приеме больших доз со стороны ЦНС могут возникать головокружение, психомоторное возбуждение и нарушение ориентации; со стороны мочевыделительной системы – нефротоксичность (почечная колика, интерстициальный нефрит, капиллярный некроз).

Лечение

При передозировке необходима скорая медицинская помощь. Пациента следует немедленно доставить в больницу, даже если отсутствуют ранние симптомы передозировки. Симптомы могут быть ограничены тошнотой и рвотой или могут не отражать тяжести передозировки или риска поражения органов. Следует рассмотреть целесообразность лечения активированным углем, если чрезмерная доза парацетамола была принята в пределах 1 часа. Концентрация парацетамола в плазме крови должна измеряться через 4 часа или позже после приема (более ранние концентрации являются недостоверными). Лечение N-ацетилцистеином может быть применено в течение 24 часов после приема парацетамола, но максимальный защитный эффект получают при его применении в течение 8 часов после приема. Эффективность антидота резко снижается после этого времени. При необходимости пациенту внутривенно вводят N-ацетилцистеин согласно действующим рекомендациям. При отсутствии рвоты может быть применен метионин перорально как соответствующая альтернатива в отдаленных районах вне больницы. Необходимо также применить общеподдерживающие меры.

Кофеин

Симптомы

Большие дозы кофеина могут вызвать боль в эпигастриальной области, рвоту, диурез, учащенное дыхание, экстрасистолию, тахикардию или сердечную аритмию, влияние на центральную нервную систему (головокружение, бессонница, нервозность, нервное возбуждение, синдром повышенной нервно-рефлекторной возбудимости, головная боль, раздражительность, состояние аффекта, тревожность, беспокойство, тремор, судороги). Клинически значимые симптомы передозировки кофеином связаны также с поражением печени парацетамолом.

Лечение

При передозировке необходима скорая медицинская помощь, даже если симптомы передозировки отсутствуют. Назначение метионина перорально или ацетилцистеина внутривенно может дать положительный эффект в течение 48 часов после передозировки. Необходимо также применить общие поддерживающие меры, симптоматическую терапию, включая применение антагонистов β -адренорецепторов, которые могут устранить кардиотоксические эффекты. Специфический антидот отсутствует.

Если Вы забыли принять препарат Аскофен-Дарница

Не принимайте двойную дозу, чтобы компенсировать пропущенную таблетку.

При наличии вопросов по применению препарата обратитесь к лечащему врачу или работнику аптеки.

4. Возможные нежелательные реакции

Подобно всем лекарственным препаратам препарат может вызывать нежелательные реакции, однако они возникают не у всех.

Прекратите прием препарата Аскофен-Дарница и немедленно обратитесь за медицинской помощью в случае возникновения одного из следующих признаков аллергической реакции, которая наблюдалась с неизвестной частотой (исходя из имеющихся данных, частоту возникновения определить невозможно):

- аллергические реакции: кожная сыпь, отек Квинке, бронхоспазм, многоформная экссудативная эритема (в том числе синдром Стивенса-Джонсона), токсический эпидермальный некролиз (синдром Лайелла), синдром Рея у детей (метаболический ацидоз, нарушения со стороны нервной системы и психики, рвота, нарушения функции печени).

Другие возможные нежелательные реакции, которые могут наблюдаться при приеме препарата Аскофен-Дарница

Часто – могут возникать не более чем у 1 человека из 10:

- нервозность;
- головокружение;
- тошнота;
- дискомфорт в животе.

Нечасто – могут возникать не более чем у 1 человека из 100:

- бессонница;
- неконтролируемое ритмичное сокращение мышц или дрожание (тремор);
- ощущение жжения, покалывания, «ползания мурашек» (парестезии);
- головная боль;
- шум в ушах;
- учащенное сердцебиение (тахикардия);
- нарушения ритма сердца (аритмия);
- сухость во рту;
- рвота;
- понос (диарея);
- эрозивно-язвенные поражения ЖКТ;
- гепатотоксичность;
- нефротоксичность;
- утомление;
- повышенная возбудимость.

Редко – могут возникать не более чем у 1 человека из 1 000:

- воспаление слизистой оболочки глотки (фарингит);
- снижение способности тромбоцитов склеиваться между собой (агрегации тромбоцитов);
- снижение способности свертывания крови (гипокоагуляция);
- повышенная склонность к кровотечениям (геморрагический синдром);
- анорексия (снижение аппетита);
- тревога;
- эйфорическое настроение;
- внутреннее напряжение;
- расстройство вкуса;
- расстройство внимания;
- потеря памяти (амнезия);

- нарушение координации движения;
- повышенная чувствительность зубов к различным раздражителям (гиперестезия);
- боль в области околоносовых пазух;
- нарушения зрения;
- носовые кровотечения;
- угнетение дыхания (гиповентиляция);
- выделение слизи из носа (ринорея);
- отрыжка;
- вздутие живота (метеоризм);
- нарушение глотания (дисфагия);
- расстройства чувствительности (парестезии) в области рта;
- повышенное слюноотделение;
- повышенное потоотделение (гипергидроз);
- зуд;
- крапивница;
- мышечно-скелетная скованность;
- боль в шее;
- боль в спине;
- мышечные спазмы;
- слабость (астения);
- тяжесть в груди.

Частота неизвестна – на основании имеющихся данных оценить невозможно:

- глухота;
- боли в области живота (гастралгия);
- желудочно-кишечные кровотечения;
- печеночная недостаточность;
- почечная недостаточность;
- поражение почек с поражением почечных сосочков (папиллярным некрозом).

Сообщение о нежелательных реакциях

Если у Вас возникают какие-либо нежелательные реакции, проконсультируйтесь с врачом или работником аптеки. Данная рекомендация распространяется на любые возможные нежелательные реакции, в том числе на не перечисленные в листке-вкладыше. Вы также можете сообщить о нежелательных реакциях напрямую через систему сообщений государств – членов Евразийского экономического союза (см. ниже). Сообщая о нежелательных реакциях, Вы помогаете получить больше сведений о безопасности препарата.

Республика Армения

ГНКО «Центр экспертизы лекарств и медицинских технологий»

Адрес: 0051, г. Ереван, пр. Комитаса, 49/5

Телефон: (+374 10) 20-05-05, (+374 96) 22-05-05

Эл. почта: vigilance@pharm.am

Интернет-сайт: <https://pharm.am>

5. Хранение препарата Аскофен-Дарница

Храните лекарственный препарат вне поля зрения детей и в недоступном для детей месте.

Не применяйте препарат после истечения срока годности (срока хранения), указанного на маркировке на пачке после слов «Годен до».

Датой истечения срока годности является последний день месяца.

Храните в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С.

Не выбрасывайте препарат в канализацию. Уточните у работника аптеки, как утилизировать (уничтожать) препараты, которые больше не потребуются. Эти меры позволят защитить окружающую среду.

6. Содержимое упаковки и прочие сведения

Препарат Аскофен-Дарница содержит

Действующими веществами являются ацетилсалициловая кислота, парацетамол, кофеин.

Каждая таблетка содержит 200 мг ацетилсалициловой кислоты, 200 мг парацетамола, 40 мг кофеина.

Вспомогательными веществами являются кислота лимонная моногидрат, крахмал картофельный, повидон, кальция стеарат.

Внешний вид препарата Аскофен-Дарница и содержимое упаковки

Таблетки.

Таблетки белого цвета, плоскоцилиндрической формы, с фаской и риской. На поверхности таблеток допускается мраморность.

По 6 или по 10 таблеток в контурной ячейковой упаковке, по 1 контурной ячейковой упаковке в пачке; по 6 или по 10 таблеток в контурных ячейковых упаковках.

Категория отпуска лекарственного препарата

Лекарственный препарат относится к категории отпуска без рецепта.

Держатель регистрационного удостоверения и производитель:

Украина

ЧАО «Фармацевтическая фирма «Дарница»

Украина, 02093, г. Киев, ул. Бориспольская, 13

Тел.: (+38044)5666878

Факс: (+38044)5666878

Электронная почта: vigilance@darnitsa.ua

За любой информацией о препарате следует обращаться к местному представителю держателя регистрационного удостоверения:

Республика Армения

ТОО «Registrarius Pharm Expert»

Республика Армения, город Ереван, Сообщество Ваагни, Раздан 13

Тел.: +374 96 30 30 00

Электронная почта: info@registrarius.org

Прочие источники информации

Подробные сведения о данном препарате содержатся в едином реестре зарегистрированных лекарственных средств.

Листок-вкладыш доступен в едином реестре зарегистрированных лекарственных средств и на официальном сайте уполномоченного органа (экспертной организации) Евразийского экономического союза <https://pharm.am>.