

ИНСТРУКЦИЯ
ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА
ЭССЛИВЕР ФОРТЕ®

Регистрационный номер:

Торговое наименование: Эссливер Форте®

Международное непатентованное или группировочное наименование: Поливитамины
+ Фосфолипиды

Лекарственная форма: капсулы

Состав на одну капсулу:

Действующие вещества: фосфолипиды (эссенциальные фосфолипиды) (содержащие фосфатидилхолин – 27 %, фосфатидилэтаноламин и др.) – 300 мг, тиамина мононитрат – 6 мг, рибофлавин – 6 мг, пиридоксина гидрохлорид – 6 мг, α-токоферола ацетат – 6 мг (в виде полуфабриката 50 % - 12 мг), никотинамид – 30 мг, цианокобаламин – 6 мкг;
вспомогательные вещества: метилпарагидроксибензоат натрия (Е 218), пропилпарагидроксибензоат натрия (Е 216), динатрия эдетат, бутилгидрокситолуол (Е 321), магния алюмосиликата моногидрат (алюминия-магния силиката гидрат), тальк.

Капсулы твёрдые желатиновые:

корпус капсулы: натрия лаурилсульфат (натрия додецилсульфат), титана диоксид, краситель солнечный закат жёлтый (Е 110), краситель бриллиантовый голубой, краситель пунцовый [Понсо-4R] (Е 124), метилпарагидроксибензоат натрия (Е 218), пропилпарагидроксибензоат натрия (Е 216), вода очищенная, желатин; *крышечка капсулы:* натрия лаурилсульфат (натрия додецилсульфат), титана диоксид, краситель азорубин (краситель кармазин) (Е 122), краситель бриллиантовый голубой, краситель хинолиновый жёлтый, метилпарагидроксибензоат натрия (Е 218), пропилпарагидроксибензоат натрия (Е 216), вода очищенная, желатин.

Описание

Твёрдые желатиновые капсулы № 0, корпус красного цвета, крышечка коричневого цвета. Содержимое капсулы - порошок или смесь порошка и гранул от розовато-жёлтого до коричнево-жёлтого цвета, с вкраплениями белого, жёлтого и коричневого цвета, допускается наличие частиц в виде уплотнённой порошкообразной массы от белого до коричневого цвета, с характерным запахом.

Фармакотерапевтическая группа

Гепатопротекторное средство

Код АТХ: А05С.

Фармакологические свойства

Фармакодинамика

Комбинированный препарат для лечения заболеваний печени. Оказывает гепатопротекторное, гиполипидемическое и гипогликемическое действие. Тормозит формирование соединительной ткани в печени. Регулирует проницаемость биомембран, активность мембраносвязанных ферментов, обеспечивая физиологическую норму процессов окислительного фосфорилирования в клеточном метаболизме. Восстанавливает мембраны гепатоцитов путём структурной регенерации и методом конкурентного ингибирования перекисных процессов. Ненасыщенные жирные кислоты, встраиваясь в биомембраны, принимают на себя токсикогенные воздействия вместо мембранных липидов печени, нормализуют функцию печени, повышают её дезинтоксикационную способность.

Различные виды эссенциальных фосфолипидов в составе Эссливер Форте® являются готовыми структурными элементами для клеток печени, восстанавливают мембраны и функциональную активность гепатоцитов. Комбинация витаминов способствует нормализации обменных процессов в организме.

Фармакокинетика

Не описана.

Показания к применению

Жировая дистрофия печени различной этиологии, нарушения липидного обмена печени; гепатит, цирроз печени; токсические поражения печени (алкогольные, наркотические, лекарственные); лучевая болезнь; псориаз (в составе комбинированной терапии).

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам препарата, детский возраст до 12 лет.

Применение при беременности и в период грудного вскармливания

Возможно применение препарата при беременности и в период грудного вскармливания с осторожностью.

Перед применением препарата необходимо проконсультироваться с врачом.

Способ применения и дозы

Внутрь во время еды, проглатывая целиком с достаточным количеством воды.

Взрослым - по 2 капсулы 2-3 раза в день.

Детям с 12 до 18 лет – по 1 капсуле 2-3 раза в день.

Продолжительность курса лечения составляет 3 месяца, при продлении курса лечения необходима консультация врача.

При псориазе в течение 2 недель по 2 капсулы 3 раза в день.

Побочное действие

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) побочные эффекты классифицированы в соответствии с их частотой развития следующим образом: очень часто ($\geq 1/10$), часто ($\geq 1/100$, $< 1/10$), нечасто ($\geq 1/1\ 000$, $< 1/100$), редко ($\geq 1/10\ 000$, $< 1/1\ 000$), очень редко ($< 1/10\ 000$), частота неизвестна (частота не может быть определена на основании имеющихся данных).

Со стороны желудочно-кишечного тракта

Частота неизвестна: желудочный дискомфорт, мягкий стул или диарея.

Со стороны кожи и подкожных тканей

Частота неизвестна: аллергические реакции (сыпь, экзантема, крапивница), зуд.

Передозировка

Симптомы: тошнота, мышечная слабость, боль в области печени, пожелтевшая кожа, раздражение слизистой оболочки желудочно-кишечного тракта, метеоризм, абдоминальная боль спастического характера, учащённое мочеиспускание.

Лечение: временное прекращение приёма препарата, промывание желудка, приём активированного угля, симптоматическая терапия.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами

Случаи взаимодействия или несовместимости с другими лекарственными препаратами не описаны.

Особые указания

Возможно интенсивное окрашивание мочи в жёлтый цвет, обусловленное наличием в составе препарата рибофлавина.

Краситель азорубин, краситель солнечный закат желтый, краситель пунцовый [Понсо-4R] могут вызывать аллергические реакции.

Метилпарагидроксибензоат натрия, пропилпарагидроксибензоат натрия могут вызывать аллергические реакции (в том числе отсроченные).

Влияние на способность управлять транспортными средствами, механизмами

Препарат не оказывает влияния на способность управлять транспортными средствами, механизмами.

Форма выпуска

Капсулы. По 10 или 15 капсул в контурную ячейковую упаковку из плёнки поливинилхлоридной и фольги алюминиевой печатной лакированной.

По 3, 5, 6 или 9 контурных ячейковых упаковок вместе с инструкцией по медицинскому применению лекарственного препарата в пачку из картона.

Условия хранения

При температуре не выше 25 °С.

Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности

3 года. Не применять препарат после истечения срока годности, указанного на упаковке.

Условия отпуска

Отпускают без рецепта.

Юридическое лицо, на имя которого выдано регистрационное удостоверение/организация, принимающая претензии потребителей

АО «Нижфарм», Россия

603105, г. Нижний Новгород, ул. Салганская, д. 7

Тел.: (831) 278-80-88; факс: (831) 430-72-28

Е-mail: med@stada.ru

Производитель/фасовщик

«Наброс Фарма Прайвит Лимитед»

Участок номер 110/А/2 Амит Фарм, Джайн Упашриа, N.H. номер 8

Каджипура – 387411, Кхеда, Индия

Упаковщик/выпускающий контроль качества

«Наброс Фарма Прайвит Лимитед»

Участок номер 110/А/2 Амит Фарм, Джайн Упашриа, N.H. номер 8

Каджипура – 387411, Кхеда, Индия

или

АО «Нижфарм», Россия

603105, г. Нижний Новгород, ул. Салганская, д. 7

По доверенности АО «Нижфарм»