Листок-вкладыш – информация для пациента

Мукалтин Татфарм, 50 мг, таблетки

Действующее вещество: алтея лекарственного травы экстракт

Перед приемом препарата полностью прочитайте листок-вкладыш, поскольку в нем содержатся важные для Вас сведения.

- Данный лекарственный препарат является препаратом, отпускаемым без рецепта.

- Всегда принимайте препарат в точности с листком-вкладышем или рекомендациями лечащего врача, или работника аптеки.

- Сохраните листок-вкладыш. Возможно, Вам потребуется прочитать его еще раз.

- Если Вам нужны дополнительные сведения или рекомендации, обратитесь к работнику аптеки.

- Если у Вас возникли какие-либо нежелательные реакции, обратитесь к лечащему врачу или работнику аптеки. Данная рекомендация распространяется на любые возможные нежелательные реакции, в том числе на не перечисленные в разделе 4 листка-вкладыша.

- Если состояние не улучшается или оно ухудшается, Вам следует обратиться к врачу.

Содержание листка-вкладыша

1. Что из себя представляет препарат Мукалтин Татфарм, и для чего его применяют.
2. О чем следует знать перед приемом препарата Мукалтин Татфарм.
3. Прием препарата Мукалтин Татфарм.
4. Возможные нежелательные реакции.
5. Хранение препарата Мукалтин Татфарм.
6. Содержимое упаковки и прочие сведения.

1. Что из себя представляет препарат Мукалтин Татфарм, и для чего его применяют

Препарат Мукалтин Татфарм содержит действующее вещество алтея лекарственного травы экстракт, относящееся к группе отхаркивающих средств.

Показания к применению

Препарат Мукалтин Татфарм применяется у взрослых и детей в возрасте от 12 до 18 лет при острых и хронических заболеваниях дыхательных путей, сопровождающихся кашлем с образованием трудноотделяемой мокроты повышенной вязкости (в том числе трахеобронхит, обструктивный бронхит, бронхоэктазы, пневмония) – в составе комплексной терапии.

Способ действия препарата Мукалтин Татфарм

Мукалтин Татфарм представляет собой смесь полисахаридов из травы алтея лекарственного, обладает отхаркивающими свойствами. Благодаря рефлекторной стимуляции усиливает активность мерцательного эпителия и перистальтику дыхательных бронхиол в сочетании с усилением секреции бронхиальных желез.

Если улучшение не наступило или Вы чувствуете ухудшение, необходимо обратиться к врачу.

2. О чем следует знать перед приемом препарата Мукалтин Татфарм

Противопоказания

Не принимайте препарат Мукалтин Татфарм:

- если у Вас аллергия на экстракт травы алтея лекарственного или любые другие компоненты препарата (перечисленных в разделе 6 листка-вкладыша);

- если у Вас язвенная болезнь желудка, двенадцатиперстной кишки;

- для лечения детей младше 12 лет.

Особые указания и меры предосторожности

Перед приемом препарата Мукалтин Татфарм проконсультируйтесь с лечащим врачом или работником аптеки.

Мукалтин Татфарм не следует применять одновременно с препаратами, содержащими кодеин и другие противокашлевые лекарственные средства, так как это затрудняет откашливание разжиженной мокроты.

Препарат следует применять только согласно тем показаниям, тому способу применения и в тех дозах, которые указаны в листке-вкладыше; если через 7 дней лечения улучшения не наступает или симптомы усугубляются, или появляются новые симптомы, необходимо проконсультироваться с врачом.

Другие препараты и препарат Мукалтин Татфарм

Сообщите лечащему врачу или работнику аптеки о том, что Вы принимали, недавно принимали или можете начать принимать какие-либо другие препараты.

Мукалтин Татфарм можно применять одновременно с другими препаратами, применяемыми при лечении бронхолегочных заболеваний.

Мукалтин Татфарм не следует применять одновременно с препаратами, содержащими кодеин и другие противокашлевые лекарственные средства, так как это затрудняет откашливание разжиженной мокроты.

Беременность, грудное вскармливание и фертильность

Беременность

Если Вы беременны, думаете, что забеременели, или планируете беременность, перед началом применения препарата Мукалтин Татфарм проконсультируйтесь с лечащим врачом или работником аптеки.

Применение препарата Мукалтин Татфарм при беременности возможно по рекомендации врача**.**

Грудное вскармливание

Если Вы кормите грудью, перед началом применения препарата Мукалтин Татфарм проконсультируйтесь с лечащим врачом или работником аптеки.

Применение препарата Мукалтин Татфарм при грудном вскармливании возможно по рекомендации врача**.**

Фертильность

Данные отсутствуют.

Управление транспортными средствами и работа с механизмами

Препарат Мукалтин Татфарм не оказывает влияние на способность управлять транспортными средствами и заниматься другими потенциально опасными видами деятельности, требующими повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций.

3. Прием препарата Мукалтин Татфарм

Всегда принимайте препарат в полном соответствии с листком-вкладышем или с рекомендациями лечащего врача. При появлении сомнений посоветуйтесь с лечащим врачом или работником аптеки.

Рекомендуемая доза

Взрослым по 1–2 таблетки 2–3 раза в день.

Применение у детей и подростков

Детям от 12 до 18 лет по 1–2 таблетки 2–3 раза в день.

Путь и (или) способ введения

Внутрь, перед едой. Детям можно растворить таблетку в 1/3 стакана воды.

Продолжительность терапии

Курс лечения в среднем 7–14 дней.

Если Вы приняли препарата Мукалтин Татфарм больше, чем следовало

До настоящего времени случаев передозировки не зарегистрировано.

Если Вы забыли принять препарат Мукалтин Татфарм

Не принимайте двойную дозу, чтобы компенсировать пропущенную таблетку.

4. Возможные нежелательные реакции

Подобно всем лекарственным препаратам препарат Мукалтин Татфарм может вызывать нежелательные реакции, однако они возникают не у всех.

Возможные нежелательные реакции, которые могут наблюдаться при применении препарата Мукалтин Татфарм:

Редко (могут возникать не более чем у 1 человека из 1000):

- тошнота.

Частота неизвестна (на основании имеющихся данных оценить невозможно):

- аллергические реакции.

Сообщение о нежелательных реакциях

Если у Вас возникают какие-либо нежелательные реакции, проконсультируйтесь с врачом или работником аптеки.
Данная рекомендация распространяется на любые возможные нежелательные реакции, в том числе на не перечисленные в листке-вкладыше. Вы также можете сообщить о нежелательных реакциях напрямую (см. ниже). Сообщая о нежелательных реакциях, Вы помогаете получить больше сведений о безопасности препарата.

Российская Федерация
Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор)
Адрес: 109012, г. Москва, Славянская площадь, д. 4, стр. 1
Телефон: +7 800 550 99 03

Электронная почта: pharm@roszdravnadzor.gov.ru
Сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:
https://www.roszdravnadzor.gov.ru

Кыргызская Республика
Департамент лекарственных средств и медицинских изделий при Министерстве Здравоохранения Кыргызской Республики
Адрес: 720044, г. Бишкек, ул. 3-я Линия, 25
Телефон: +996 312 21 92 78
Электронная почта: pharm@dlsmi.kg
Сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: https://www.dlsmi.kg

Республика Армения
«Центр экспертизы лекарств и медицинских технологий» ГНКО
Адрес: 0051, г. Ереван, проспект Комитаса, 49/5
Телефон: +374 60 83 00 73, +374 10 23 08 96, +374 10 23 16 82
Горячая линия: +374 10 20 05 05, +374 96 22 05 05
Электронная почта: vigilance@pharm.am
Сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: https://www.pharm.am

5. Хранение препарата Мукалтин Татфарм

Храните лекарственный препарат в недоступном для детей месте.

Не применяйте препарат после истечения срока годности, указанного на контурной безъячейковой упаковке, картонной пачке после «Годен до:».

Датой истечения срока годности является последний день данного месяца.

Храните в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 ºС.

Не выбрасывайте препарат в канализацию. Уточните у работника аптеки, как следует утилизировать (уничтожать) препарат, который больше не потребуется. Эти меры позволят защитить окружающую среду.

6. Содержимое упаковки и прочие сведения

Препарат Мукалтин Татфарм содержит

Действующим веществом является алтея лекарственного травы экстракт.

Каждая таблетка содержит 50 мг алтея лекарственного травы экстракта.

Вспомогательными веществами являются*:* натрия гидрокарбонат, винная кислота, кальция стеарат.

Внешний вид препарата Мукалтин Татфарм и содержимое упаковки

Таблетки.
Круглые плоскоцилиндрические таблетки от светло-серого до коричневато-серого цвета с фаской и риской, с характерным запахом. Допускается наличие более темных и светлых вкраплений.

По 10 таблеток в контурную безъячейковую упаковку из материала упаковочного комбинированного на бумажной основе.

Контурные безъячейковые упаковки по 10 таблеток с равным количеством листков-вкладышей помещают в пакет полиэтиленовый с силикагелем фасованным (2 пакета по 5 грамм или 1 пакет по 10 грамм), пакет завязывают резинкой купонной и помещают в ящик или коробку из картона гофрированного.

Категория отпуска лекарственного препарата

Лекарственный препарат относится к категории отпуска без рецепта.

Держатель регистрационного удостоверения и производитель

Российская Федерация
АО "Татхимфармпрепараты"
420091, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Беломорская, д. 260
тел.: 8 800 201 98 88 для звонков по РФ
+7 (843) 526 98 88
e-mail: marketing@tatpharm.ru

Различные торговые наименования

Мукалтин (Российская Федерация)

Мукалтин (Кыргызская Республика)

Мукалтин Татфарм (Республика Армения)

За любой информацией о препарате следует обращаться к местному представителю держателя регистрационного удостоверения

На территории Российской Федерации, Кыргызской Республики и Республики Армения:
Российская Федерация
АО "Татхимфармпрепараты"
420091, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Беломорская, д. 260
тел.: 8 800 201 98 88 для звонков по РФ
+7 (843) 526 98 88
e-mail: marketing@tatpharm.ru

Листок-вкладыш пересмотрен

Листок-вкладыш доступен в едином реестре зарегистрированных лекарственных средств и на официальном сайте уполномоченного органа (экспертной организации) Евразийского экономического союза https://grls.rosminzdrav.ru/GRLS.aspx.