

ИНСТРУКЦИЯ

по применению лекарственного препарата для медицинского применения
Лизобакт®

Регистрационный номер:

Торговое название препарата: Лизобакт®

МНН или группировочное название: лизоцим + пиридоксин

Лекарственная форма: прессованные леденцы

Состав: один леденец содержит:

Действующие вещества:

лизоцима гидрохлорид 20,00 мг,

пиридоксина гидрохлорида 10,00 мг.

Вспомогательные вещества: лактозы моногидрат - 155,40 мг, гипромеллоза - 10,00 мг, магния стеарат - 4,00 мг, натрия сахаринат - 0,50 мг, ванилин - 0,10 мг.

Описание: круглые леденцы белого или желтовато-белого цвета, с плоской и гладкой поверхностью, разделительной риской на одной стороне и фаской на обеих сторонах.

Фармакотерапевтическая группа: антисептическое средство.

Код АТХ: R02AA20.

Фармакологические свойства

Комбинированный препарат, действие которого обусловлено входящими в его состав компонентами.

Лизоцим является ферментом белковой природы, применяется как антисептик. Вызывает лизис клеточной стенки грамположительных грамотрицательных бактерий, а также грибов. Обладает противовирусной активностью. Принимает участие в регуляции местного неспецифического иммунитета. Относится к естественным защитным факторам организма.

Пиридоксин - оказывает защитное действие на слизистую оболочку полости рта (оказывает антиафтозный эффект). Не влияет на фармакодинамические свойства лизоцима.

Показания к применению

Лечение инфекционно-воспалительных заболеваний слизистой оболочки полости рта, десен и гортани: гингивит, стоматит, острые инфекции верхних дыхательных путей множественной и неуточненной локализации (острый ларингофарингит, другие острые инфекции верхних дыхательных путей

множественной локализации, острая инфекция верхних дыхательных путей неуточненная), афтозные изъязвления, герпетические поражения (в составе комплексной терапии), эрозии слизистой оболочки полости рта любой этиологии.

Противопоказания

Гиперчувствительность к компонентам препарата (включая гиперчувствительность к белку куриного яйца).

Детский возраст до 7 лет.

Наследственная непереносимость лактозы, дефицит лактазы или глюкозо-галактозная мальабсорбция.

Применение в период беременности и кормления грудью

Опыт клинического применения, связанный с влиянием препарата на плод, недостаточен. В качестве меры предосторожности препарат не рекомендуется использовать во время беременности.

Поскольку данных о выделении активных компонентов в грудное молоко недостаточно, препарат не следует применять в период грудного вскармливания.

Способ применения и дозы

Препарат применяется местно. Леденцы следует медленно рассасывать, не разжевывая, задерживая растаявшую массу леденца в полости рта как можно дольше, до полного растворения. Детям в возрасте 7-12 лет - по 1 леденцу 4 раза в сутки. Взрослым и детям в возрасте старше 12 лет - по 2 леденца 3-4 раза в сутки.

Курс лечения 8 дней, при необходимости его можно продлить.

Побочные эффекты

Препарат обычно хорошо переносится и побочные явления при его приеме встречаются редко. В отдельных случаях возможны аллергические реакции.

Нарушения со стороны кожи и подкожных тканей: крапивница, зуд, фотосенсибилизация.

Передозировка

Случаев острой передозировки препаратом Лизобакт® не отмечено.

Использование высоких доз пиридоксина, значительно превышающих терапевтические (> 200 мг/сут.) в течение длительного периода времени (несколько месяцев или лет) может вызвать симптомы сенсорной нейропатии, которая чувством онемения, ощущением покалывания, а также потерей чувствительности в области верхних и нижних конечностей. Эти симптомы обратимы и исчезают после прекращения лечения.

Лечение: отмена препарата, обильное питье (форсированный диурез).

Взаимодействие с другими препаратами

- Лизоцим усиливает действие антибиотиков, в том числе пенициллина, хлорамфеникола, нитрофурантоина.
- Эстроген, эстрогенсодержащие контрацептивы – увеличение потребности в пиридоксине.
- Леводопа – ослабление антипаркинсонической активности, пиридоксин ускоряет декарбоксилирование леводопы (не снижает эффекта комбинации леводопа + карбидопа).
- Диуретики – при комбинированном применении с пиридоксином усиливается действие диуретиков.
- Изониазид - пиридоксин предупреждает или уменьшает токсические проявления, в том числе поражения печени, наблюдающиеся при применении изониазида и других противотуберкулезных препаратов
- Пеницилламин, пипразинамид, иммуносупрессоры - при одновременном применении с пиридоксином снижается эффект последнего.

Особые указания

В случае появления аллергических реакций необходимо прекратить применение препарата и обратиться к врачу.

Лизобакт® содержит натрий: препарат содержит менее 1 ммоль натрия (23 мг) на одну таблетку, то есть практически «не содержит натрия».

Особенности влияния лекарственного средства на способность управлять транспортным средством или потенциально опасными механизмами.

Не влияет на способность к вождению автотранспорта и управлению механизмами.

Форма выпуска

По 10 леденцов в блистер из ПВХ/алюминиевой фольги.

По 1 или 3 блистеров вместе с инструкцией по медицинскому применению помещают в пачку из картона.

Срок годности

5 лет.

Не использовать по окончании срока годности, указанного на упаковке.

Условия хранения

При температуре ниже 30 °С.

Хранить в недоступном для детей месте!

Условия отпуска из аптек

Без рецепта.

Владелец Регистрационного Удостоверения:

ООО Босналек, Российская Федерация, 119435 Москва, Саввинская набережная, 11.

Производитель:

Босналек АО, 71000 Сараево, Юкичева 53, Босния и Герцеговина.

Претензии потребителей направлять в адрес представительства в РФ:

Саввинская наб., д.11, 119435 Москва, Россия, тел/факс: +7(495)771-76-32.