

Листок-вкладыш - информация для пациента
Йодинол, раствор для местного и наружного применения

Действующее вещество: йод

Перед применением препарата полностью прочитайте листок-вкладыш, поскольку в нем содержатся важные для Вас сведения.

Всегда применяйте препарат в точности с листком-вкладышем или рекомендациями лечащего врача или фармацевта.

Сохраните листок-вкладыш. Возможно, Вам потребуется прочитать его еще раз.

Если Вам нужны дополнительные сведения или рекомендации, обратитесь к работнику аптеки.

Если у Вас возникли какие-либо нежелательные реакции, обратитесь к лечащему врачу или фармацевту.

Данная рекомендация распространяется на любые возможные нежелательные реакции, в том числе на не перечисленные в разделе 4 листка-вкладыша.

Содержание листка-вкладыша

1. Что из себя представляет препарат Йодинол, и для чего его применяют
2. О чем следует знать перед применением препарата Йодинол
3. Применение препарата Йодинол
4. Возможные нежелательные реакции
5. Хранение препарата Йодинол
6. Содержимое упаковки и прочие сведения

1. ЧТО ИЗ СЕБЯ ПРЕДСТАВЛЯЕТ ПРЕПАРАТ ЙОДИНОЛ И ДЛЯ ЧЕГО ЕГО ПРИМЕНЯЮТ

Йодинол - йодсодержащее антисептическое средство. Основным действующим веществом является молекулярный йод, обладающий антисептическим свойством.

При нанесении на обширные поверхности кожи йод оказывает резорбтивное действие: активно влияет на обмен веществ, усиливает процессы диссимиляции, участвует в синтезе тироксина, обладает протеолитическим действием. Поливиниловый спирт - высокомолекулярное соединение, содержание которого в препарате замедляет выделение йода и удлиняет его взаимодействие с тканями организма; уменьшает также раздражающее действие йода на ткани.

Йод оказывает бактерицидное действие как на грамположительную, так и на грамотрицательную флору (активнее всего на стрептококковую флору и кишечную палочку, протей), а также на патогенные грибы и дрожжи. Вызывает гибель спор возбудителя сибирской язвы (при концентрации 1% по свободному йоду в течение 30 мин). Более устойчивой флорой является стафилококк, однако при длительном применении препарата в 80% случаев отмечается подавление стафилококковой флоры. Синегнойная палочка устойчива. Препарат малотоксичен.

Показания к применению

- Хронический тонзиллит;
- хронический гнойный отит;
- хронический атрофический ринит;
- хронический периодонтит;
- гнойные раны;
- трофические и варикозные язвы кожи;
- термические и химические ожоги I и II степени.

2. О ЧЕМ СЛЕДУЕТ ЗНАТЬ ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ ПРЕПАРАТА ЙОДИНОЛ

Противопоказания

Не применяйте препарат Йодинол:

- если у Вас аллергия на йод или любые другие компоненты препарата (перечисленные в разделе 6 листка-вкладыша);
- если у Вас тиреотоксикоз;
- если у Вас герпетический дерматит;
- если Вы беременны или кормите грудью;
- если Вам менее 18 лет.

Особые указания и меры предосторожности

Перед применением препарата Йодиол проконсультируйтесь с лечащим врачом или фармацевтом.

Не допускать попадания препарата в глаза. Если это произошло, следует промыть большим количеством воды или 1% раствором натрия тиосульфата.

Дети и подростки

Достоверных данных об эффективности и безопасности применения препарата у пациентов в возрасте до 18 лет установлено не было.

Другие препараты и препарат Йодиол

Сообщите лечащему врачу или работнику аптеки о том, что Вы применяете, недавно применяли или можете начать применять какие-либо другие препараты.

Препарат фармацевтически несовместим с эфирными маслами, перекисью водорода и другими дезинфицирующими средствами, растворами аммиака, белой осадочной ртутью (образуется взрывчатая смесь).

Щелочная или кислая среда, присутствие жира, гноя, крови ослабляют антисептическую активность. Ослабляет гипотиреотическое и струмогенное влияние препаратов лития.

Беременность и грудное вскармливание

Применять препарат при беременности и кормлении грудью не рекомендуется.

Управление транспортными средствами и работа с механизмами

Йодиол не оказывает влияния на способность управлять транспортными средствами и работать с механизмами.

3. ПРИМЕНЕНИЕ ПРЕПАРАТА ЙОДИОЛ

Всегда применяйте препарат в полном соответствии с листком-вкладышем или с рекомендациями лечащего врача или фармацевта. При появлении сомнений посоветуйтесь с лечащим врачом или фармацевтом.

Местно (промывание, полоскание, смазывание миндалин); наружно (наложение марлевых салфеток).

При хроническом тонзиллите промывают лакуны миндалин и супратонзиллярные пространства. Производят 4-5 промываний с промежутками 2-3 дня. Разовая доза - 50 мл. Не глотать!

При хронических гнойных отитах: ежедневное закапывание 5-8 капель препарата при мезотимпанитах и промывание аттика при эптитимпанитах. Курс лечения - 2-4 нед.

При лечении хронического атрофического ринита (озены) после предварительного размягчения и удаления корок производится орошение полости носа и глотки 2-3 раза в неделю в течение 2-3 мес.

При хроническом периодонтите проводят полоскание полости рта 3 раза в день по 15 мл после еды.

При трофических и варикозных язвах накладывают на поверхность язвы марлевые салфетки (в 3 слоя), смоченные препаратом (предварительно промывают кожу теплой водой с мылом, а кожу вокруг язвы смазывают цинковой мазью). Перевязку производят 1-2 раза в сутки, при

этом марлю, лежащую на поверхности язвы, не снимают, а вновь пропитывают раствором. Через 4-7 дней назначают общую или местную ванну, затем вновь продолжают указанное лечение.

При гнойных ранах и инфицированных ожогах накладывают рыхлую марлевую повязку, пропитанную препаратом.

При свежих термических и химических ожогах I-II степени также накладывают марлевую повязку, пропитанную препаратом, внутренний слой повязки орошают препаратом по мере надобности.

Если Вы применили препарата Йодиол больше, чем следовало

Симптомы при местном и наружном применении: явления "йодизма" - кожные высыпания, ринит, слезотечение, гиперсаливация, ринорея, бронхорея, отек слизистых оболочек.

Острая передозировка возникает при случайном или преднамеренном применении Йодиола внутрь. Сопровождается симптомами – гиперсаливация, отек слизистых оболочек носоглотки, отек гортани, отек легких (затруднения дыхания), повышенное потоотделение, тахикардия, желудочно-кишечные расстройства (тошнота, рвота, спазмы кишечника и диарея).

При возникновении симптомов передозировки следует немедленно прекратить применение препарата и обратиться к врачу.

Лечение: отмена препарата, симптоматическая терапия. При острой передозировке следует провести промывание желудка сначала 1% раствором натрия тиосульфата, затем большим количеством воды; симптоматическая терапия.

Если Вы забыли применить препарат Йодиол

Примените препарат, как только вспомните об этом. Если подошло время следующего применения, пропустите пропущенную дозу и продолжайте применение по обычному графику.

4. ВОЗМОЖНЫЕ НЕЖЕЛАТЕЛЬНЫЕ РЕАКЦИИ

Подобно всем лекарственным препаратам препарат может вызывать нежелательные реакции, однако они возникают не у всех.

Аллергические реакции (кожный зуд). При длительном применении - явления "йодизма" в виде кожных высыпаний, ринита, слезотечения, гиперсаливации, ринореи, бронхореи, отек слизистых оболочек.

Сообщение о нежелательных реакциях

Если у Вас возникают какие-либо нежелательные реакции, проконсультируйтесь с врачом или фармацевтом. Данная рекомендация распространяется на любые возможные нежелательные реакции, в том числе на не перечисленные в листке-вкладыше.

Вы также можете сообщить о нежелательных реакциях непосредственно в Центр экспертизы лекарств и медицинских технологий МЗ РА по ссылке www.pharm.am или позвонить по номеру горячей линии: +37410200505 и +37496220505.

Сообщая о нежелательных реакциях, Вы помогаете получать больше сведений о безопасности препарата.

5. ХРАНЕНИЕ ПРЕПАРАТА ЙОДИОЛ

Храните лекарственный препарат в недоступном для детей месте.

Хранить при температуре не выше 25°C, в защищенном от света месте.

Не применяйте препарат после истечения срока годности, указанного на упаковке.

Срок годности - 3 года.

Не выбрасывайте препараты в канализацию. Уточните у работника аптеки, как утилизировать препараты, которые больше не потребуются. Эти меры позволят защитить окружающую среду.

6. СОДЕРЖИМОЕ УПАКОВКИ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ

Препарат Йодинол содержит

Действующим веществом является йод - 0.1 г на 100 мл раствора.

Прочими ингредиентами (вспомогательными веществами) являются: калия йодид - 0.3 г, поливиниловый спирт - 0.9 г, вода очищенная до 100 мл.

Внешний вид Йодинола и содержимое упаковки

Раствор для местного и наружного применения. Прозрачная жидкость темно-синего цвета, характерного запаха.

По 100 мл раствора во флаконах из стекла или пластмассы, помещенных в пачку из картона вместе с инструкцией по применению.

Категория отпуска лекарственного препарата

Лекарственный препарат относится к категории отпуска без рецепта.

Держатель регистрационного удостоверения и производитель

ООО “ЭСКО-ФАРМ”

Республика Армения, Ереван 0079, 5-ый Нор Норкский массив, ул. Микояна 13

Тел.: (+37410) 673903; e-mail: farm-esco@mail.ru

Листок-вкладыш пересмотрен

10/2025