

ФОРМИДРОН

Раствор для наружного применения

[формальдегид]

Перед применением препарата полностью прочитайте листок-вкладыш, поскольку в нем содержатся важные для Вас сведения.

- *Всегда применяйте препарат в точности с данным листком или рекомендациями лечащего врача или работника аптеки.*
- *Сохраните этот листок-вкладыш. Возможно, Вам потребуется прочитать его еще раз.*
- *Если Вам нужны дополнительные сведения или рекомендации, обратитесь к работнику аптеки.*
- *Если у Вас возникли какие-либо нежелательные реакции, обратитесь к лечащему врачу или работнику аптеки. Данная рекомендация распространяется на любые возможные нежелательные реакции, в том числе на не перечисленные в разделе 4 листка-вкладыша.*
- *Если состояние не улучшается или оно ухудшается, Вам следует обратиться к врачу.*

СОДЕРЖАНИЕ ЛИСТКА-ВКЛАДЫША

1. Что из себя представляет препарат ФОРМИДРОН, и для чего его применяют.
2. О чем следует знать перед применением препарата ФОРМИДРОН.
3. Применение препарата ФОРМИДРОН.
4. Возможные нежелательные реакции.
5. Хранение препарата ФОРМИДРОН.
6. Содержимое упаковки и прочие сведения.

1. ЧТО ИЗ СЕБЯ ПРЕДСТАВЛЯЕТ ПРЕПАРАТ ФОРМИДРОН И ДЛЯ ЧЕГО ЕГО ПРИМЕНЯЮТ

ФОРМИДРОН - это комбинированный препарат, оказывает антисептическое и дезодорирующее действие.

Содержащийся в препарате формальдегид обладает бактерицидным, вирулицидным, фунгицидным и спороцидным действием, позволяющим отнести его к дезинфектантам высокого уровня. Раствор формальдегида назначается для обработки бородавок. Растворы формальдегида в глицероле или этиловом спирте используются для обработки ступней при их потении. После удаления Эхинококковых цист разбавленные растворы формальдегида используются для обработки полостей. Формальдегид, хотя и оказывает раздражающее действие на слизистые оболочки, однако используется также в составе зубных паст и в

зубоврачебной практике. Нанесение на неповрежденную кожу раствора формальдегида приводит к утолщению эпидермиса, его затвердеванию и обесцвечиванию, а также к местному обезболивающему эффекту. Испарение содержащегося в препарате спирта приводит к местному охлаждению. В медицинской практике спирт этиловый применяют преимущественно как наружное антисептическое и раздражающее средство для обтираний, компрессов и т. п.

Препарат ФОРМИДРОН применяют:

- для протирания кожи при повышенной потливости у взрослых и детей старше 12 лет.

2. О ЧЕМ СЛЕДУЕТ ЗНАТЬ ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ ПРЕПАРАТА ФОРМИДРОН

Не применяйте препарат ФОРМИДРОН:

- при повышенной индивидуальной чувствительности к компонентам препарата,
- при воспалительных заболеваниях кожи

Особые указания и меры предосторожности

Раствор не следует наносить на лицо и слизистые оболочки.

Дети

Безопасность применения у детей младше 12 лет не изучена.

Другие препараты и препарат ФОРМИДРОН

Клинически значимое взаимодействие препарата с другими лекарствами не описано.

Беременность, грудное вскармливание и фертильность

Безопасность применения во время беременности и в период лактации не изучена.

Управление транспортными средствами и работа с механизмами

Не применимо.

3. ПРИМЕНЕНИЕ ПРЕПАРАТА ФОРМИДРОН

Наружно, протирают участки повышенной потливости 1-2 раза в сутки ватным тампоном.

4. ВОЗМОЖНЫЕ НЕЖЕЛАТЕЛЬНЫЕ РЕАКЦИИ

Подобно всем лекарственным препаратам ФОРМИДРОН может вызывать нежелательные реакции, однако они возникают не у всех.

Возможны аллергические реакции и местно-раздражающее действие.

Если у вас возникают какие-либо нежелательные реакции, проконсультируйтесь с врачом или фармацевтом. Данная рекомендация распространяется на любые

возможные нежелательные реакции, в том числе на не перечисленные в листке-вкладыше.

Вы также можете сообщить о нежелательных реакциях непосредственно в Центр экспертизы лекарств и медицинских технологий МЗ РА по ссылке www.pharm.am или позвонить по номеру горячей линии: +374 10 20 05 05 и +374 96 22 05 05.

Сообщая о нежелательных реакциях, Вы помогаете получать больше сведений о безопасности препарата.

Если Вы применили препарата больше, чем следовало

При соблюдении рекомендуемого способа применения случаи передозировки неизвестны.

5. ХРАНЕНИЕ ПРЕПАРАТА ФОРМИДРОН

Хранить при температуре не выше 25°C, в защищенном от света и недоступном для детей месте. 3 года. Не использовать по истечении срока годности, указанного на упаковке.

Не выливайте препарат в канализацию. Уточните у работника аптеки, как избавиться от препаратов, которые больше не потребуются. Эти меры позволят защитить окружающую среду.

6. СОДЕРЖИМОЕ УПАКОВКИ И ПРОЧИЕ СВЕДЕНИЯ

Препарат ФОРМИДРОН содержит:

Действующее вещество: формальдегид (37 %) - 10 мл,

Вспомогательные вещества – спирт этиловый (95 %), вода очищенная, ароматизатор.

Внешний вид ФОРМИДРОН и содержимое упаковки

Бесцветная, прозрачная жидкость с характерным резким запахом формальдегида, спирта.

Во флаконах по 30мл из стекла.

Название и адрес производителя

ООО “ЭСКО-ФАРМ”

Ереван 0079, община Нор Норк, 5-ый массив, ул. Микояна 13, Республика Армения

Тел.: (+37410) 673903, E-mail: farm-esco@mail.ru

Владелец Регистрационного Удостоверения

ООО “ЭСКО-ФАРМ”

Ереван 0079, община Нор Норк, 5-ый массив, ул. Микояна 13, Республика Армения

Тел.: (+37410) 673903, E-mail: farm-esco@mail.ru

Листок-вкладыш пересмотрен

Август, 2026