

1. Наименование лекарственного препарата ФОРМИДРОН

1.1. Дозировка

37мг/мл

1.2. Лекарственная форма

Раствор для наружного применения

2. Качественный и количественный состав

Активное вещество: 10 мл формальдегид (37 %); вспомогательные вещества: 39.5 мл спирт этиловый (95 %), 50 мл вода очищенная, 0.5 мл ароматизатор.

3. Описание лекарственной формы

Бесцветная, прозрачная жидкость с характерным резким запахом формальдегида, спирта.

4. Клинические данные

4.1. Показания к применению

Применяют для протирания кожи при повышенной потливости у взрослых и детей старше 12 лет.

4.2. Режим дозирования и способ применения

Наружно, протирают участки повышенной потливости 1-2 раза в сутки ватным тампоном.

4.3. Противопоказания

Гиперчувствительность, воспалительные заболевания кожи.

4.4. Особые указания и меры предосторожности при применении

Раствор не следует наносить на лицо и слизистые оболочки.

4.5. Взаимодействие с другими лекарственными препаратами и другие виды взаимодействия

Клинически значимое взаимодействие препарата с другими лекарствами не описано.

4.6. Фертильность, беременность и лактация

Безопасность применения во время беременности и в период лактации не изучена.

4.7. Влияние на способность управлять транспортными средствами и работать с механизмами

Не применимо.

4.8. Нежелательные реакции

Аллергические реакции, местно-раздражающее действие.

4.9. Передозировка

При соблюдении рекомендуемого способа применения случаи передозировки неизвестны.

5. Фармакологические свойства

Фармакотерапевтическая группа: Комбинированный препарат, оказывает антисептическое и дезодорирующее действие.

Код АТХ - D08AX

5.1. Фармакодинамические свойства

Содержащийся в препарате формальдегид обладает бактерицидным, вирулицидным, фунгицидным и спороцидным действием, позволяющим отнести его дезинфектантам высокого уровня. Раствор формальдегида назначается для обработки бородавок. Растворы формальдегида в глицероле или этиловом спирте используются для обработки ступней при их потении. После удаления Эхинококковых цист разбавленные растворы формальдегида используются для обработки полостей. Формальдегид, хотя и оказывает раздражающее действие на слизистые оболочки, однако используется также в составе зубных паст и в зубоврачебной практике. Нанесение на неповрежденную кожу раствора формальдегида приводит к утолщению эпидермиса, его затвердеванию и обесцвечиванию, а также к местному обезболиванию эффекту. Испарение содержащегося в препарате спирта приводит к местному охлаждению. В медицинской практике спирт этиловый применяют преимущественно как наружное антисептическое и раздражающее средство для обтираний, компрессов и т. п..

6. Фармацевтические свойства

6.1. Перечень вспомогательных веществ

спирт этиловый (95 %), вода очищенная, ароматизатор.

6.2. Несовместимость

Нет данных

6.3. Срок годности

3 года.

6.4. Особые меры предосторожности при хранении

Хранить при температуре не выше 25°C, в защищенном от света и недоступном для детей месте.

6.5. Характер и содержание первичной упаковки

Во флаконах по 30мл из стекла.

6.6. Особые меры предосторожности при уничтожении использованного лекарственного препарата или отходов, полученных после применения лекарственного препарата или работы с ним

Нет особых требований к утилизации.

7. Держатель Регистрационного Удостоверения

ООО “Эско-Фарм”

Республика Армения, Ереван 0079, ул. Микояна 13

Тел.: (+37410) 673903

E-mail: farm-esco@mail.ru

8. Номер регистрационного удостоверения

21889

9. Дата подтверждения регистрации

24.01.2024

10. Дата пересмотра текста

Декабрь, 2025г.