

Листок-вкладыш - информация для пациента

АЛЬБУЦИД ЛИКВО

капли глазные 200 мг/мл (20 %)

сульфацетамид

Перед применением препарата полностью прочитайте листок-вкладыш, поскольку в нем содержатся важные для Вас сведения!

- Сохраните листок-вкладыш. Возможно, Вам потребуется прочитать его еще раз.
- Если у Вас возникли дополнительные вопросы, обратитесь к лечащему врачу или работнику аптеки.
- Препарат назначен именно Вам. Не передавайте его другим людям. Он может навредить им, даже если симптомы их заболевания совпадают с Вашими.
- Если у Вас возникли какие-либо нежелательные реакции, обратитесь к лечащему врачу или работнику аптеки. Данная рекомендация распространяется на любые возможные нежелательные реакции, в том числе не перечисленные в разделе 4 листка-вкладыша.

Содержание листка-вкладыша

1. Что из себя представляет препарат АЛЬБУЦИД ЛИКВО, и для чего его применяют
2. О чем следует знать перед применением препарата АЛЬБУЦИД ЛИКВО
3. Применение препарата АЛЬБУЦИД ЛИКВО
4. Возможные нежелательные реакции
5. Хранение препарата АЛЬБУЦИД ЛИКВО
6. Содержимое упаковки и прочие сведения

1. Что из себя представляет препарат АЛЬБУЦИД ЛИКВО, и для чего его применяют

Препарат АЛЬБУЦИД ЛИКВО содержит действующее вещество сульфацетамид натрия, который относится к группе противомикробных препаратов, называемых сульфаниламидами. Сульфацетамид натрия активен в отношении грамположительных и грамотрицательных кокков, *Escherichia coli*, *Shigella spp.*, *Vibrio cholerae*, *Clostridium perfringens*, *Bacillus anthracis*, *Corynebacterium diphtheriae*, *Yersinia pestis*, *Chlamydia spp.*, *Actinomyces israelii*, *Toxoplasma gondii*.

Показания к применению

Препарат АЛЬБУЦИД ЛИКВО применяется у взрослых и детей для лечения:

- гнойных язв роговицы;
- инфекционных конъюнктивитов;
- блефаритов.

Если после применения препарата улучшение не наступило или Вы чувствуете ухудшение, необходимо обратиться к врачу.

2. О чем следует знать перед применением препарата АЛЬБУЦИД ЛИКВО

Противопоказания

Не применяйте препарат АЛЬБУЦИД ЛИКВО:

- если у Вас аллергия на сульфацетамид натрия или любые другие компоненты препарата, перечисленные в разделе 6 листка-вкладыша;
- у детей в возрасте до 2 месяцев.

Особые указания и меры предосторожности

Перед применением препарата АЛЬБУЦИД ЛИКВО проконсультируйтесь с лечащим врачом.

- Пациенты с повышенной чувствительностью к фуросемиду, тиазидовым диуретикам (гидрохлортиазиду), производным сульфонилмочевины (глибенкламиду), ингибиторам карбоангидразы (диакарбу) также могут иметь повышенную чувствительность к сульфацетамиду натрия. Если у Вас имеется повышенная чувствительность к указанным препаратам, перед применением препарата сообщите об этом лечащему врачу.

Зафиксированы редкие серьезные реакции на сульфаниламиды со смертельным исходом, которые включали синдром Стивенса-Джонсона, токсический эпидермальный некролиз, молниеносный некроз печени, агранулоцитоз, апластическую анемию и другие патологические изменения крови.

Сенсибилизация может проявляться, когда сульфаниламиды назначены повторно, независимо от пути введения. Реакции гиперчувствительности были зарегистрированы у лиц, не имеющих в анамнезе гиперчувствительности к сульфаниламидам. При первых признаках гиперчувствительности, кожной сыпи или других серьезных реакций, необходимо прекратить использование этого препарата.

- Длительное применение препарата может привести к чрезмерному росту патогенных микроорганизмов, в том числе грибов, а также к развитию нечувствительности бактерий к

сульфаниламидам. Если улучшение не наступило или Вы чувствуете ухудшение состояния, сообщите об этом лечащему врачу.

- Эффективность сульфаниамидов снижается при наличии большого количества гнойного отделяемого (из-за увеличения содержания парааминобензойной кислоты). При наличии большого количества гнойного отделяемого перед применением препарата сообщите об этом лечащему врачу.
- При появлении симптомов аллергии, а также при усилении боли и других признаков инфекционного процесса, увеличении гнойного отделяемого, прекратите применение препарата и немедленно обратитесь к врачу.

Во избежание загрязнения содержимого флакона не прикасайтесь кончиком флакон-капельницы к глазам или любой другой поверхности (веки, область вокруг глаз и др.).

Дети

Препарат АЛЬБУЦИД ЛИКВО не следует применять у детей в возрасте до 2 месяцев.

Другие препараты и препарат АЛЬБУЦИД ЛИКВО

Сообщите лечащему врачу или работнику аптеки о том, что Вы принимаете, недавно принимали или можете начать принимать какие-либо другие лекарственные препараты.

В частности, сообщите лечащему врачу, если Вы принимаете какие-либо из следующих препаратов:

- антикоагулянты непрямого действия (применяются для разжижения крови);
- бензокаин, прокаин и тетракаин (применяются для местной анестезии);
- соли серебра (применяются как местные антисептические средства);
- хлорамфеникол (антибиотик);
- дифенин (применяется для лечения эпилепсии, а также нарушений сердечного ритма);
- парааминосалициловая кислота (применяется для лечения туберкулеза);
- салицилаты (применяются для уменьшения боли и воспаления, снижения температуры тела, а также разжижения крови).

Беременность и грудное вскармливание

Если Вы беременны или кормите грудью, думаете, что забеременели, или планируете беременность, перед началом применения препарата проконсультируйтесь с лечащим врачом или работником аптеки.

Данные по применению сульфацида натрия в период беременности и грудного вскармливания ограничены.

Известно, что сульфацид проникает через плаценту и выделяется с грудным молоком.

Возможно развитие ядерной желтухи (поражение головного мозга вследствие высокой концентрации билирубина в крови) у новорожденных, чьи матери принимали таблетированные формы сульфаниламидов во время беременности, поэтому невозможно исключить риск развития желтухи при применении глазных капель сульфаниламидов.

Системное введение сульфаниламидов может приводить к ядерной желтухе у новорожденных, матери которых принимают сульфаниламиды в период кормления грудью.

Применение препарата во время беременности и грудного вскармливания возможно только по назначению врача, если ожидаемая польза превышает риск развития возможных нежелательных реакций.

Управление транспортными средствами и работа с механизмами

В случае развития затуманивания зрения после инстилляций препарата необходимо воздержаться от управления транспортными средствами и занятий потенциально опасными видами деятельности, требующими повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций до восстановления четкости зрения.

Препарат АЛЬБУЦИД ЛИКВО содержит бензалкония хлорид

Препарат содержит консервант бензалкония хлорид (0,05 мг/мл), который может раздражать глаза. Если после применения препарата у Вас возникнет дискомфорт или жжение в глазах, проконсультируйтесь с лечащим врачом. Бензалкония хлорид может изменять цвет мягких контактных линз. Следует избегать контакта с мягкими контактными линзами. В период лечения инфекционных заболеваний глаз не рекомендуется ношение контактных линз.

3. Применение препарата АЛЬБУЦИД ЛИКВО

Всегда применяйте данный лекарственный препарат в полном соответствии с рекомендациями лечащего врача. При появлении сомнений посоветуйтесь с лечащим врачом или работником аптеки.

Рекомендуемая доза

Взрослые

По 2 - 3 капли в конъюнктивальный мешок пораженного глаза 5 - 6 раз в сутки (через каждые 4 - 5 часов).

Дети старше 2 месяцев

По 1 - 2 капли в конъюнктивальный мешок пораженного глаза 4 - 5 раз в сутки.

Курс лечения определяет врач в зависимости от характера и тяжести заболевания. В среднем длительность курса составляет 7 - 10 дней.

Путь и (или) способ введения

Препарат применяется местно, в виде инстилляций в глаз.

При применении препарата АЛЬБУЦИД ЛИКВО соблюдайте следующие рекомендации:

- Вымойте руки перед началом применения препарата.
- Снимите колпачок с флакона.
- Осторожно наклоните голову назад. Аккуратно потяните нижнее веко вниз.
- Поднесите кончик флакона близко к глазу. Возможно, Вам будет легче сделать это перед зеркалом.
- Не прикасайтесь капельницей к глазам, векам, окружающим областям или другим поверхностям. Это может инфицировать капли.
- Слегка надавите на стенки флакона для закапывания препарата в нижнее веко.
- Закройте глаза. Для уменьшения оттока препарата в полость носа и горло осторожно надавите пальцем на внутренний угол глаза в течение не менее 1 минуты.
- Если Вы применяете капли для обоих глаз, повторите ту же процедуру для другого глаза.
- Плотнo закройте флакон колпачком сразу после применения.

Если Вы применили препарата АЛЬБУЦИД ЛИКВО больше, чем следовало

При частом применении препарата возможны покраснение, зуд, отек век, значительное раздражение слизистой оболочки глаза. В данном случае лечение продолжают раствором сульфатамида натрия меньшей концентрации, в случае необходимости отменяют препарат и назначают симптоматическое лечение.

Если Вы забыли применить препарат АЛЬБУЦИД ЛИКВО

Примените следующую дозу в обычное время согласно графику. Не применяйте двойную дозу, чтобы компенсировать пропущенную.

Если Вы прекратили применение препарата АЛЬБУЦИД ЛИКВО

Не прекращайте применение препарата, не проконсультировавшись с лечащим врачом.

При наличии вопросов по применению препарата обратитесь к лечащему врачу или работнику аптеки.

4. Возможные нежелательные реакции

Подобно всем лекарственным препаратам, АЛЬБУЦИД ЛИКВО может вызывать нежелательные реакции, однако они возникают не у всех.

Немедленно обратитесь к врачу при возникновении следующих серьезных нежелательных реакций, которые могут возникать *редко (могут возникать не более чем у 1 человека из 1000)* или *очень редко (могут возникать не более чем у 1 человека из 10000)*:

- отек, покраснение, зуд (признаки аллергической реакции);
- тяжелые аллергические реакции на сульфаниламиды, такие как:
 - повышение температуры тела, слабость, сыпь на коже и слизистых оболочках в виде пятен, пузырей, мокнущих эрозий, корок или с участками отслойки кожи (признаки синдрома Стивенса-Джонсона, токсического эпидермолиза);
 - тошнота, рвота, боль в животе, снижение аппетита, слабость, желтизна кожи и склер (признаки поражения печени – молниеносный некроз печени);
 - повышение температуры тела, боль в горле и другие признаки инфекционных заболеваний (может быть признаком выраженного снижения количества форменных элементов крови – агранулоцитоз, апластическая анемия).

Другие нежелательные реакции, которые могут наблюдаться при применении препарата АЛЬБУЦИД ЛИКВО:

Очень часто (могут возникать более чем у 1 человека из 10): местное раздражение, покалывание и жжение;

Редко (могут возникать не более чем у 1 человека из 1000): неспецифический конъюнктивит, гиперемия конъюнктивы, присоединение вторичной инфекции;

Частота неизвестна (на основании имеющихся данных оценить невозможно): бактериальные и грибковые язвы роговицы.

Сообщение о нежелательных реакциях

Если у Вас возникают какие-либо нежелательные реакции, проконсультируйтесь с лечащим врачом или работником аптеки. Данная рекомендация распространяется на любые возможные нежелательные реакции, в том числе на не перечисленные в листке-вкладыше. Вы также

можете сообщить о нежелательных реакциях напрямую через систему сообщений государств – членов Евразийского экономического союза. Сообщая о нежелательных реакциях, Вы помогаете получить больше сведений о безопасности препарата.

Республика Армения

ГНКО «Центр экспертизы лекарств и медицинских технологий»

Адрес: 0051, г. Ереван, пр. Комитаса, 49/5,

Телефон: (+374 10) 20-05-05, (+374 96) 22-05-05

Электронная почта: vigilance@pharm.am

Сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: <http://pharm.am>

5. Хранение препарата АЛЬБУЦИД ЛИКВО

Храните препарат при температуре не выше 25 °С в защищенном от света и недоступном для детей месте.

Не применяйте препарат после истечения срока годности (срока хранения), указанного на флаконе и на коробке после «годен до». Датой истечения срока годности является последний день месяца, указанного на упаковке.

После первого вскрытия содержимое флакона можно использовать в течение месяца. Выбросите флакон через месяц после первого вскрытия.

Не выбрасывайте (не выливайте) препараты в канализацию. Уточните у работника аптеки, как утилизировать (уничтожать) препараты, которые больше не потребуются. Эти меры позволят защитить окружающую среду.

6. Содержимое упаковки и дополнительные сведения

Каждый мл препарата содержит 200 мг действующего вещества сульфата натрия.

Вспомогательные вещества: бензалкония хлорид - 0,05 мг/мл, спирт поливиниловый, натрия тиосульфат, натрия фосфат однозамещенный, натрия фосфат двузамещенный, динатрия эдетат, вода для инъекций.

Внешний вид препарата АЛЬБУЦИД ЛИКВО и содержимое упаковки

Препарат АЛЬБУЦИД ЛИКВО 200 мг/мл (20 %), капли глазные представляет собой бесцветную или с желтоватым оттенком прозрачную жидкость.

По 5 мл препарата во флаконе из ПЭНП, снабженном капельницей из ПЭНП с герметично укупоренной крышкой из ПЭВП.

Каждый флакон вместе с инструкцией по медицинскому применению (листок-вкладыш) вкладывают в картонную пачку.

Категория отпуска лекарственного препарата

Лекарственный препарат относится к категории отпуска «по рецепту».

Держатель регистрационного удостоверения и производитель



ЗАО «Ликвор», Армения,
0089 Ереван, Кочиняна 7/9
Тел.: +37460 37 88 00
E-mail: info@liqvor.com