

Листок-вкладыш - информация для пациента

Меновазин, раствор для наружного применения

Действующие вещества: ментол рацемический, прокаин гидрохлорид, бензокаин

Перед применением препарата полностью прочитайте листок-вкладыш, поскольку в нем содержатся важные для Вас сведения.

Всегда применяйте препарат в точности с листком-вкладышем или рекомендациями лечащего врача или фармацевта.

Сохраните листок-вкладыш. Возможно, Вам потребуется прочитать его еще раз.

Если Вам нужны дополнительные сведения или рекомендации, обратитесь к работнику аптеки.

Если у Вас возникли какие-либо нежелательные реакции, обратитесь к лечащему врачу или фармацевту.

Данная рекомендация распространяется на любые возможные нежелательные реакции, в том числе на не перечисленные в разделе 4 листка-вкладыша.

Содержание листка-вкладыша

1. Что из себя представляет препарат Меновазин, и для чего его применяют
2. О чем следует знать перед применением препарата Меновазин
3. Применение препарата Меновазин
4. Возможные нежелательные реакции
5. Хранение препарата Меновазин
6. Содержимое упаковки и прочие сведения

1. ЧТО ИЗ СЕБЯ ПРЕДСТАВЛЯЕТ ПРЕПАРАТ МЕНОВАЗИН И ДЛЯ ЧЕГО ЕГО ПРИМЕНЯЮТ

Меновазин - комбинированный препарат для наружного применения, который благодаря входящим в состав ментолу, прокаину и бензокаину оказывает местное обезболивающее действие.

Ментол рацемический при нанесении на кожу и слизистые оболочки вызывает раздражение нервных окончаний, расширение поверхностных сосудов кожи, сопровождающееся анальгезирующим (обезболивающим) эффектом с ощущением прохлады, легкого жжения, покалывания.

Ментол усиливает местноанестезирующее действие прокаина и бензокаина при их одновременном применении в составе комбинированного препарата.

Прокаин гидрохлорид - местноанестезирующее средство с умеренной анестезирующей активностью. Являясь слабым основанием, блокирует натриевые каналы, препятствует генерации импульсов в окончаниях чувствительных нервов и проведению импульсов по нервным волокнам. Изменяет потенциал действия в мембранах нервных клеток без выраженного влияния на потенциал покоя. Подавляет проведение не только болевых, но и импульсов другой модальности.

Бензокаин - местноанестезирующее средство для поверхностной анестезии. Уменьшает проницаемость клеточной мембраны для ионов Na^+ , вытесняет ионы Ca^{2+} из рецепторов, расположенных на внутренней поверхности мембраны, блокирует проведение нервных импульсов. Препятствует возникновению болевых импульсов в окончаниях чувствительных нервов и их проведению по нервным волокнам.

Показания к применению

Невралгия; миалгия; артралгия; зудящие дерматозы.

2. О ЧЕМ СЛЕДУЕТ ЗНАТЬ ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ ПРЕПАРАТА МЕНОВАЗИН

Противопоказания

Не применяйте препарат Меновазин:

- если у Вас аллергия на ментол рацемический, прокаин гидрохлорид, бензокаин или любые другие компоненты препарата (перечисленные в разделе 6 листка-вкладыша);
- если у Вас нарушение целостности кожных покровов;
- если у Вас воспалительные заболевания кожи в месте предполагаемого нанесения (в т.ч. дерматит, экзема);
- если Вы беременны или кормите грудью;
- если Вам менее 18 лет.

Особые указания и меры предосторожности

Перед применением препарата Меновазин проконсультируйтесь с лечащим врачом, или работником аптеки, или медицинской сестрой.

Не наносить на поврежденную и алергизированную кожу.

Не допускать попадания препарата в глаза.

Дети и подростки

Достоверных данных об эффективности и безопасности применения препарата у пациентов в возрасте до 18 лет установлено не было.

Другие препараты и препарат Меновазин

Сообщите лечащему врачу или работнику аптеки о том, что Вы применяете, недавно применяли или можете начать применять какие-либо другие препараты.

Компоненты препарата (прокаин гидрохлорид, бензокаин) ослабляют антибактериальное действие сульфаниламидных препаратов. Усиливают эффекты препаратов с местноанестезирующим действием.

Беременность и грудное вскармливание

Применять препарат при беременности и кормлении грудью не рекомендуется, несмотря на то, что данные о влиянии препарата на организм при беременности и лактации отсутствуют.

Управление транспортными средствами и работа с механизмами

Меновазин не оказывает влияния на способность управлять транспортными средствами и работать с механизмами.

Препарат Меновазин содержит этиловый спирт 70%.

3. ПРИМЕНЕНИЕ ПРЕПАРАТА МЕНОВАЗИН

Всегда применяйте препарат в полном соответствии с листком-вкладышем или с рекомендациями лечащего врача, работника аптеки, медицинской сестры. При появлении сомнений посоветуйтесь с лечащим врачом или фармацевтом.

Рекомендуемая доза:

Наружно. Наносят на пораженные участки кожи (зудящие дерматозы) или на кожу над пораженной областью и растирают 2-3 раза в день. Курс лечения продолжают в зависимости от терапевтического эффекта, но не более 3-4 недель. При необходимости курс лечения повторяют.

Если Вы применили препарата Меновазин больше, чем следовало

Данных о передозировке, повлекшей за собой нежелательные побочные реакции, сообщений не было.

Если Вы забыли применить препарат Меновазин

Примените препарат, как только вспомните об этом. Если подошло время следующего применения, пропустите пропущенную дозу и продолжайте применение по обычному графику.

4. ВОЗМОЖНЫЕ НЕЖЕЛАТЕЛЬНЫЕ РЕАКЦИИ

Подобно всем лекарственным препаратам Меновазин может вызывать нежелательные реакции, однако они возникают не у всех.

Аллергические реакции, контактный дерматит. При длительном применении могут наблюдаться головокружение, общая слабость, понижение артериального давления. В этих случаях лечение прекращают.

Сообщение о нежелательных реакциях

Если у Вас возникают какие-либо нежелательные реакции, проконсультируйтесь с врачом или фармацевтом. Данная рекомендация распространяется на любые возможные нежелательные реакции, в том числе на не перечисленные в листке-вкладыше.

Вы также можете сообщить о нежелательных реакциях непосредственно в Центр экспертизы лекарств и медицинских технологий МЗ РА по ссылке www.pharm.am или позвонить по номеру горячей линии: +37410200505 и +37496220505.

Сообщая о нежелательных реакциях, Вы помогаете получать больше сведений о безопасности препарата.

5. ХРАНЕНИЕ ПРЕПАРАТА МЕНОВАЗИН

Храните лекарственный препарат в недоступном для детей месте.

Хранить при температуре не выше 25°C, в защищенном от света месте.

Не применяйте препарат после истечения срока годности, указанного на упаковке.

Срок годности - 2 года.

Не выбрасывайте препараты в канализацию. Уточните у работника аптеки, как утилизировать препараты, которые больше не потребуются. Эти меры позволят защитить окружающую среду.

6. СОДЕРЖИМОЕ УПАКОВКИ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ

Препарат Меновазин содержит

Действующими веществами являются:

ментол рацемический - 2.5 г

прокаин гидрохлорид (новокаин) - 1.0 г

бензокаин (анестезин) - 1.0 г

на 100 мл раствора.

Прочим ингредиентом (вспомогательным веществом) является спирт этиловый 70% до 100 мл.

Внешний вид Меновазина и содержимое упаковки

Раствор для наружного применения. Бесцветная, прозрачная жидкость с запахом ментола.

По 30 мл раствора в стеклянном флаконе.

Категория отпуска лекарственного препарата

Лекарственный препарат относится к категории отпуска без рецепта.

Держатель регистрационного удостоверения и производитель

ООО “ЭСКО-ФАРМ”

Республика Армения, Ереван 0079, 5-ый Нор Норкский массив, ул. Микояна 13

Тел.: (+37410) 673903; e-mail: farm-esco@mail.ru

Листок-вкладыш пересмотрен

10/2025