

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА

НАИМЕНОВАНИЕ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА

Меновазин, раствор для наружного применения

КАЧЕСТВЕННЫЙ И КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ СОСТАВ

Действующие вещества: 2.5 г ментол рацемический, 1.0 г прокаин гидрохлорид (новокаин), 1.0 г бензокаин (анестезин) на 100 мл.

Полный перечень вспомогательных веществ приведен в разделе 6.1.

ЛЕКАРСТВЕННАЯ ФОРМА

Раствор для наружного применения

КЛИНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

4.1. Показания к применению

- невралгия;
- миалгия;
- артралгия;
- зудящие дерматозы.

4.2. Режим дозирования и способ применения

Режим дозирования

Наносят на пораженные участки кожи (зудящие дерматозы) или на кожу над пораженной областью и растирают 2-3 раза в день. Курс лечения продолжают в зависимости от терапевтического эффекта, но не более 3-4 недель. При необходимости курс лечения повторяют.

Особые группы пациентов

Дети

Достоверных данных об эффективности и безопасности применения препарата у пациентов в возрасте до 18 лет установлено не было.

Способ применения

Наружно.

4.3. Противопоказания

- гиперчувствительность к прокаину гидрохлориду, бензокаину, ментолу рацемическому или к любому из вспомогательных веществ, перечисленных в разделе 6.1;
- нарушение целостности кожных покровов;
- воспалительные заболевания кожи в месте предполагаемого нанесения (в т.ч. дерматит, экзема);
- беременность, период лактации, детский возраст.

4.4. Особые указания и меры предосторожности при применении

Следует отметить, что достоверных данных об эффективности и безопасности применения препарата у пациентов в возрасте до 18 лет установлено не было.

4.5. Взаимодействие с другими лекарственными препаратами и другие виды взаимодействия

Компоненты препарата (новокаин, бензокаин) ослабляют антибактериальное действие сульфаниламидных препаратов. Усиливают эффекты препаратов с местноанестезирующим действием.

4.6. Фертильность, беременность и лактация

Беременность

Применять препарат при беременности не рекомендуется, несмотря на то, что данные о влиянии препарата на организм при беременности отсутствуют.

Лактация

Применять препарат при кормлении грудью не рекомендуется, несмотря на то, что данные о влиянии препарата на организм при лактации отсутствуют.

4.7. Влияние на способность управлять транспортными средствами и работать с механизмами

Меновазин не оказывает влияния на способность управлять транспортными средствами и работать с механизмами.

4.8. Нежелательные реакции

Аллергические реакции, контактный дерматит. При длительном применении могут наблюдаться головокружение, общая слабость, понижение артериального давления. В этих случаях лечение прекращают.

Сообщение о подозреваемых нежелательных реакциях

Важно сообщать о подозреваемых нежелательных реакциях после регистрации лекарственного препарата с целью обеспечения непрерывного мониторинга соотношения "польза - риск" лекарственного препарата. Медицинским работникам рекомендуется сообщать о любых подозреваемых нежелательных реакциях лекарственного препарата в Центр экспертизы лекарств и медицинских технологий МЗ РА по ссылке www.pharm.am или позвонить по номеру горячей линии: +37410200505 и +37496220505.

4.9. Передозировка

Данных о передозировке, повлекшей за собой нежелательные побочные реакции, сообщений не было.

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

5.1. Фармакодинамические свойства

Фармакотерапевтическая группа: анестетики; местные анестетики, эфиры аминобензойной кислоты.

Код АТХ: N01BA52

Механизм действия

Комбинированный препарат для наружного применения, который благодаря входящим в состав ментолу, прокаину и бензокаину оказывает местное обезболивающее действие.

Фармакодинамические эффекты

Ментол рацемический при нанесении на кожу и слизистые оболочки вызывает раздражение нервных окончаний, расширение поверхностных сосудов кожи, сопровождающееся анальгезирующим (обезболивающим) эффектом с ощущением прохлады, легкого жжения, покалывания.

Ментол усиливает местноанестезирующее действие прокаина и бензокаина при их одновременном применении в составе комбинированного препарата.

Прокаин гидрохлорид - местноанестезирующее средство с умеренной анестезирующей активностью. Являясь слабым основанием, блокирует натриевые каналы, препятствует генерации импульсов в окончаниях чувствительных нервов и проведению импульсов по нервным волокнам. Изменяет потенциал действия в мембранах нервных клеток без выраженного влияния на потенциал покоя. Подавляет проведение не только болевых, но и импульсов другой модальности.

Бензокаин - местноанестезирующее средство для поверхностной анестезии. Уменьшает проницаемость клеточной мембраны для ионов Na^+ , вытесняет ионы Ca^{2+} из рецепторов, расположенных на внутренней поверхности мембраны, блокирует проведение нервных импульсов. Препятствует возникновению болевых импульсов в окончаниях чувствительных нервов и их проведению по нервным волокнам.

5.2. Фармакокинетические свойства

Абсорбция

При наружном применении компоненты препарата практически не поступают в системный кровоток.

5.3. Данные доклинической безопасности

В доклинических данных, полученных по результатам стандартных исследований фармакологической безопасности, токсичности при многократном введении, особый вред для человека не выявлен.

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

6.1. Перечень вспомогательных веществ

Спирт этиловый 70 %.

6.2. Несовместимость

Не применимо.

6.3. Срок годности (срок хранения)

2 года.

Не применять препарат после окончания срока годности, указанного на упаковке!

6.4. Особые меры предосторожности при хранении

Хранить при температуре не выше 25 °С, в защищенном от света и недоступном для детей месте.

6.5. Характер и содержание упаковки

По 30 мл раствора в стеклянном флаконе.

6.6. Особые меры предосторожности при утилизации использованного лекарственного препарата или отходов, полученных после применения лекарственного препарата, и другие манипуляции с препаратом

Не наносить на поврежденную и алергизированную кожу.

Не допускать попадания препарата в глаза.

Весь оставшийся лекарственный препарат и отходы следует уничтожить (утилизировать) в соответствии с требованиями законодательства государств - членов Евразийского экономического союза.

ДЕРЖАТЕЛЬ РЕГИСТРАЦИОННОГО УДОСТОВЕРЕНИЯ

ООО “ЭСКО-ФАРМ”

Республика Армения, Ереван 0079, 5-ый Нор Норкский массив, ул. Микояна 13

Тел.: (+37410) 673903; e-mail: farm-esco@mail.ru

НОМЕР РЕГИСТРАЦИОННОГО УДОСТОВЕРЕНИЯ

19635

КАТЕГОРИЯ ОТПУСКА ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА

Лекарственный препарат относится к категории отпуска без рецепта.

ДАТА ПОСЛЕДНЕГО ПЕРЕСМОТРА ДОКУМЕНТАЦИИ

Октябрь, 2025г.