

УПАКОВОЧНЫЙ ВКЛАДЫШ: ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ ФЛУИФОРТ®

(Карбоцистеина лизиновая соль 2.7 г)

Порошок для приготовления раствора для приема внутрь

Прежде чем Вы начнете принимать данное лекарственное средство, пожалуйста, внимательно прочитайте листок-вкладыш:

- Сохраните листок-вкладыш, Вам может потребоваться прочесть его еще раз.
 - Если у Вас возникают дополнительные вопросы, спросите об этом вашего лечащего врача или провизора.
 - Данное лекарственное средство было выписано именно Вам. Не передавайте его кому-либо другому. Препарат может оказать неблагоприятное воздействие на другого человека, даже если симптомы на Ваш взгляд у вас совпадают.
 - В случае если у Вас появляется побочная реакция и она носит характер серьезной, либо она не указана в листке-вкладыше, незамедлительно сообщите об этом Вашему лечащему врачу или провизору.
-

В листке-вкладыше Вы найдете информацию:

1. Что такое ФЛУИФОРТ® и для чего его употребляют
2. Что нужно выяснить до начала приема ФЛУИФОРТ®
3. Как принимать ФЛУИФОРТ®
4. Возможные побочные эффекты
5. Как правильно хранить ФЛУИФОРТ®
6. Другая необходимая информация

1. ЧТО ТАКОЕ ФЛУИФОРТ® И ДЛЯ ЧЕГО ОН ИСПОЛЬЗУЕТСЯ

ФЛУИФОРТ® это мукорегулятор, обладающий разжижающим и растворяющим слизь эффектом.

ФЛУИФОРТ® назначается при лечении острых и хронических заболеваний верхней и нижней части дыхательного тракта.

2. ДО ПРИЕМА ФЛУИФОРТ®

Не применяйте ФЛУИФОРТ®

- Если у Вас повышенная чувствительность к активному веществу или к любому из вспомогательных веществ.
- Язва желудка и ДПК.
- Беременность и лактация.

Необходимо принять особые меры предосторожности при приеме ФЛУИФОРТ®

С первых дней лечения улучшается отхаркивание, в связи с улучшением элиминации секрета.

Желудочно-кишечные кровотечения

Сообщалось о случаях желудочно-кишечных кровотечений при применении карбоцистеина. Следует соблюдать осторожность у пожилых людей, у пациентов с гастродуоденальными язвами в анамнезе или у пациентов, одновременно принимающих лекарственные средства, повышающие риск желудочно-кишечных кровотечений. В случае желудочно-кишечного кровотечения пациенту следует прекратить лечение карбоцистеином.

Астматические и ослабленные больные:

Особые меры предосторожности рекомендуются у пациентов с тяжелой дыхательной недостаточностью, у пациентов с астмой и бронхоспазмом в анамнезе, а также у ослабленных пациентов. Применение карбоцистеина вызывает снижение вязкости слизи и увеличение клиренса слизи как за счет цилиарной активности эпителия, так и за счет кашлевого рефлекса. Поэтому ожидается усиление кашля и мокроты. Применение противокашлевых препаратов угнетает кашлевой рефлекс и увеличивает риск обструкции дыхательных путей из-за повышенного скопления слизи в дыхательных путях. Не рекомендуется одновременное применение этого препарата с противокашлевыми препаратами и/или препаратами, угнетающими бронхиальную секрецию (например, антимускариновыми препаратами).

Пристрастия или зависимости не выявлено. Даже если продукт не является ни тератогенным, ни мутагенным и не проявил никакого неблагоприятного воздействия на репродуктивную функцию животных, его использование в течение первых трех месяцев беременности не рекомендуется.

Так как нет данных о выделении карбоцистеина в молоко матери, его использование во время кормления грудью следует избегать.

Если Вы принимаете другие лекарственные средства

На сегодняшний день не было выявлено несовместимости между карбоцистеином и лекарствами, чаще всего используемыми для лечения верхних и нижних дыхательных путей, с продуктами питания или в результате лабораторных испытаний.

Прием ФЛУИФОРТ® с пищей или с жидкостью

Особые рекомендации по приему ФЛУИФОРТ® отдельно, либо одновременно с пищей либо жидкостью, отсутствуют.

Беременность и период кормления грудью

Несмотря на то, что активный ингредиент не является ни тератогенным, ни мутагенным и хотя он не оказывал негативного влияния на репродуктивную функцию животных, ФЛУИФОРТ® не следует назначать во время беременности. Нет никаких данных о

прохождении моногидратной лизиновой соли Карбоцистеина в молоко матери: поэтому, использование лекарственного препарата в период лактации противопоказан.

Вождение и работа с механизмами

Не сообщалось о каких-либо негативных влияниях препарата на способность управлять автомобилем или работать с механизмами.

ФЛУИФОРТ® содержит аспартам.

В одной дозе данного препарата содержится 30 мг аспартама, что эквивалентно 6 мг/г. Аспартам является источником фенилаланина и может быть вреден для пациентов, страдающих фенилкетонурией - редким генетическим заболеванием, при котором происходит накопление фенилаланина в организме в связи с его неспособностью нормально расщеплять эту аминокислоту.

3. КАК ПРИНИМАТЬ ФЛУИФОРТ®

Всегда точно следуйте рекомендациям вашего доктора по приему ФЛУИФОРТ®. Всегда уточняйте у доктора или провизора, если Вы не уверены в дозировке. Обычно рекомендуемые дозы составляют:

Взрослые:

1 саше в день или по назначению врача.

Растворить содержимое пакета в половине стакана воды, хорошо перемешивая.

С учетом фармакокинетических свойств и переносимости моногидратной лизиновой соли карбоцистеина, такую дозировку можно назначить даже пациентам с нарушениями функции почек или печени. ФЛУИФОРТ® саше может быть использован у больных сахарным диабетом.

Дети: ФЛУИФОРТ® саше не подходит для применения у детей.

ФЛУИФОРТ® Сироп доступен для использования у детей.

Длительность лечения - Карбоцистеин используется и при острой и хронической патологии на срок от 4 дней до 6 месяцев, в соответствии с назначением врача.

Если Вы приняли большее количество ФЛУИФОРТ®, чем следовало

Свяжитесь с вашим лечащим врачом или провизором и следуйте его инструкциям.

В случае передозировки с усилением побочных эффектов, может быть полезно промывание желудка с последующей терапией под наблюдением врача. Специфического антидота не существует.

Если вы забыли принять ФЛУИФОРТ®

Если вы пропустили один прием и уже подошло время следующего приема препарата, следует принять только одну дозу и далее продолжать курс в соответствии с указанием на упаковке. Не принимайте двойную дозу, чтобы восполнить пропущенную.

Если вы пропустили несколько приемов, поставьте в известность об этом вашего врача или фармацевта. Они могут посоветовать вам начать лечение с нового курса ФЛУИФОРТ®

Если Вы прекратили прием ФЛУИФОРТ®

Не рекомендуется по собственному желанию прекращать прием ФЛУИФОРТ®

Если у Вас возникают какие-либо вопросы, связанные с использованием данного препарата, задайте их Вашему врачу или провизору.

4. ВОЗМОЖНЫЕ ПОБОЧНЫЕ РЕАКЦИИ

Как все прочие лекарственные средства, ФЛУИФОРТ® может вызывать побочные реакции, хотя далеко не у каждого пациента они могут проявляться.

Нежелательные эффекты описаны в соответствии с классом системы органов MedDRA и на основе частоты, оцененной на основе постмаркетингового опыта.

Частоты определяются следующим образом: очень часто ($\geq 1/10$); часто ($\geq 1/100$, $< 1/10$); нечасто: ($\geq 1/1000$, $< 1/100$); редко ($\geq 1/10000$, $< 1/1000$); очень редко ($< 1/10\ 000$); неизвестно (частота не может быть оценена по имеющимся данным).

Классификация	Частота	Неблагоприятные реакции
Кожа, подкожная клетчатка	Неизвестно	Кожная сыпь, крапивница, эритема, экзантема, экзантема/буллезная эритема, зуд, ангионевротический отек, дерматит. Синдром Стивенса-Джонсона, буллезный дерматит, многоформная эритема, токсическая кожная сыпь.
Желудочно-кишечная система	Неизвестно	Боль в животе, тошнота, рвота, диарея. Желудочно-кишечные кровотечения
Нервная система	Неизвестно	Головокружение
Дыхательная система	Неизвестно	Одышка
Сосудистая патология	Неизвестно	Покраснение

Если возникли серьезные побочные эффекты, или если вы отметили побочные эффекты, не перечисленные в данном вкладыше, обратитесь к вашему врачу или фармацевту.

5. КАК ПРАВИЛЬНО ХРАНИТЬ ФЛУИФОРТ®

Срок годности 3 года

Дата истечения срока относится к интегрально упакованному и правильно хранимому продукту.

Хранить в сухом, прохладном месте при температуре ниже 30 °C.

Хранить в недоступном для детей месте!

Не принимайте ФЛУИФОРТ® после истечения срока годности, указанного на этикетке и картонной упаковке. Срок годности указывает последний день месяца.

Лекарственное средство нельзя выливать в канализацию или выбрасывать с мусором. Свяжитесь с провизором для уточнения каким образом вы можете поступить с лекарственным средством, которое Вам более не нужно. Данные меры направлены на сохранение окружающей среды.

6. ДРУГАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Что содержит ФЛУИФОРТ®

- Действующим веществом является карбоцистеина лизиновая соль моногидрат
- Другие (вспомогательные) ингредиенты: Аспартам, Повидон К30, Безводная лимонная кислота, Натуральный кедровый порошок, Апельсиновая пудра, Маннитол .

Как выглядит ФЛУИФОРТ® и из чего состоит упаковка

ФЛУИФОРТ® представляет собой соломенно-желтый порошок с запахом апельсина, не содержит посторонних включений.

Поставляется в коробках содержащих 5, 30 и 50 пакетиков и вкладыш.
Отпускается без рецепта врача.

Условия отпуска

Отпускается без рецепта врача.

Держатель регистрационного удостоверения

Евродраг Лабораториз,
Нидерланды

Производитель

Компания ООО «Полифарм»,
Самут пракан, Таиланд.

Последняя версия листка-вкладыша принята в Февраль 2026.


LABORATORIES
02AM37K99.A04
3142604