

ИНСТРУКЦИЯ

по медицинскому применению препарата

Мазь фурацилиновая 0,2%

Торговое название препарата:

Мазь фурацилиновая 0,2%

Лекарственная форма:

Мазь

Состав:

100 г мази содержит:

активное вещество – 0,2 г нитрофураля,

вспомогательные вещества: вазелин, ДМСО, ПЭГ 400.

Фармакотерапевтическая группа: Антисептическое и дезинфицирующее средство.

Код АТХ - D08AF01

Фармакологические свойства

Противомикробное, противовоспалительное средство, производное нитрофурана. Бактериальные флавопротеины, восстанавливая 5-нитрогруппу, образуют высокореактивные аминопроизводные, способные вызывать конформационные изменения белков (в т.ч. рибосомальных) и др. макромолекул, приводя к гибели бактерий. Активен в отношении грамположительных бактерий: *Staphylococcus* spp., *Streptococcus* spp., *Bacillus anthracis*; грамотрицательных бактерий: *Escherichia coli*, *Shigella* spp., *Salmonella* spp. (в т.ч. *Salmonella paratyphi*). Устойчивость развивается медленно и не достигает высокой степени.

Показания к применению

- гнойные раны,
- пролежни,
- язвы,
- ожоги II и III степени,
- анаэробная инфекция раневой поверхности.

Способ применения и режим дозирования

Препарат назначают для местного, наружного применения. Мазь наносят тонким слоем или под согревающую повязку 1-3 раза в день на пораженные участки кожи в течение 2-3 дней.

Противопоказания

- повышенная индивидуальная чувствительность к компонентам препарата,
- аллергические дерматозы.

Побочные действия

Возможно: местные аллергические реакции, дерматиты.

Передозировка

При применении препарата в соответствии с инструкцией по применению передозировка маловероятна.

Особые указания и меры предосторожности

При назначении беременным женщинам, женщинам в период лактации и детям рекомендуется учитывать возможное соотношение риска и пользы от применения данного лекарственного средства.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами

Клинически значимое взаимодействие с какими-либо другими лекарствами не описано.

Беременность и лактация

Перед применением препарата во время беременности и в период грудного вскармливания необходимо обратиться к врачу.

Влияние на способность управлять транспортными средствами или другими механизмами

Препарат не оказывает отрицательного влияния на выполнение потенциально опасных видов деятельности, требующих особого внимания и быстрых реакций.

Упаковка

По 25 г мази в тубы ламинатные с алюминиевым барьерным слоем. Каждую тубу вместе с инструкцией по применению помещают в пачку из картона.

Условия хранения

Хранить при температуре не выше 25°C, в недоступном для детей месте.

Срок годности - 2 года.

Условия отпуска из аптек

Препарат разрешен к применению как средство безрецептурного отпуска.

Название и адрес производителя

ООО “ЭСКО-ФАРМ”

Республика Армения, Ереван 0079, V Нор Норкский массив, ул. Микояна 13

Тел.: (+37410) 673903, E-mail: farm-esco@mail.ru

Владелец Регистрационного Удостоверения

ООО “ЭСКО-ФАРМ”

Республика Армения, Ереван 0079, V Нор Норкский массив, ул. Микояна 13

Тел.: (+37410) 673903, E-mail: farm-esco@mail.ru