

Листок-вкладыш – информация для пациента
ФУРАЦИЛИН АВЕКСИМА, 20 мг, таблетки шипучие для
приготовления раствора для местного и наружного применения

Действующее вещество: нитрофура.

Перед применением препарата полностью прочитайте листок-вкладыш, поскольку в нем содержатся важные для Вас сведения.

- Всегда применяйте препарат в точности с листком-вкладышем или рекомендациями лечащего врача, работника аптеки или медицинской сестры.
- Сохраните листок-вкладыш. Возможно, Вам потребуется прочитать его еще раз.
- Если Вам нужны дополнительные сведения или рекомендации, обратитесь к работнику аптеки.
- Если у Вас возникли какие-либо нежелательные реакции, обратитесь к лечащему врачу, работнику аптеки или медицинской сестре. Данная рекомендация распространяется на любые возможные нежелательные реакции, в том числе на не перечисленные в разделе 4 листка-вкладыша.
- Если состояние не улучшается или оно ухудшается, Вам следует обратиться к врачу.

Содержание листка-вкладыша:

1. Что из себя представляет препарат ФУРАЦИЛИН АВЕКСИМА, и для чего его применяют
2. О чем следует знать перед применением препарата ФУРАЦИЛИН АВЕКСИМА
3. Применение препарата ФУРАЦИЛИН АВЕКСИМА
4. Возможные нежелательные реакции
5. Хранение препарата ФУРАЦИЛИН АВЕКСИМА
6. Содержимое упаковки и прочие сведения

1. Что из себя представляет препарат ФУРАЦИЛИН АВЕКСИМА, и для чего его применяют

Препарат ФУРАЦИЛИН АВЕКСИМА относится к группе противомикробных лекарственных средств – нитрофуранам. Препарат содержит действующее

вещество нитрофурал (фурацилин), которое вызывает гибель бактерий и простейших микроорганизмов, способных вызывать инфекции у человека.

Показания к применению

Препарат ФУРАЦИЛИН АВЕКСИМА предназначен наружного лечения гнойных ран, пролежней, ожогов II-III степени, мелких повреждений кожи (в т.ч. ссадин, царапин, трещин, порезов).

Также препарат используется местно для лечения блефарита, конъюнктивита, остеомиелита, эмпиемы придаточных пазух носа и плевры; инфекции мочевыводящих путей, остром тонзиллите, стоматите, гингивите.

Если улучшение не наступило или Вы чувствуете ухудшение, необходимо обратиться к врачу.

2. О чем следует знать перед применением препарата ФУРАЦИЛИН АВЕКСИМА

Противопоказания

Не применяйте препарат ФУРАЦИЛИН АВЕКСИМА:

- если у Вас аллергия на нитрофурал, производные нитрофурана и/или любые другие компоненты препарата (перечисленные в разделе 6 листка-вкладыша).
- при наличии кровотечения в месте применения;
- при аллергических заболеваниях кожи;
- если у Вас есть тяжелые нарушения функции почек.

Особые указания и меры предосторожности

Перед применением препарата ФУРАЦИЛИН АВЕКСИМА проконсультируйтесь с лечащим врачом, работником аптеки или медицинской сестрой.

Применение препарата ФУРАЦИЛИН АВЕКСИМА при тяжелых ожогах на больших поверхностях в случаях наличия нарушений функции почек возможно прогрессирование почечной недостаточности.

Другие препараты и препарат ФУРАЦИЛИН АВЕКСИМА

Сообщите лечащему врачу или работнику аптеки о том, что Вы принимаете, недавно принимали или можете начать принимать какие-либо другие препараты.

Беременность и грудное вскармливание

Если Вы беременны или кормите грудью, думаете, что забеременели, или планируете беременность, перед началом применения препарата проконсультируйтесь с лечащим врачом или работником аптеки.

Управление транспортными средствами и работа с механизмами

Применение препарата не влияет на способность управлять транспортными средствами и механизмами.

3. Применение препарата ФУРАЦИЛИН АВЕКСИМА

Всегда принимайте препарат в полном соответствии с рекомендациями лечащего врача или работника аптеки. При появлении сомнений посоветуйтесь с лечащим врачом или работником аптеки.

Рекомендуемая доза

Наружно

Гнойные раны, пролежни, ожоги II-III степени, мелкие повреждения кожи (в т.ч. ссадины, царапины, трещины, порезы): в виде водного 0.02 % раствора. Орошают раны и накладывают влажные повязки.

Местно

Блефарит, конъюнктивит: инстилляцией 0.02 % раствора в конъюнктивальный мешок.

Стоматит, гингивит, острый тонзиллит: полоскание рта и горла теплым 0.02 % раствором по 100 мл 2-3 раза в день.

Остеомиелит после операции: промывание полости с последующим наложением влажной повязки.

Эмпиема придаточных пазух носа (в том числе при гайморите): промывание полости.

Эмпиема плевры: после удаления гноя проводят промывание плевральной полости и вводят 20-100 мл водного 0.02 % раствора.

Инфекции мочевыводящих путей: для промывания мочеиспускательного канала и мочевого пузыря применяют водный 0.02 % раствор с экспозицией 20 минут.

Путь и (или) способ введения

Местно. Наружно. В виде 0.02 % свежеприготовленного водного раствора, для приготовления которого непосредственно перед применением одну таблетку (20 мг) растворите в 100 мл дистиллированной воды комнатной температуры или в теплой кипяченой воде.

Продолжительность терапии

Продолжительность лечения определяет врач в зависимости от характера заболевания.

При наличии вопросов по применению препарата обратитесь к лечащему врачу, работнику аптеки или медицинской сестре.

4. Возможные нежелательные реакции

Подобно всем лекарственным препаратам, ФУРАЦИЛИН АВЕКСИМА может вызывать нежелательные реакции, однако они возникают не у всех.

Прекратите прием препарата ФУРАЦИЛИН АВЕКСИМА и немедленно обратитесь за медицинской помощью, в случае возникновения одного из следующих признаков аллергической реакции (частота возникновения неизвестна):

- аллергическое воспаление кожи (дерматит);
- зуд кожи.

Сообщение о нежелательных реакциях

Если у Вас возникают какие-либо нежелательные реакции, проконсультируйтесь с врачом, работником аптеки или медицинской сестрой. Данная рекомендация распространяется на любые возможные нежелательные реакции, в том числе на не перечисленные в листке-вкладыше. Вы также можете сообщить о нежелательных реакциях напрямую через систему сообщения государства-члена Евразийского экономического союза. Сообщая о нежелательных реакциях, Вы помогаете получить больше сведений о безопасности препарата.

Республика Армения:

АОЗТ «Научный Центр Экспертизы Лекарств и Медицинских Технологий им. академика Э. Габриеляна», Отдел мониторинга безопасности лекарств

Армения, Ереван 0051, пр. Комитаса 49/5

Горячая линия: (+374 10) 20-05-05, (+374 96) 22-05-05

Эл.почта: vigilance@pharm.am

<http://www.pharm.am/index.php/ru/2014-09-15-16-52-41>

5. Хранение препарата ФУРАЦИЛИН АВЕКСИМА

Храните препарат в недоступном для ребенка месте так, чтобы ребенок не мог увидеть его.

Не применяйте препарат после истечения срока годности (срока хранения), указанного на упаковке. Датой истечения срока годности является последний день месяца.

Храните препарат в оригинальной упаковке (пачке) для защиты от света при температуре не выше 25 °С.

Особые меры предосторожности при уничтожении использованного лекарственного препарата отсутствуют.

6. Содержимое упаковки и прочие сведения

Препарат ФУРАЦИЛИН АВЕКСИМА содержит

Действующим веществом является нитрофурал (фурацилин). Каждая таблетка содержит 20 мг нитрофурала (фурацилина).

Прочими вспомогательными веществами являются: винная кислота, натрия гидрокарбонат, натрия карбонат, натрия хлорид, макрогол 20000, повидон К25.

Внешний вид препарата ФУРАЦИЛИН АВЕКСИМА и содержимое упаковки

Таблетки шипучие для приготовления раствора для местного и наружного применения.

Круглые, плоскоцилиндрической формы таблетки, от светло-желтого до желтого цвета с вкраплениями, с фаской на обеих сторонах. Допускается шероховатость поверхности таблетки.

По 2 или 4 таблетки в контурную безъячейковую упаковку (стрип) из материала упаковочного комбинированного на бумажной основе.

По 5 или 10 контурных безъячейковых упаковок (стрипов) по 2 таблетки или 5 контурных безъячейковых упаковок (стрипов) по 4 таблетки вместе с инструкцией по медицинскому применению (листком-вкладышем) помещают в пачку из картона.

Держатель регистрационного удостоверения

ОАО «Авексима», Россия,

125284, г. Москва, Ленинградский проспект, д. 31А, стр. 1

Телефон: +7 (495) 258-45-28.

Электронная почта: info@avexima.ru

Производитель

АО «Ирбитский химфармзавод», Россия,

623856, Свердловская обл., г. Ирбит, ул. Кирова, 172

Адрес производства:

Производство готовой лекарственной формы, первичная упаковка, вторичная упаковка:

Свердловская обл., г. Ирбит, ул. Карла Маркса, д. 124а.

Выпускающий контроль качества:

Свердловская обл., г. Ирбит, ул. Карла Маркса, д. 124, стр. 1.

За любой информацией о препарате следует обращаться к локальному представителю держателя регистрационного удостоверения:

Претензии потребителей направлять по адресу:

ТОО «Adalan», Республика Казахстан,

050060, г. Алматы, ул. Тимирязева 42, пав. 23, офис 202

Тел.: +7 727 2695418

e-mail: pv@adalan.kz

Листок-вкладыш пересмотрен

Прочие источники информации

Подробные сведения о данном препарате содержатся на веб-сайте Союза (<https://eec.eaeunion.org>). Листок-вкладыш доступен на всех языках Союза на веб-сайте Союза.